

Adult Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 7036)			
	Malaria (2693, 16%)	Infections (6176, 37%)	Non-infections (7933, 47%)
fever (3820, 23%)	988 (26%)	1713 (45%)	1119 (29%)
weightLoss (2055, 12%)	350 (17%)	873 (42%)	832 (40%)
abdominalProblem (1594, 9%)	141 (9%)	433 (27%)	1020 (64%)
breathingProblem (1517, 9%)	198 (13%)	530 (35%)	789 (52%)
cough (1442, 9%)	225 (16%)	800 (55%)	417 (29%)
vomit (1227, 7%)	284 (23%)	451 (37%)	492 (40%)
chestPain (937, 6%)	110 (12%)	360 (38%)	467 (50%)
injury (832, 5%)	18 (2%)	44 (5%)	770 (93%)
unconscious (816, 5%)	126 (15%)	183 (22%)	507 (62%)
paralysis (482, 3%)	33 (7%)	55 (11%)	394 (82%)
looseStools (422, 3%)	50 (12%)	278 (66%)	94 (22%)
urinaryProblem (357, 2%)	38 (11%)	71 (20%)	248 (69%)
oedema (341, 2%)	11 (3%)	99 (29%)	231 (68%)
skinProblems (320, 2%)	29 (9%)	164 (51%)	127 (40%)
pregnant (251, 1%)	18 (7%)	26 (10%)	207 (82%)
yellowEyes (176, 1%)	43 (24%)	45 (26%)	88 (50%)
convulsions (130, 1%)	26 (20%)	25 (19%)	79 (61%)
lumps (83, 0%)	5 (6%)	26 (31%)	52 (63%)

