

Older Male Adult Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2304)			
	Malaria (714, 13%)	Infections (2014, 35%)	Non-infections (2965, 52%)
fever (1228, 22%)	258 (21%)	562 (46%)	408 (33%)
weightLoss (697, 12%)	91 (13%)	276 (40%)	330 (47%)
breathingProblem (599, 11%)	62 (10%)	203 (34%)	334 (56%)
cough (531, 9%)	65 (12%)	281 (53%)	185 (35%)
abdominalProblem (530, 9%)	35 (7%)	117 (22%)	378 (71%)
vomit (357, 6%)	70 (20%)	122 (34%)	165 (46%)
chestPain (345, 6%)	32 (9%)	140 (41%)	173 (50%)
unconscious (268, 5%)	33 (12%)	51 (19%)	184 (69%)
injury (253, 4%)	6 (2%)	13 (5%)	234 (92%)
paralysis (218, 4%)	10 (5%)	18 (8%)	190 (87%)
urinaryProblem (183, 3%)	12 (7%)	35 (19%)	136 (74%)
looseStools (143, 3%)	15 (10%)	88 (62%)	40 (28%)
oedema (132, 2%)	1 (1%)	38 (29%)	93 (70%)
skinProblems (93, 2%)	6 (6%)	46 (49%)	41 (44%)
yellowEyes (64, 1%)	11 (17%)	15 (23%)	38 (59%)
lumps (27, 0%)	3 (11%)	6 (22%)	18 (67%)
convulsions (25, 0%)	4 (16%)	3 (12%)	18 (72%)

