

| Young Male Adult (15–39 Years) Deaths by Symptom<br>Sierra Leone 2019–2022<br>(n = 806) |                       |                    |                           |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|
|   | Infections<br>(n=186) | Malaria<br>(n=192) | Non-infections<br>(n=428) |
| abdominalProblem  | 33<br>(18%)           | 24<br>(12%)        | 90<br>(21%)               |
| breathingProblem  | 49<br>(26%)           | 35<br>(18%)        | 53<br>(12%)               |
| chestPain   | 25<br>(13%)           | 24<br>(12%)        | 30<br>(7%)                |
| convulsions   | 5<br>(3%)             | 6<br>(3%)          | 13<br>(3%)                |
| cough   | 79<br>(42%)           | 48<br>(25%)        | 22<br>(5%)                |
| fever   | 150<br>(81%)          | 185<br>(96%)       | 74<br>(17%)               |
| looseStools   | 22<br>(12%)           | 8<br>(4%)          | 4<br>(1%)                 |
| lumps   | 1<br>(1%)             | 0<br>(<1%)         | 1<br>(<1%)                |
| oedema  | 3<br>(2%)             | 1<br>(1%)          | 15<br>(4%)                |
| paralysis   | 4<br>(2%)             | 4<br>(2%)          | 15<br>(4%)                |
| skinProblems  | 6<br>(3%)             | 6<br>(3%)          | 13<br>(3%)                |
| unconscious   | 15<br>(8%)            | 22<br>(11%)        | 45<br>(11%)               |
| urinaryProblem  | 5<br>(3%)             | 9<br>(5%)          | 16<br>(4%)                |
| vomit   | 54<br>(29%)           | 53<br>(28%)        | 54<br>(13%)               |
| weightLoss  | 79<br>(42%)           | 62<br>(32%)        | 43<br>(10%)               |
| yellowEyes  | 2<br>(1%)             | 9<br>(5%)          | 8<br>(2%)                 |

