

| Adult (15–69 Years) Deaths by Symptom<br>Sierra Leone 2019–2022<br>(n = 3577) |                    |                       |                            |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|   | Malaria<br>(n=752) | Infections<br>(n=968) | Non-infections<br>(n=1857) |
| abdominalProblem  | 91<br>(12%)        | 176<br>(18%)          | 384<br>(21%)               |
| breathingProblem  | 144<br>(19%)       | 227<br>(23%)          | 388<br>(21%)               |
| chestPain   | 74<br>(10%)        | 147<br>(15%)          | 244<br>(13%)               |
| convulsions   | 17<br>(2%)         | 13<br>(1%)            | 36<br>(2%)                 |
| cough   | 156<br>(21%)       | 363<br>(38%)          | 183<br>(10%)               |
| fever   | 725<br>(96%)       | 722<br>(75%)          | 472<br>(25%)               |
| looseStools   | 33<br>(4%)         | 143<br>(15%)          | 38<br>(2%)                 |
| lumps   | 5<br>(1%)          | 6<br>(1%)             | 19<br>(1%)                 |
| oedema  | 6<br>(1%)          | 29<br>(3%)            | 110<br>(6%)                |
| paralysis   | 23<br>(3%)         | 12<br>(1%)            | 292<br>(16%)               |
| skinProblems  | 21<br>(3%)         | 47<br>(5%)            | 60<br>(3%)                 |
| unconscious   | 91<br>(12%)        | 75<br>(8%)            | 278<br>(15%)               |
| urinaryProblem  | 23<br>(3%)         | 23<br>(2%)            | 108<br>(6%)                |
| vomit   | 201<br>(27%)       | 205<br>(21%)          | 204<br>(11%)               |
| weightLoss  | 252<br>(34%)       | 361<br>(37%)          | 349<br>(19%)               |
| yellowEyes  | 27<br>(4%)         | 12<br>(1%)            | 40<br>(2%)                 |

