

Young Adult Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2804)			
	Malaria (1309, 20%)	Infections (2609, 39%)	Non-infections (2770, 41%)
fever (1523, 23%)	468 (31%)	677 (44%)	378 (25%)
weightLoss (833, 12%)	173 (21%)	399 (48%)	261 (31%)
abdominalProblem (727, 11%)	76 (10%)	220 (30%)	431 (59%)
vomit (563, 8%)	146 (26%)	217 (39%)	200 (36%)
cough (548, 8%)	109 (20%)	330 (60%)	109 (20%)
breathingProblem (497, 7%)	92 (19%)	205 (41%)	200 (40%)
injury (422, 6%)	6 (1%)	20 (5%)	396 (94%)
chestPain (335, 5%)	61 (18%)	143 (43%)	131 (39%)
unconscious (296, 4%)	57 (19%)	81 (27%)	158 (53%)
pregnant (216, 3%)	14 (6%)	23 (11%)	179 (83%)
looseStools (158, 2%)	24 (15%)	104 (66%)	30 (19%)
skinProblems (131, 2%)	16 (12%)	69 (53%)	46 (35%)
oedema (105, 2%)	5 (5%)	35 (33%)	65 (62%)
urinaryProblem (104, 2%)	17 (16%)	23 (22%)	64 (62%)
paralysis (71, 1%)	8 (11%)	22 (31%)	41 (58%)
convulsions (68, 1%)	18 (26%)	16 (24%)	34 (50%)
yellowEyes (61, 1%)	18 (30%)	15 (25%)	28 (46%)
lumps (30, 0%)	1 (3%)	10 (33%)	19 (63%)

