

Male Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2085)			
	Malaria (n=834)	Infections (n=912)	Non-infections (n=339)
fever (1728, 29%)	815 (98%)	833 (91%)	80 (24%)
vomit (564, 10%)	285 (34%)	244 (27%)	35 (10%)
headache (459, 8%)	232 (28%)	202 (22%)	25 (7%)
difficultyBreathing (454, 8%)	189 (23%)	217 (24%)	48 (14%)
	168 (20%)	203 (22%)	47 (14%)
weightLoss (418, 7%)	195 (23%)	185 (20%)	12 (4%)
cough (392, 7%)	206 (25%)	122 (13%)	37 (11%)
yellowEyes (365, 6%)	199 (24%)	101 (11%)	29 (9%)
convulsion (329, 6%)	74 (9%)	165 (18%)	4 (1%)
looseStools (243, 4%)	83 (10%)	61 (7%)	27 (8%)
unconscious (171, 3%)	38 (5%)	64 (7%)	69 (20%)
abdominalProblem (171, 3%)	49 (6%)	61 (7%)	6 (2%)
neckStiffness (116, 2%)	0 (<1%)	5 (1%)	93 (27%)
injury (98, 2%)	31 (4%)	26 (3%)	28 (8%)
oedema (85, 1%)	9 (1%)	43 (5%)	11 (3%)
skinRash (63, 1%)	8 (1%)	34 (4%)	17 (5%)
ulcers (59, 1%)	12 (1%)	21 (2%)	9 (3%)
urinaryProblem (42, 1%)	17 (2%)	17 (2%)	8 (2%)
chestPain (42, 1%)	16 (2%)	9 (1%)	13 (4%)
difficultySwallowing (38, 1%)	4 (<1%)	4 (<1%)	7 (2%)
bleeding (15, <1%)	2 (<1%)	9 (1%)	2 (1%)
paralysis (13, <1%)	1 (<1%)	3 (<1%)	5 (1%)
lumps (9, <1%)			

