

Adult (15–69 Years) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 7036)			
	Malaria (n=1038)	Infections (n=2058)	Non-infections (n=3940)
fever (3820, 54%)	988 (95%)	1711 (83%)	1121 (28%)
weightLoss (2055, 29%)	350 (34%)	871 (42%)	834 (21%)
abdominalProblem (1594, 23%)	141 (14%)	433 (21%)	1020 (26%)
breathingProblem (1517, 22%)	198 (19%)	526 (26%)	793 (20%)
cough (1442, 20%)	225 (22%)	794 (39%)	423 (11%)
vomit (1227, 17%)	284 (27%)	451 (22%)	492 (12%)
chestPain (937, 13%)	110 (11%)	358 (17%)	469 (12%)
injury (832, 12%)	18 (2%)	44 (2%)	770 (20%)
unconscious (816, 12%)	126 (12%)	183 (9%)	507 (13%)
paralysis (482, 7%)	33 (3%)	55 (3%)	394 (10%)
looseStools (422, 6%)	50 (5%)	278 (14%)	94 (2%)
urinaryProblem (357, 5%)	38 (4%)	71 (3%)	248 (6%)
oedema (341, 5%)	11 (1%)	99 (5%)	231 (6%)
skinProblems (320, 5%)	29 (3%)	164 (8%)	127 (3%)
pregnant (251, 4%)	18 (2%)	26 (1%)	207 (5%)
yellowEyes (176, 3%)	43 (4%)	45 (2%)	88 (2%)
convulsions (130, 2%)	26 (3%)	25 (1%)	79 (2%)
lumps (83, 1%)	5 ( $<1\%$ )	25 (1%)	53 (1%)

