

Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 4064)			
	Malaria (n=5084)	Infections (n=5150)	Non-infections (n=1212)
fever (3376, 29%)	1605 (32%)	1625 (32%)	146 (12%)
vomit (1088, 10%)	527 (10%)	485 (9%)	76 (6%)
difficultyBreathing (894, 8%)	374 (7%)	427 (8%)	93 (8%)
	452 (9%)	372 (7%)	57 (5%)
weightLoss (798, 7%)	306 (6%)	391 (8%)	101 (8%)
cough (782, 7%)	360 (7%)	382 (7%)	40 (3%)
yellowEyes (712, 6%)	401 (8%)	243 (5%)	68 (6%)
convulsion (681, 6%)	397 (8%)	209 (4%)	75 (6%)
looseStools (493, 4%)	156 (3%)	322 (6%)	15 (1%)
unconscious (354, 3%)	163 (3%)	120 (2%)	71 (6%)
abdominalProblem (296, 3%)	68 (1%)	112 (2%)	116 (10%)
neckStiffness (221, 2%)	99 (2%)	106 (2%)	16 (1%)
oedema (169, 1%)	53 (1%)	60 (1%)	56 (5%)
injury (153, 1%)	1 ($<1\%$)	6 ($<1\%$)	146 (12%)
skinRash (133, 1%)	15 ($<1\%$)	91 (2%)	27 (2%)
ulcers (110, 1%)	11 ($<1\%$)	72 (1%)	27 (2%)
chestPain (90, 1%)	34 (1%)	39 (1%)	17 (1%)
difficultySwallowing (72, 1%)	32 (1%)	21 ($<1\%$)	19 (2%)
urinaryProblem (70, 1%)	17 ($<1\%$)	38 (1%)	15 (1%)
paralysis (30, $<1\%$)	4 ($<1\%$)	16 ($<1\%$)	10 (1%)
bleeding (28, $<1\%$)	8 ($<1\%$)	7 ($<1\%$)	13 (1%)
lumps (15, $<1\%$)	1 ($<1\%$)	6 ($<1\%$)	8 (1%)

