

Male Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 1366)				
		Malaria (n=702)	Infections (n=467)	Non-infections (n=177)
abdominalProblem		34 (5%)	21 (4%)	23 (13%)
	bleeding	4 (1%)	2 ($<1\%$)	5 (3%)
	chestPain	14 (2%)	5 (1%)	2 (1%)
	convulsion	166 (24%)	45 (10%)	17 (10%)
	cough	161 (23%)	69 (15%)	5 (3%)
difficultyBreathing		156 (22%)	100 (21%)	20 (11%)
difficultySwallowing		12 (2%)	2 ($<1\%$)	7 (4%)
	fever	687 (98%)	424 (91%)	33 (19%)
	headache	196 (28%)	91 (19%)	10 (6%)
	injury	0 ($<1\%$)	2 ($<1\%$)	75 (42%)
	looseStools	55 (8%)	93 (20%)	2 (1%)
	lumps	0 ($<1\%$)	1 ($<1\%$)	1 (1%)
	neckStiffness	34 (5%)	20 (4%)	0 ($<1\%$)
	oedema	25 (4%)	6 (1%)	9 (5%)
	paralysis	1 ($<1\%$)	0 ($<1\%$)	1 (1%)
	skinRash	8 (1%)	17 (4%)	6 (3%)
	ulcers	7 (1%)	14 (3%)	13 (7%)
	unconscious	71 (10%)	27 (6%)	16 (9%)
urinaryProblem		8 (1%)	7 (1%)	5 (3%)
	vomit	244 (35%)	125 (27%)	13 (7%)
	weightLoss	140 (20%)	87 (19%)	22 (12%)
	yellowEyes	176 (25%)	42 (9%)	15 (8%)