

Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2180)			
	Malaria (n=1168)	Infections (n=811)	Non-infections (n=201)
abdominalProblem	46 (4%)	27 (3%)	42 (21%)
bleeding	5 (<1%)	1 (<1%)	4 (2%)
chestPain	21 (2%)	7 (1%)	5 (2%)
convulsion	295 (25%)	81 (10%)	28 (14%)
cough	241 (21%)	116 (14%)	11 (5%)
difficultyBreathing	237 (20%)	132 (16%)	25 (12%)
difficultySwallowing	15 (1%)	3 (<1%)	11 (5%)
fever	1151 (99%)	735 (91%)	46 (23%)
headache	308 (26%)	154 (19%)	16 (8%)
looseStools	105 (9%)	147 (18%)	3 (1%)
lumps	0 (<1%)	2 (<1%)	3 (1%)
neckStiffness	60 (5%)	24 (3%)	5 (2%)
oedema	28 (2%)	11 (1%)	15 (7%)
paralysis	2 (<1%)	1 (<1%)	5 (2%)
skinRash	8 (1%)	27 (3%)	10 (5%)
ulcers	9 (1%)	22 (3%)	13 (6%)
unconscious	105 (9%)	41 (5%)	26 (13%)
urinaryProblem	7 (1%)	7 (1%)	7 (3%)
vomit	367 (31%)	215 (27%)	18 (9%)
weightLoss	188 (16%)	127 (16%)	25 (12%)
yellowEyes	261 (22%)	59 (7%)	20 (10%)

