

Child (1m–11y) Deaths by Symptom Sierra Leone 2019–2022 (n = 2683)				
		Malaria (n=1382)	Infections (n=923)	Non-infections (n=331)
abdominalProblem		58 (4%)	39 (4%)	46 (14%)
	bleeding	7 (1%)	3 ($<1\%$)	7 (2%)
	chestPain	29 (2%)	14 (2%)	8 (2%)
	convulsion	332 (24%)	91 (10%)	37 (11%)
	cough	301 (22%)	151 (16%)	19 (6%)
	difficultyBreathing	308 (22%)	188 (20%)	40 (12%)
difficultySwallowing		25 (2%)	2 ($<1\%$)	13 (4%)
	fever	1359 (98%)	848 (92%)	60 (18%)
	headache	379 (27%)	180 (20%)	20 (6%)
	injury	1 ($<1\%$)	3 ($<1\%$)	118 (36%)
	looseStools	124 (9%)	181 (20%)	8 (2%)
	lumps	0 ($<1\%$)	2 ($<1\%$)	3 (1%)
	neckStiffness	79 (6%)	31 (3%)	7 (2%)
	oedema	43 (3%)	11 (1%)	21 (6%)
	paralysis	2 ($<1\%$)	1 ($<1\%$)	6 (2%)
	skinRash	12 (1%)	36 (4%)	14 (4%)
	ulcers	10 (1%)	28 (3%)	19 (6%)
	unconscious	132 (10%)	50 (5%)	39 (12%)
urinaryProblem		11 (1%)	11 (1%)	8 (2%)
	vomit	452 (33%)	249 (27%)	30 (9%)
	weightLoss	252 (18%)	170 (18%)	47 (14%)
	yellowEyes	339 (25%)	79 (9%)	29 (9%)