

# Cálculo II

Carlos Gómez-Lobo Hernaiz

# Tema 1. Introducción al espacio de varias variables $\mathbb{R}^n$

## 1 Vectores, producto escalar y distancia

- En  $\mathbb{R}^2$  los puntos,  $p \in \mathbb{R}^2$ , se representan mediante pares ordenados de números reales,  $p = (a, b)$ .  
 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ .
- En  $\mathbb{R}^3$  los puntos,  $p \in \mathbb{R}^3$ , se representan mediante ternas ordenadas de números reales,  $p = (a, b, c)$ .  
 $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$ .
- En  $\mathbb{R}^n$  los puntos,  $p \in \mathbb{R}^n$ , se representan mediante pares ordenados de números reales,  
 $p = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .  
 $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$ .

-Definición: Geométricamente, un **vector** se define como un segmento de recta "orientado" con punto inicial en el origen de coordenadas y punto final en un punto de  $\mathbb{R}^n$ .

\*Observación: Si  $n=3$ , la notación habitual para la base canónica es:  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1, 0)$ ,  $\vec{k} = (0, 0, 1)$ .

### 1.1 Operaciones entre elementos de $\mathbb{R}^n$ : $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

1. Suma:  $\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$
2. Multiplicación por un escalar,  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  $\lambda \vec{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$
3. Producto escalar:  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$   $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$   
 $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$

#### Propiedades

Sean  $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^n$  y  $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$

1. Linealidad:  $(\lambda \vec{x} + \beta \vec{y}) \cdot \vec{z} = \lambda \vec{x} \cdot \vec{z} + \beta \vec{y} \cdot \vec{z}$
2. Conmutativa:  $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle$
3.  $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$  y  $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \iff \vec{x} = \vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$

-Definición: La **norma euclídea** de un vector  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$  (y se escribe  $\|\vec{x}\|$ ) como:  $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}$ .

\* Observación: Sea  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$  tal que  $\|\vec{x}\| = 1$ , se dice que es **unitario**. Sea  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$  un vector no unitario, podemos **normalizarlo**:  
 $\frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} \rightarrow$  vector unitario.

## Significado geométrico de la norma euclídea

La norma  $\|\vec{x}\|$  representa la **longitud** del vector  $\vec{x}$ . Not.:  $long(\vec{x}) = |x| = d(0, x)$ .

## Desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$

$$| \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle | \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| = \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \cdot \left( \sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}$$

Demostración: Tomamos  $a = \vec{y} \cdot \vec{y} = \|\vec{y}\|^2$  y  $b = -\vec{x} \cdot \vec{y}$  y aplicamos propiedades del producto escalar al vector  $a\vec{x} + b\vec{y}$ .

-Si  $a = 0 \Rightarrow \vec{y} = 0$  ✓

-Si  $a \neq 0 \Rightarrow 0 \leq (a\vec{x} + b\vec{y})(a\vec{x} + b\vec{y}) = a^2 \vec{x} \cdot \vec{x} + 2ab\vec{x} \cdot \vec{y} + b^2 \vec{y} \cdot \vec{y} = \|\vec{y}\|^4 \cdot \|\vec{x}\|^2 - 2\|\vec{y}\|^2 (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 + (-\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \cdot \|\vec{y}\|^2 = \|\vec{y}\|^4 \cdot \|\vec{x}\|^2 - \|\vec{y}\|^2 \cdot (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \Rightarrow 0 \leq \|\vec{y}\|^2 \cdot \|\vec{x}\|^2 - (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \Rightarrow (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \leq \|\vec{x}\|^2 \cdot \|\vec{y}\|^2 \Rightarrow |\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$  ✓

-  $\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \leq \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \Rightarrow -1 \leq \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|} \leq 1 \Rightarrow \cos \theta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|} \iff \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \cos \theta$

- Definición: Dos vectores  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$  son **perpendiculares/ortogonales** si y solo si  $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$ .  
Not.:  $\vec{x} \perp \vec{y}$ .

## Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$

Sean  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$  tal que  $\vec{x} \perp \vec{y}$ , entonces:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$$

Demostración:  $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y})(\vec{x} + \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{x} + 2\vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{y} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$  ✓

## Teorema del coseno

Sean  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$  vectores cualesquiera, entonces:

$$\|\vec{x} - \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 - 2\|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \cos \theta$$

Demostración:  $\|\vec{x} - \vec{y}\|^2 = (\vec{x} - \vec{y})(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{x} - 2\vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{y} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 - 2\|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \cos \theta$  ✓

## Propiedades de la norma euclídea

Sea  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$  y  $\lambda \in \mathbb{R}$ :

$$(i) \|\vec{x}\| \geq 0 \text{ y } \|\vec{x}\| = 0 \iff \vec{x} = \vec{0}$$

$$(ii) \|\lambda \vec{x}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{x}\|$$

$$(iii) \text{Desigualdad triangular: } \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

$$(iv) \text{Desigualdad triangular al revés: } \left| \|\vec{x}\| - \|\vec{y}\| \right| \leq \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

Demostraciones:

$$(i) \|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \geq 0 \text{ y } \|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = 0 \iff x_1, x_2, \dots, x_n = 0 \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$$

$$(ii) \|\lambda \vec{x}\| = \left( \sum_{i=1}^n \lambda^2 x_i^2 \right)^{1/2} = \sqrt{\lambda^2} \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} = |\lambda| \|\vec{x}\|$$

$$(iii) \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y})(\vec{x} + \vec{y}) = \vec{x}\vec{x} + 2\vec{x}\vec{y} + \vec{y}\vec{y} \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|\vec{x}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| + \|\vec{y}\|^2 = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2 \Rightarrow \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

-Definición: Una **distancia/métrica** es una función  $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$  tal que cumple:

- (1)  $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- (2)  $d(x, y) = d(y, x)$
- (3)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

-Definición: La **distancia euclídea** entre dos puntos  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  e  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  de  $\mathbb{R}^n$  se define como:

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} = \left( \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2} = \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

- (1)  $\|\vec{x} - \vec{y}\| = 0 \iff \vec{x} = \vec{y}$
- (2)  $\|\vec{x} - \vec{y}\| = \|\vec{y} - \vec{x}\|$
- (3)  $\|\vec{x} - \vec{z}\| \leq \|\vec{x} - \vec{y}\| + \|\vec{y} - \vec{z}\|$

## 2 Conceptos métricos en el espacio euclídeo en $\mathbb{R}^n$

### 2.1 Bolas abiertas y conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$

-Definiciones:

- (1) Dado un punto  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  y un número real  $r > 0$ , llamaremos **bola abierta** de centro  $x_0$  y radio  $r$  (y escribiremos  $B_r(x_0)$  o  $B(x_0, r)$ ) al conjunto:

$$B_r(x_0) \stackrel{\text{not}}{=} B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\}$$

$$n = 1 \rightarrow x_0 \in \mathbb{R} \quad -r < x - x_0 < r$$

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\} = \{x \in \mathbb{R} : x \in (x_0 - r, x_0 + r)\}$$

$$n = 2 \rightarrow (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$$

$$B_r(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|}_{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < r\}$$

$$n = 3 \rightarrow (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$$

$$B_r(x_0, y_0, z_0) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < r\}$$

(2) Decimos que  $A \in \mathbb{R}^n$  es un **conjunto abierto** si  $\forall x_0 \in A \exists r > 0$  tal que  $B_r(x_0) \subset A$ .

(3) Un **entorno** del punto  $x \in \mathbb{R}^n$  es un conjunto abierto que lo contiene.

- Proposición 1: Si  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  y  $r > 0 \Rightarrow$  la bola abierta  $B_r(x_0)$  es un conjunto abierto.

Demostración:  $\forall x \in B_r(x_0) \exists s \in \mathbb{R}, s > 0$  tal que  $B_s(x) \subset B_r(x_0)$ .

$$\begin{aligned} \text{Basta con tomar } s &= r - \|x - x_0\|, \text{ entonces } \forall y \in B_s(x) \quad \|y - x_0\| = \\ &= \|y - x + x - x_0\| \leq \|y - x\| + \|x - x_0\| < s + \|x - x_0\| = r - \|x - x_0\| + \|x - x_0\| = r \end{aligned}$$

Ejemplo: Demostrar que  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$  es un conjunto abierto.

$\forall (x_0, y_0) \in A \exists r : B_r(x_0, y_0) \subset A$ , es decir,  $y_0 > 0$

Basta con tomar  $r = y_0 > 0$ .

$$\begin{aligned} \forall (a, b) \in B_r(x_0, y_0) &\Rightarrow (a, b) \in A, \text{ es decir, } b > 0? \text{ Como } (a, b) \in B_r(x_0, y_0) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \|(a, b) - (x_0, y_0)\| < r = y_0 \Rightarrow (a - x_0)^2 + (b - y_0)^2 < y_0^2 \Rightarrow (b - y_0)^2 < y_0^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow -y_0 < b - y_0 < y_0 \Rightarrow 0 < b < 2y_0 \Rightarrow b > 0 \Rightarrow (a, b) \in A \end{aligned}$$

- Proposición 2: La unión (finita o infinita) de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.

- Proposición 3: La intersección finita de abiertos es un conjunto abierto.

\* Observación: La intersección finita de abiertos no es, en general, un abierto.

Demostración:  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  conjuntos abiertos y  $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$ . ¿A es un conjunto abierto?

$$\begin{aligned} \text{Dado } x \in A &\Rightarrow x \in A_1, x \in A_2, \dots, x \in A_n \Rightarrow \exists r_1, r_2, \dots, r_n \text{ tal que } B_{r_1}(x) \subset A_1, B_{r_2}(x) \subset \\ &\subset A_2, \dots, B_{r_n}(x) \subset A_n, \text{ tomando } r \leq \min\{r_i\}_{i=1}^n \Rightarrow B_r(x) \subset \bigcap_{i=1}^n A_i = A. \end{aligned}$$

## 2.2 Límites de sucesiones en $\mathbb{R}^n$ . Completitud.

-Definición: Una **sucesión en  $\mathbb{R}^n$**  es una colección de n sucesiones en  $\mathbb{R} : \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \{(a_1^k, a_2^k, \dots, a_n^k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ .

$$\text{Ejemplos: } \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \left\{ \left( k, \frac{1}{k^2}, e^{-k} \right) \right\}_{k \in \mathbb{N}}; \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \left\{ \left( \frac{3k^2}{k^2-1}, \frac{1}{k}, \log \frac{k+1}{k} \right) \right\}_{k \in \mathbb{N}}.$$

-Definición: Dada una sucesión  $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^n$  y un punto  $L \in \mathbb{R}^n$ , diremos que el límite de  $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  es  $L$  y escribimos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = L \iff \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \|A_k - L\| < \epsilon \quad \forall k > N, \text{ es decir, } \forall k > N \quad A_k \in B_\epsilon(L)$$

• Lema: Dada una sucesión en  $\mathbb{R}^n : \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \{(a_1^k, a_2^k, \dots, a_n^k)\}_{k \in \mathbb{N}}$  y un punto  $L = (l_1, l_2, \dots, l_n) \in \mathbb{R}^n$ , se tiene:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = L \iff \lim_{k \rightarrow \infty} a_i^k = l_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Demostración:

$\Rightarrow$ ) Queremos ver que  $\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : |a_i^k - l_i| < \epsilon \quad \forall k > N \forall i = 1, 2, \dots, n$ .

$$|a_i^k - l_i| = \sqrt{(a_i^k - l_i)^2} \leq \sqrt{(a_1^k - l_1)^2 + (a_1^k - l_2)^2 + \dots + (a_i^k - l_i)^2 + \dots + (a_n^k - l_n)^2} = \|A_k - L\| \leq \epsilon \quad \checkmark$$

$\Leftarrow$ ) Como  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_i^k = l_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$ , sabemos que  $\forall \epsilon > 0 :$

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} \text{ tal que } |a_1^k - l_1| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \quad \forall k > N_1$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \text{ tal que } |a_2^k - l_2| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \quad \forall k > N_2$$

$\vdots$

$$\exists N_n \in \mathbb{N} \text{ tal que } |a_n^k - l_n| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \quad \forall k > N_n$$

Entonces,  $\forall k \geq \max\{N_1, N_2, \dots, N_n\}$  tenemos simultáneamente que  $|a_i^k - l_i| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$ , por tanto:

$$\|A_k - L\| = \sqrt{(a_1^k - l_1)^2 + (a_1^k - l_2)^2 + \dots + (a_i^k - l_i)^2 + \dots + (a_n^k - l_n)^2} \leq \sqrt{n \left( \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \right)^2} = \epsilon \quad \checkmark$$

Ejemplo: Hallar el límite  $\lim_{k \rightarrow \infty} \left\{ \left( \frac{\log x}{x^2}, \frac{x^2-1}{5x^2} \right) \right\}_{k \in \mathbb{N}}$ .

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log k}{k^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/k}{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k^2} = 0 \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2-1}{5x^2} = \frac{1}{5} \end{array} \right\} \lim_{k \rightarrow \infty} \left\{ \left( \frac{\log x}{x^2}, \frac{x^2-1}{5x^2} \right) \right\} = (0, 1/5)$$

-Definición: La **propiedad de completitud** dice que toda sucesión de Cauchy converge en el espacio.

-Definición: Una sucesión  $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  es de **Cauchy** en  $\mathbb{R}^n$  si  $\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \|A_{k_1} - A_{k_2}\| < \epsilon \quad \forall k_1, k_2 > N$ .

• Teorema: El espacio euclídeo  $\mathbb{R}^n$  es **completo**, es decir, toda sucesión de Cauchy es convergente.

Demostación: Pendiente como ejercicio.

## 2.3 Más sobre la topología de $\mathbb{R}^n$

-Definición: Sea  $A$  un conjunto de  $\mathbb{R}^n$ . Diremos que un punto  $x \in A$  es un **punto interior** de  $A$  si  $\exists r > 0$  tal que  $B_r(x) \subset A$ . Al conjunto de puntos interiores de  $A$  se le denota  $\overset{\circ}{A} \stackrel{\text{not}}{=} \text{int}(A)$ .

Ejemplo 1: Dado  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n : |x| < 1, |y| \leq 1\}$ , hallar  $\overset{\circ}{A}$ .

$$1) \quad \forall (x, y) \in A : |y| = 1 \Rightarrow (x, \pm 1) \quad (\text{con } |x| < 1) \quad (x, 1) \in A, \forall r > 0 \rightarrow (x, 1 + r/2) \overset{?}{\notin} A \quad |1 + r/2| =$$

$$= 1 + r/2 > 1 \Rightarrow B_r(x, 1) \not\subset A$$

$$2) \forall (x, y) \in A \quad |x|, |y| < 1:$$

$$* \left. \begin{array}{ll} r \leq 1 - |x| & \text{donde } |y| \leq |x| \\ r \leq 1 - |y| & \text{donde } |x| \leq |y| \end{array} \right\} \text{ en cualquier caso } r = 1 - \max\{|x|, |y|\} = \min\{1 - |x|, 1 - |y|\}$$

Tenemos que ver que  $B_r(x, y) \subset A$ , es decir,  $\forall (a, b) \in B_r(x, y)$  se tiene que  $|a| < 1$  y  $|b| \leq 1 \Rightarrow (a, b) \in A$

$$|a| = |a - x + x| \stackrel{\text{D.T.}}{\leq} \underbrace{|a - x|}_{\sqrt{(a-x)^2}} + |x| \leq \underbrace{\|(a, b) - (x, y)\|}_{\sqrt{(a-x)^2 + (b-y)^2}} + |x| < r + |x| \stackrel{*}{\leq} 1 - |x| + |x| = 1$$

$$|b| = |b - y + y| \stackrel{\text{D.T.}}{\leq} |b - y| + |y| < r + |y| \leq 1 - |y| + |y| = 1$$

$$\forall (a, b) \in B_r(x, y) \text{ se tiene que } (a, b) \in A \checkmark$$

• Propiedades:

(1)  $\mathring{A}$  es un conjunto abierto.

(2)  $\mathring{A} \subset A$ .

(3) Si  $A$  es un conjunto abierto, entonces  $\mathring{A} = A$ .

-Definición: Diremos que un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^n$  es un **conjunto cerrado** si su complementario  $C^c \subset \mathbb{R}^n$ , es un conjunto abierto.

Ejemplo 2: Demostrar que la bola  $C = \{(x, y) : \underbrace{x^2 + y^2}_{\|(x, y)\|^2} \leq R^2\} \leq R\}$  es un conjunto cerrado en  $\mathbb{R}^2$ .

$C$  cerrado en  $\mathbb{R}^2$  si  $C^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{x^2 + y^2}_{\|(x, y)\|^2} > R^2\}$  es un conjunto abierto en  $\mathbb{R}^2$ , es decir,

$$\forall (x_0, y_0) \in C^c \quad \exists r > 0 : B_r(x_0, y_0) \subset C^c.$$

Tomamos  $r = \|(x_0, y_0)\| - R \Rightarrow \forall (a, b) \in B_r(x_0, y_0)$ ,  $a, b \in C^c$ , es decir,  $\|(a, b)\| > R$

$$\begin{aligned} \|(x_0, y_0)\| &= \|(x_0, y_0) - (a, b) + (a, b)\| \stackrel{\text{D.T.}}{\leq} \underbrace{\|(x_0, y_0) - (a, b)\|}_{< r = \|(x_0, y_0)\| - R} + \|(a, b)\| < \|(x_0, y_0)\| - R + \|(a, b)\| \Rightarrow \\ \Rightarrow \|(x_0, y_0)\| &< \|(x_0, y_0)\| - R + \|(a, b)\| \Rightarrow R < \|(a, b)\| \checkmark \end{aligned}$$

• Proposición 1:

(i) La unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.

(ii) La intersección (infinita o finita) de conjuntos cerrados, es un conjunto cerrado.

\* Observación: La unión infinita de conjuntos cerrados no es, en general, un conjunto cerrado.

$$\text{-Bolas } \mathbf{abiertas} \text{ en } \mathbb{R}^2 : B_R(x_0, y_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}_{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|^2} < R^2\}$$

$$\text{-Bolas } \mathbf{cerradas} \text{ en } \mathbb{R}^2 : \overline{B_R(x_0, y_0)} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}_{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|^2} \leq R^2\}$$

\* Observación 1: No todos los conjuntos de  $\mathbb{R}^n$  son necesariamente abiertos o cerrados.

\* Observación 2: El vacío y  $\mathbb{R}^n$  (por convención) son abiertos y cerrados al mismo tiempo.

• Proposición 2 (Caracterización de los conjuntos cerrados por sucesiones):

$$C \subset \mathbb{R}^n \text{ es un cerrado} \iff \forall A_{k \in \mathbb{N}} \subset C \text{ con } \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = L \text{ se tiene que } L \in C$$

Demostación: Argumentamos (en ambas implicaciones) por reducción al absurdo:

$\Rightarrow$  ) Supongamos que  $L \notin C \Rightarrow L \in C^c$  abierto  $\Rightarrow \exists r > 0$  tal que  $B_r(L) \subset C^c$ . Como  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = L$ ,  $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$  tal que  $|A_k - L| > \epsilon \forall k > N$ , es decir,  $A_k \in B_\epsilon(L) \forall k > N$ . Si tomamos  $\epsilon = r : A_k \in B_r(L)$

Contradicción  $A_k \in C$  y  $B_r(L) \subset C^c$

$\Leftarrow$  ) Supongamos que  $C$  no es un cerrado  $\Rightarrow C^c$  no es un abierto  $\Rightarrow \exists x_0 \in C^c$  tal que  $\forall r > 0$   $B_r(x) \not\subset C^c$ , es decir,  $B_r(x_0) \cap C \neq \emptyset \forall r > 0$ . Tomamos  $r = \frac{1}{k} \Rightarrow B_{1/k}(x_0) \cap C \neq \emptyset \Rightarrow \exists \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset B_{1/k} \cap C, \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \rightarrow x_0 \in C$

Contradicción  $x_0 \in C^c$ .

-Definición: Sea  $C$  un conjunto cualquiera en  $\mathbb{R}^n$  y  $x \in \mathbb{R}^n$ , diremos que  $x$  es un **punto de adherencia** o **clausura** de  $C$  si  $\forall r > 0 \ B_r(x) \cap C \neq \emptyset$  y el conjunto de puntos que cumplen esta condición se denota:

$$\overline{C} = \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r > 0 \ B_r(x) \cap C \neq \emptyset\}$$

Propiedades:

(1)  $\overline{C}$  es un conjunto cerrado.

(2)  $C \subset \overline{C}$ .

(3) Si  $C$  es cerrado  $C = \overline{C}$ .

Ejemplo 3: Sea  $C = \left\{ \left( \frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) \right\}_{k \in \mathbb{N}}$  probar que  $C \in \overline{C}$ .

$$\lim_{k \rightarrow 0} \left( \frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) = (0, 0) \Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists N \text{ tal que } \left\| \left( \frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) - (0, 0) \right\| < \epsilon \forall k > N.$$

$$\text{Basta tomar } r = \epsilon \Rightarrow \left( \frac{1}{k}, \frac{1}{k} \right) \in B_\epsilon(0, 0) \forall k \geq N \Rightarrow C \cap B_r(0, 0) \neq \emptyset$$

-Definición: Sea  $C$  un conjunto cualquiera de  $\mathbb{R}^n$  y  $x \in \mathbb{R}^n$ . Diremos que  $x$  es un **punto de acumulación** de  $C$  si  $\forall r > 0 \ B_r(x) \setminus \{x\} \cap C \neq \emptyset$ . A los puntos de acumulación se los denota por  $C'$ .

Propiedades:

(1)  $C' \subset \overline{C}$

(2) En general  $\overline{C} \not\subset C'$



-Definición: Los puntos de adherencia que no son de acumulación ( $\overline{C} \setminus C'$ ) se llaman **puntos aislados**, es decir,  $x \in \mathbb{R}^n$  es un punto aislado de un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^n$  si  $\exists r > 0$  tal que  $B_r(x) \cap C = \{x\}$ .

-Definición: Sea  $C \subset \mathbb{R}^n$ , diremos que un punto  $x \in \mathbb{R}^n$  es un **punto frontera** de  $C$  si  $\forall r > 0$  se tiene que  $B_r(x) \cap C \neq \emptyset$  y  $x \notin \overset{\circ}{C}$ . A este conjunto de puntos se le denota por  $\partial C$ .

-Definición: Un conjunto cualquiera  $C \subset \mathbb{R}^n$  está **acotado** si  $\exists M \in \mathbb{R}, M > 0$  tal que  $\forall x \in C$  se tiene que  $\|x\| < M$ , es decir,  $C \subset B_M(0, \dots, 0)$ .

-Definición: Un **recubrimiento numerable por abiertos** de un conjunto  $S \subset \mathbb{R}^n$  es una colección numerable de abiertos  $\{A_i\}$  tal que  $S \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ .

-Definición: Un conjunto es **compacto** si para todo recubrimiento por abiertos del conjunto se puede extraer un subrecubrimiento finito.

• Teorema de Heine-Borel:  $C \subset \mathbb{R}^n$  es compacto  $\iff C$  es cerrado y acotado en  $\mathbb{R}^n$ .

Ejemplo 1:  $B_r(x_0, y_0)$  no compactos (n son cerrados).

Ejemplo 2:  $\overline{B_r(x_0, y_0)}$  si son compactos.

Ejemplo 3:  $S = \left\{ \left( \frac{(-1)^k}{k}, \frac{1}{k^2} \right) \right\}_{k \in \mathbb{N}}$

Por la proposición 2, como  $\lim_{k \rightarrow \infty} \left( \frac{(-1)^k}{k}, \frac{1}{k^2} \right) = (0, 0)$  y  $(0, 0) \notin S$ , no es cerrado y por el teorema de Heine-Borel no es compacto.

Ejemplo 4:  $S = \{(k, k^2 + 1)\}_{k \in \mathbb{N}}$  no está acotado, por tanto por el teorema de Heine-Borel tampoco es compacto.

• Teorema de Bolzano-Weierstrass: Si  $C$  es un conjunto de infinitos elementos y acotado  $\Rightarrow C' \neq \emptyset$ . Es decir, toda sucesión  $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  definida en un compacto  $C$  posee una subsucesión convergente en  $C$ .

## 2.4 Funciones de varias variables y superficies de nivel

-Definición: Llamamos **función de varias variables** a la función:

$$\begin{array}{c} f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n)) \end{array}$$

Si  $m > 1$ , entonces  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$  y se llama **función escalar**.

Si  $m > 1$ , entonces se llama **función vectorial**.

-Definición: Sea  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , llamaremos **gráfica** de  $f$  al subconjunto de  $\mathbb{R}^{n+1}$  :  
 $(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)) \in \mathbb{R}^{n+1}$ .

-Definición: Sea  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y  $C \in \mathbb{R}$ , el **conjunto de nivel** del valor  $C$  son los puntos :  
 $\{x \in D : f(x) = C\}$ .

$n = 2$  : curvas de nivel.

$n = 3$  : superficies de nivel.

Ejemplo 1: Usando curvas de nivel. describir la gráfica  $f(x, y) = x^2 + y^2$ .

Curvas de nivel:  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = C, C \geq 0\}$

$C = 0 \rightarrow x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow (x, y) = 0$

$C = 1 \rightarrow x^2 + y^2 = 1^2 \Rightarrow$  Circunferencia de radio 1

$C = 4 \rightarrow x^2 + y^2 = 2^2 \Rightarrow$  Circunferencia de radio 2

$C = 9 \rightarrow x^2 + y^2 = 3^2 \Rightarrow$  Circunferencia de radio 3

Ejemplo 2: Describir las superficies de nivel de  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

Superficies de nivel:  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = C, C \geq 0\} =$  esferas de radio  $\sqrt{C}$ .

## Tema 2. Cálculo diferencial en varias variables

### 1 Límites y continuidad

#### 1.1 Límites

-Definición: Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto abierto,  $x_0 \in A'$  y  $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función escalar. Dado  $L \in \mathbb{R}$  diremos que el **límite** de  $f(x)$  es  $L$  cuando  $x$  tiende a  $x_0$ :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \quad \forall x \in A$$

O lo que es lo mismo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall x \in B_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in B_\epsilon(L)$$

Ejemplo 1: Demuestra, usando la definición, que  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2x^2 + y^2 = 0$ .

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Rightarrow |(2x^2 + y^2) - 0| < \epsilon$$

$$\underbrace{\sqrt{x^2 + y^2} < \delta}_{x^2 + y^2 < \delta^2} \Rightarrow |2x^2 + y^2| < 2(x^2 + y^2) < 2\delta^2 < \epsilon, \text{ por tanto bastará con tomar } \delta < \sqrt{\frac{\epsilon}{2}}.$$

Ejemplo 2: Demuestra, usando la definición, que  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} = 0$ .

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \underbrace{\|(x,y) - (0,0)\| < \delta}_{\sqrt{x^2+y^2} < \delta} \Rightarrow \left| \frac{5x^2y}{x^2+y^2} \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{5x^2y}{x^2+y^2} \right| \leq \left| \frac{5x^2y}{x^2} \right| = \underbrace{|5y|}_{5\sqrt{y^2}} \leq 5 \underbrace{\|(x,y) - (0,0)\|}_{\sqrt{x^2+y^2}} < 5\delta < \epsilon, \text{ por tanto bastará con tomar } \delta < \frac{\epsilon}{5}.$$

• Teorema: El límite de una función  $f(x)$ , si existe, es único.

Demostración:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 \neq L_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

$$2\epsilon < |L_1 - L_2| = |L_1 - f(x) + f(x) - L_2| \leq \underbrace{|L_1 - f(x)|}_{< \epsilon} + \underbrace{|f(x) - L_2|}_{< \epsilon} < 2\epsilon$$

Contradicción:  $2\epsilon < 2\epsilon$

Propiedades: Sean  $f, g : A(\text{abierto}) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$ :

- (1)  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L_1 \pm L_2$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$
- (3)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$  si  $L_2 \neq 0$  y  $g(x) \neq 0$  en un entorno de  $x_0$ .
- (4)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \lambda f(x) = \lambda L_1$
- (5)  $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = L_1^{L_2}$  si tiene sentido.

\* Observación: Si  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Rightarrow f(x)$  está acotada en un entorno de  $x_0$ .

Demostración:  $|f(x)| - L \leq |f(x) - L| < \epsilon \Rightarrow |f(x)| \leq L + \epsilon$

• Proposición 1: Sea  $f : A(\text{abierto}) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función vectorial,  $x_0 \in A'$  y  $L \in \mathbb{R}^m$ , entonces:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = l_i}$$

$$\begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)) \\ L = (l_1, l_2, \dots, l_m) \end{cases}$$

• **Proposición 2:** "Caracterización de límites de funciones por sucesiones"

Sea  $f : A(\text{abierto}) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in A'$  y  $L \in \mathbb{R}$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \forall \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in A \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \text{ y } x_k \neq x_0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = L$$

Demostración:

$\Rightarrow$ )  $\forall \{x_k\}$  tal que  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ , ¿se tiene que  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = L$ ?

Por convergencia de sucesiones tenemos que  $\forall \epsilon_1 > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} : \|x_k - x_0\| < \epsilon_1 \quad \forall k \geq N_1$ , tomando  $\epsilon_1 = \delta \Rightarrow |f(x_k) - L| < \epsilon$ .

$\Leftarrow$ ) Argumentamos por reducción a lo absurdo.

Suponemos que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq L$ , es decir,  $\exists \epsilon_2 > 0$  tal que  $\forall \delta > 0$  se tiene que  $\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon_2$  (es decir,  $f(b_\delta) \cap B_{\epsilon_2}(L) \neq \emptyset$ ).

Se cumple  $\forall \delta$ , en particular para  $\delta = \left\{\frac{1}{k}\right\} \Rightarrow$  tomamos una sucesión  $\{x_k\} \in b_{1/k}(x_0)$  tal que  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \Rightarrow |f(x_k) - L| < \epsilon$

Contradicción:  $(II \Rightarrow I)$ .

\* Observación: La caracterización de límites por sucesiones será muy útil para demostrar la NO existencia de límites, encontrando dos sucesiones con límites diferentes.

## 1.2 Continuidad

-Definición: Una función  $f : A(\text{abierto}) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es **continua** en  $x_0 \in A$  si:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Es decir:

$$(1) \exists f(x_0)$$

$$(2) \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$(3) f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

\* Observación: Una función vectorial  $f : A(\text{abierto}) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es continua  $\iff f_i$  es continua  $\forall i = 1, 2, \dots, m$ .

Propiedades: Sean  $f$  y  $g$  funciones continuas en  $x_0$ , entonces:

$$(1) (f \pm g)(x) \text{ es continua en } x_0.$$

$$(2) (\lambda f)(x) \text{ es continua en } x_0 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$(3) (f \cdot g)(x) \text{ es continua en } x_0.$$

(4)  $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$  es continua en  $x_0$  si  $g(x_0) \neq 0$ .

(5)  $[f(x)]^{g(x)}$  es continua en  $x_0$  si tiene sentido.

• Proposición 1: "Caracterización de las funciones continuas por sucesiones"

Sea  $x_0 \in A$  y  $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f \text{ continua en } x_0 \iff \forall \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \text{ y } x_k \neq x_0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(x_0)$$

Ejemplo 1: ¿Es continua en  $\mathbb{R}^2$  la siguiente función  $f$ ?:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(1)  $f(0, 0) = 0$

(2)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} = 0$

(3)  $f(0, 0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$

$f(x, y)$  es continua en todo  $\mathbb{R}^2$ .

• Teorema: Sean  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ :

$$f(x) \text{ continua en } x_0 \in \mathbb{R}^n \text{ y } g(y) \text{ continua en } f(x_0) \in \mathbb{R}^m \Rightarrow (g \circ f)(x) \text{ continua en } x_0$$

### 1.3 Conjuntos abiertos, cerrados y funciones continuas

-Definición: Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $X \subset \mathbb{R}^n$  e  $Y \subset \mathbb{R}^m$ , se define la **imagen inversa** o **preimagen** del conjunto  $Y$  mediante la función  $f$  como:

$$f^{-1}(Y) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \in Y\}$$

Propiedades:

(1) Si  $X = f^{-1}(Y) \Rightarrow f(X) \subset Y \Rightarrow f(f^{-1}(Y)) \subset Y$

$$\text{Ejemplo: } f = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f^{-1}(\underbrace{[0, 2]}_Y) : \underbrace{[0, \infty)}_X \Rightarrow f([0, +\infty)) = 1 \subset [0, 2]$$

(2) Si  $Y = f(X) \Rightarrow X \subset f^{-1}(Y) \Rightarrow X \subset f^{-1}(f(X))$

Ejemplo:  $f(x) = x^2$

$$f(\{2\}) = 4 \Rightarrow \{2\} \subset f^{-1}(\{4\}) = \{2, 2\}$$

Ejemplo 1:  $f = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

$$f^{-1}(\{1\}) = [0, +\infty) \quad f^{-1}(\{-1\}) = (-\infty, 0)$$

$$f^{-1}([-1, 1]) = \mathbb{R} \quad f^{-1}([0, 2]) = [0, +\infty)$$

$$f^{-1}([-2, 0]) = (-\infty, 0)$$

Ejemplo 2: Sea  $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 4$  ¿ $f^{-1}(\{3\})$ ,  $f^{-1}([-\infty, 0])$ ?

$$f^{-1}(\{3\}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 = 1\} \rightarrow \text{Elipse de altura } z = 1$$

$$f^{-1}((-\infty, 0]) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 \leq 4\} \rightarrow \text{Elipses de alturas desde 0 hasta -4.}$$

Esto tiene sentido dado que la función forma un paraboloide elíptico.

• Teorema 1: Dada  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ :

$$f \text{ es continua} \iff \forall V \subset \mathbb{R}^m \text{ abierto} : f^{-1}(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es abierto}$$

Demostación:  $\Rightarrow$  Hipótesis  $\begin{cases} \text{(I)} \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(B_\delta(x)) \subset B_\epsilon(f(x)) \\ \text{(II)} \forall y \in V \subset \mathbb{R}^m \exists \delta > 0 : B_\delta(y) \subset V \subset \mathbb{R}^m \end{cases}$

¿ $f^{-1}(V)$  abierto en  $\mathbb{R}^n$ , es decir,  $\forall x \in f^{-1} \exists r > 0 : B_r(x) \subset f^{-1}(V)$ ?

$$\forall x \in f^{-1}(V) \exists y \in V : y = f(x) \subset V \xrightarrow{I} \epsilon = \delta \Rightarrow B_\epsilon(f(x)) \subset V.$$

Por II  $f(B_\delta(x)) \subset B_\epsilon(f(x)) \in V$  y tomamos preimágenes  $B_\delta(x) \overset{\text{Prop. (2)}}{\subset} f^{-1}(f(B_\delta(x))) \subset f^{-1}(B_\epsilon(f(x))) \subset f^{-1}(V)$ .

Basta con  $r = \delta$ . ✓

$\Leftarrow$ ) Hipótesis: Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  se tiene que  $V \in \mathbb{R}^m$  abierto  $\Rightarrow f^{-1}(V)$  abierto en  $\mathbb{R}^n$ .

¿ $f$  es continua, es decir,  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(B_\delta(x)) \subset B_\epsilon(f(x))$ ?

$$\forall x \in f^{-1}(V) \subset \mathbb{R}^n \exists y \in V \subset \mathbb{R}^m : y = f(x) \text{ y } B_\epsilon(f(x)) \text{ abierto en } \mathbb{R}^m \xrightarrow{\text{hip.}} f^{-1}(\underbrace{B_\epsilon(f(x))}_V) \text{ abierto en } \mathbb{R}^n.$$

$$\exists r : B_r(x) \subset f^{-1}(B_\epsilon(f(x))) \text{ tenemos } r = \delta : B_\delta(x) \subset f^{-1}(B_\epsilon(f(x))) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(B_\delta(x)) \subset f(f^{-1}(B_\epsilon(f(x)))) \overset{\text{Prop. (1)}}{\subset} B_\epsilon(f(x)). \quad \checkmark$$

Ejemplo 1:  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^3 - 4y^2 + z^2 = 5\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = 5\} =$   
 $= f^{-1}(\underbrace{\{5\}}_{\text{cerrado}}) \xrightarrow{T.2} A \text{ es un cerrado.}$

Ejemplo 2:  $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 < 1 + \cos y\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 - \cos y < 1\} =$   
 $= f^{-1}((-\infty, 1)) \Rightarrow B \text{ es un abierto en } \mathbb{R}^2.$

Ejemplo 3:  $f(x) = 7, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(\underbrace{(-\infty, +\infty)}_{\text{abierto}}) = \{7\} \rightarrow \text{cerrado}.$$

Ejemplo 4: Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua en  $[a, b] \Rightarrow G(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b]\}$  es un cerrado.

Usamos la caracterización de cerrados por sucesiones.

Sea  $\{A_k\} = \{(x_k, y_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$  tal que  $y_k = f(x_k)$  y  $x_k \in [a, b]$  (¡cerrado!) :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{A_k\} = (x_0, y_0) \stackrel{?}{\in} G(f).$$

Como  $\lim_{k \rightarrow \infty} \{A_k\} = (x_0, y_0) \Rightarrow \|(x_k, y_k) - (x_0, y_0)\| < \epsilon \Rightarrow (x_k - x_0) + (y_k - y_0) \rightarrow 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \in [a, b] \\ \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = y_0 \xrightarrow{f \text{ cont}} f(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{(x_k, \underbrace{f(x_k)}_{\in G(f)})\} = \{(x_0, f(x_0)) : x_0 \in [a, b]\} \ni G(f) \rightarrow \text{cerrado}. \checkmark$$

- Teorema 2: Dada  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ :

$$f \text{ es continua} \iff \forall C \subset \mathbb{R}^m \text{ cerrado} : f^{-1}(C) \subset \mathbb{R}^n \text{ es cerrado}$$

Demostración: Es igual que la del Teorema 1 pero usando la premisa de que un conjunto es cerrado si su complementario es abierto.

## 2 Diferencial, derivadas parciales y gradiente

En  $\mathbb{R}$  se tiene que:

$$\text{Derivabilidad} \Rightarrow \text{Continuidad}$$

### 2.1 Derivadas parciales

-Definición: Sea  $f : U \text{ (abierto)} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , definimos la **derivada parcial i-ésima** de  $f$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ , como la derivada de  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  respecto a la variable  $x_i$ , manteniendo fijas el resto de variables, es decir:

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h}$$

Notación en  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{R}^3$ :

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \stackrel{\text{not}}{=} f_x(x, y), \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \stackrel{\text{not}}{=} f_y(x, y)$$

$$\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x} \stackrel{\text{not}}{=} f_x(x,y,z), \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y} \stackrel{\text{not}}{=} f_y(x,y,z), \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial z} \stackrel{\text{not}}{=} f_z(x,y,z)$$

Ejemplo: Hallar las derivadas parciales de la función  $f(x,y) = x^2 + y^4$  en el punto  $(1,0)$ .

$$\left. \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \right|_{(1,0)} = 2x|_{(1,0)} = 2$$

$$\left. \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \right|_{(1,0)} = 4y^3|_{(1,0)} = 0$$

Interpretación geométrica:  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Fijamos  $y = y_0$  e intersecamos dicho plano con la gráfica  $z = f(x,y)$  y obtenemos una curva  $C(x)$ .

$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$  es la pendiente de la recta tangente a la curva  $C(x)$  en el punto  $(x_0, y_0)$ .

\* Observación: La existencia de derivadas parciales no garantiza que el plano tangente sea "bueno", es decir, que sea una buena aproximación a la curva:

En  $\mathbb{R}^n, n > 1, \exists$  derivadas parciales  $\nRightarrow$  Continuidad.

## 2.2 Diferenciación

Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , para que la función sea diferenciable tiene que existir un plano que se aproxime muy bien a la curva en el punto  $(x_0, y_0)$ , es decir:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - \overbrace{(ax + by + c)}^{\text{plano}}}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} = 0 \quad \text{¿} a, b, c \text{?}$$

De esta forma estamos "pidiendo" al numerador que se acerque a cero más rápido que el denominador, es decir, que el plano se acerque a la curva más rápido de lo que lo hace hacer  $x$  e  $y$  al punto.

(1) En  $(x_0, y_0) \rightarrow z = f(x_0, y_0)$  siendo  $z$  el plano y  $f(x_0, y_0)$  la gráfica.  $f(x_0, y_0) = ax_0 + by_0 + c \Rightarrow c = f(x_0, y_0) - ax_0 - by_0$ .

(2) Con  $y = y_0$  la pendiente de la gráfica  $f(x, y)$  en  $(x_0, y_0)$  es "a"  $\Rightarrow a = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$ .

(3) De igual forma  $b = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$ . (3)

De (1), (2), y (3) obtenemos la ecuación del plano tangente a la curva:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$



Por tanto, la condición de diferenciabilidad para la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  es:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} = 0$$

Ejemplo: Hallar el plano tangente a la gráfica  $z = x^2 + y^4$  en el punto  $(1, 0, 1)$  y comprobar que es diferenciable en dicho plano.

$$i) \frac{\partial f}{\partial x} = 2x|_{(1,0)} = 2 \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3|_{(1,0)} = 0 \Rightarrow z = 1 + 2(x-1) - 0 \cdot (y-0) \Rightarrow z = 2x - 1$$

$$ii) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x,y) - f(1,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(1,0)(x-1) - \frac{\partial f}{\partial y}(1,0)(y-0)}{\|(x,y) - (1,0)\|} \stackrel{?}{=} 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x^2+y^4) - 1 - 2x + 2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x^2+y^4) - (2x-1)}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{(x-1)^2 + y^4}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}}$$

Ahora comprobamos si da 0 a partir de la definición de límite.

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \|(x,y) - (1,0)\| < \delta \Rightarrow \left| \frac{(x-1)^2 + y^4}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} - 0 \right| < \epsilon$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{(x-1)^2 + y^4}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} - 0 \right| &\leq \frac{(x-1)^2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} + \frac{y^4}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} \leq \frac{(x-1)^2 + y^2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} + \frac{[(x-1)^2 + y^2]^3}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} \leq \\ &\leq \sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{[(x-1)^2 + y^2]^3} < \delta + \underbrace{\delta^2}_{< \delta} < 2\delta \end{aligned}$$

Bastará con tomar  $\delta < \epsilon/2$ .

-Definición: Sea  $U$  un abierto en  $\mathbb{R}^n$  decimos que  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  es **diferenciable** en un punto  $x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n) \in U$  si existen todas las derivadas parciales de  $f$  en  $x_0$ , y se cumple:

$$Df(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

\* Observación: A  $Df(x_0)$ , además de derivada de  $f$  en  $x_0$ , también se le llama **matriz jacobiana** de  $f$  en  $x_0$ .

-Definición: Un caso particular de  $Df$  es cuando  $m = 1$ , es decir, el conjunto de llegada de la función es  $\mathbb{R}$ . A esta matriz jacobiana se le llama **gradiente** y se denota:

$$\vec{\nabla} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

- Teorema: Sea  $U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  es diferenciable en  $x_0 \in U \Rightarrow f$  es continua en un entorno del punto  $x_0 \in U$ .

Demostración:  $\lim_{x \rightarrow x_0} \|f(x) - f(x_0)\| = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - Df(x_0)(x - x_0) + Df(x_0)(x - x_0)\| \cdot \|x - x_0\|}{\|x - x_0\|} \stackrel{\text{D. T.}}{\leq}$

0 por ser diferenciable

$\stackrel{\text{D. T.}}{\leq} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - Df(x_0)(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} \|x - x_0\| + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|Df(x_0)(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} \|x - x_0\| =$

$= \lim_{x \rightarrow x_0} \|Df(x_0)(x - x_0)\| = \lim_{x \rightarrow x_0} \underbrace{\|Df(x_0)\|}_{\text{es un número}} \|x - x_0\| \stackrel{0}{=} 0$

- Teorema 1: Sea  $U \subset \mathbb{R}^n$  un abierto y  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ :

$f \text{ diferenciable} \Rightarrow f \text{ continua}$

- Teorema 2: Sea  $U \subset \mathbb{R}^n$  un abierto,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $x_0 \in U$ , si  $\exists \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x_0) \forall i = 1, \dots, n \forall j = 1, \dots, m$  y son continuas en un entorno de  $x_0$ , entonces  $f(x)$  es diferenciable en  $x_0$ .

Ejemplo:  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

- (i) Probar que es continua en todo  $\mathbb{R}^2$  (en el origen).
- (ii) Probar que es diferenciable en todo  $\mathbb{R}^2$  (en el origen).
- (iii) Probar que existen las derivadas parciales y que son continuas en  $(0, 0)$  (aunque no tienen por qué serlo).

(i)  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \stackrel{?}{=} 0$

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Rightarrow \left| \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| < \epsilon$

$\left| \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| \leq \frac{1}{2} \overbrace{(x^2 + y^2)}^{\text{plano}} \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \stackrel{**}{\leq} \frac{1}{2} \delta^2 < \delta.$

Bastará con tomar  $\delta < \sqrt{2\epsilon}$ .

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$

$\star xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$

$\star \star |y| \leq \|(x, y)\| < \delta$

(ii)  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)(x - 0) - f_y(0, 0)(y - 0)}{\|(x, y) - (0, 0)\|}$

$$f_x(0,0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \cdot 0^2}{\sqrt{h^2 + 0^2}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^2} = 0$$

$$f_y(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot h^2}{\sqrt{0^2 + h^2}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^2} = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 - 0 - 0}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \left| \frac{xy^2}{x^2+y^2} - 0 \right| \leq \frac{1}{2} \frac{(x^2+y^2)|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{2} \|(x,y)\| \leq \frac{1}{2} \delta < \epsilon.$$

Bastará con tomar  $\delta < \epsilon/2$ .

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad f_x &= \frac{y^2 \sqrt{x^2+y^2} - xy^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = \frac{y^2(x^2+y^2) - x^2 y^2}{(x^2+y^2) \sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\cancel{yx^2}^2 + y^4 - \cancel{(xy)^2}}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} = \\ &= \frac{y^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} \frac{y^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Ahora veremos si  $f_x$  es continua en el punto  $(0,0)$ .

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \stackrel{?}{=} 0$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \|(x,y) - (0,0)\| < \delta \Rightarrow |f(x,y) - 0| < \epsilon$$

$$\left| \frac{y^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} - 0 \right| \leq \frac{(x^2+y^2)^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} = \sqrt{x^2+y^2} < \delta$$

Bastará con tomar  $\delta < \epsilon$ , por lo que  $f_x$  es continua.

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{2xy \sqrt{x^2+y^2} - xy^2 \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = \frac{2xy(x^2+y^2) - xy^3}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} = \frac{2x^3y + 2xy^3 - xy^3}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} = \\ &= \frac{2x^3y + xy^3}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \begin{cases} \frac{2x^3y + xy^3}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Ahora repetiremos el procedimiento con  $f_y$ .

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \|(x,y) - (0,0)\| < \delta \Rightarrow |f(x,y) - 0| < \epsilon$$

$$\left| \frac{2x^3y + xy^3}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \right| \stackrel{\text{D.T}}{\leq} \frac{2|x^3y|}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} + \frac{|xy^3|}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \stackrel{*}{\leq} \frac{(x^2+y^2)(x^2+y^2)}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} + \frac{1}{2} \frac{(x^2+y^2)(x^2+y^2)}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \leq$$

$$\leq 2 \frac{(x^2+y^2)^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \leq 2\sqrt{(x^2+y^2)} < 2\delta$$

$$\star 2xy < x^2 + y^2$$

Bastará con tomar  $\delta < \epsilon/2$ , por lo que  $f_y$  también es continua.

-Definición: Sea  $U \subset \mathbb{R}^n$  un abierto y  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ , decimos que  $f$  es de **clase**  $C'(U)$ , y escribimos  $f \in C'(U)$  si:

$$\boxed{\exists \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \text{ y } \forall j = 1, 2, \dots, n}$$

• Teorema: Sean  $U \subset \mathbb{R}^n$  un abierto y  $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  tales que  $\exists Df(x_0), Dg(x_0)$  matrices acobianas:

$$(1) D(\lambda f(x_0)) = \lambda Df(x_0)$$

$$(2) D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$$

$$(3) D(f \cdot g)(x_0) = g(x_0)Df(x_0) + f(x_0)Dg(x_0)$$

$$(4) D\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{g(x_0)Df(x_0) - f(x_0)Dg(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

$$(5) D(f \circ g)(x_0) \rightarrow \text{Regla de la cadena, que se explica en el apartado 2.3.}$$

## 2.3 Derivadas direccionales

-Definición: Dado un vector  $\vec{u}$  unitario en  $\mathbb{R}^n$ , un abierto  $U \subset \mathbb{R}^n$  y  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ , se define la **derivada direccional** de  $f$ , según el vector  $\vec{u}$ , en un punto  $x_0 \in U$  como:

$$\boxed{D_{\vec{u}}f(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t\vec{u}) - f(x_0)}{t} = \frac{d}{dt} f(x_0 + t\vec{u})|_{t=0}}$$

Ejemplo: Hallar la derivada direccional de  $f : (x, y) = x^2 + y^2$  en la dirección del vector  $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ .

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{2}{\sqrt{13}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{13}}\vec{j}$$

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}f(1, 2) &= \frac{d}{dt} \left[ f\left(1 + \frac{2t}{\sqrt{13}}, 2 - \frac{3t}{\sqrt{13}}\right) \right] \Big|_{t=0} = \frac{d}{dt} \left[ \left(1 + \frac{2t}{\sqrt{13}}\right)^2 + \left(2 - \frac{3t}{\sqrt{13}}\right)^2 \right] \Big|_{t=0} = \\ &= \frac{4-12}{\sqrt{13}} = \frac{-8}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$

• Proposición: Sean  $U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable en  $x_0 \in U$  y  $\vec{u}$  un vector unitario, entonces:

$$\boxed{D_{\vec{u}}f(x_0) = \langle \vec{\nabla}f(x_0), \vec{u} \rangle}$$

$$\boxed{n=2} \quad f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + t(u_1, u_2)) - f(x_0, y_0)}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - tu_1, y_0 - tu_2) - f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0 + tu_2) - f(x_0, y_0 - tu_2)}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tu_1, y_0 - tu_2) - f(x_0, y_0 - tu_2)}{t} + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + tu_2) - f(x_0, y_0)}{t} = \\ h = tu_1 \quad t \rightarrow 0 &\iff h \rightarrow 0 \quad h' = tu_2 \quad t \rightarrow 0 \iff h \rightarrow 0 \quad \hat{y}_0 = y_0 + tu_2 \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} y_0 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0 + h, \hat{y}_0) - f(x_0, \hat{y}_0)}{h}}_{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)} u_1 + \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0, y_0 + h') - f(x_0, y_0)}{h'}}_{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)} u_2 \end{aligned}$$

## 2.4 Más sobre funciones diferenciables y el vector gradiente

(I) Dirección de máximo crecimiento de  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Si  $f$  es diferenciable y  $\vec{u}$  unitario  $\Rightarrow D_{\vec{u}}f(x_0) = \langle \vec{\nabla}f(x_0), \vec{u} \rangle = \|\vec{\nabla}f(x_0)\| \cos \theta$

$D_{\vec{u}}f(x_0)$  es máximo si  $\cos \theta = 1 \Rightarrow \vec{\nabla}f(x_0)$  y  $\vec{u}$  tienen que tener la misma dirección y el mismo sentido.

(i) La dirección del máximo crecimiento de la función  $f$ , es la del gradiente  $\vec{\nabla}f$ , y el valor máximo de  $D_{\vec{u}}f(x_0)$  es, precisamente,  $\|\vec{\nabla}f(x_0)\|$ .  $\vec{u} = \lambda \vec{\nabla}f(x_0)$  ( $\lambda > 0$ ).

(ii) El punto de máximo decrecimiento de la función  $f$  tiene lugar cuando  $\vec{\nabla}f$  y  $\vec{u}$  tienen la misma dirección pero sentidos opuestos.  $\vec{u} = \lambda \vec{\nabla}f(x_0)$  ( $\lambda < 0$ ).

(iii) La función  $f$  no varía, es decir, ni crece ni decrece, cuando  $D_{\vec{u}}f(x_0) = \langle \vec{\nabla}f(x_0), \vec{u} \rangle = 0 \Rightarrow \vec{\nabla}f \perp \vec{u}$  y el vector gradiente es perpendicular a los conjuntos de nivel.

(II) Gradiente y plano tangente a los conjuntos de nivel.

Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable en el punto  $x_0$ . Podemos considerar el plano tangente a la curva en el punto  $x_0$  de forma que se cumple que  $z = f(x, y)$ , y las superficies de nivel  $F(x, y, z) = c$ . Entonces la ecuación del plano tangente para los conjuntos de nivel será:

$$\boxed{\langle \vec{\nabla}F(x_0), (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \rangle = 0}$$

## 3 Regla de la cadena

• **Teorema:** Sean  $U \subset \mathbb{R}^n$  y  $V \subset \mathbb{R}^m$  conjuntos abiertos con  $\vec{x}_0 \in U$  y  $g(\vec{x}_0) \in V$ ,  $g : U \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $f : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Si  $g(\vec{x})$  es diferenciable en  $x_0$  y  $f(\vec{x})$  es diferenciable en  $g(\vec{x}_0)$ , entonces la composición  $(f \circ g)(\vec{x}) = f(g(\vec{x}))$  es diferenciable en  $\vec{x}_0$  y:

$$\boxed{D(f \circ g)(\vec{x}_0) = Df(g(\vec{x}_0)) \cdot Dg(\vec{x}_0)}$$

Ejemplo: Sean  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (e^{x+2y}, \sin(2x+y))$  y  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(u, v, w) = (u + 2v^2 + 3w^2, 2v - u^2)$ . Hallar la matriz jacobiana de la composición de ambas funciones en el punto  $(1, -1, 1)$ .

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{x+2y} & 2e^{x+2y} \\ 2 \cos(2x+y) & \cos(2x+y) \end{pmatrix}$$

$$Dg(u, v, w) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} & \frac{\partial f_1}{\partial v} & \frac{\partial f_1}{\partial w} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} & \frac{\partial f_2}{\partial v} & \frac{\partial f_2}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4v + 9w^2 & 0 \\ -2u & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$h(u, v, w) = (g \circ f)(u, v, w)$$

$$\begin{aligned} Dh(1, -1, 1) &= Df(g(1, -1, 1)) \cdot Dg(1, -1, 1) = Df(0, -3) \cdot D(1, -1, 1) = \\ &= \begin{pmatrix} e^{-6} & 2e^{-6} \\ 2 \cos -3 & \cos -3 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} -3e^{-6} & 9e^{-6} & 0 \\ 0 & 12 \cos -3 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \end{aligned}$$

#### Primer caso especial de la regla de la cadena

Si  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , podemos escribir  $g(t) = (x(t), y(t), z(t))$ .

Si definimos  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $h(t) = f(g(t))$ , entonces:

$$\frac{df}{dt} = \frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}$$

#### Segundo caso especial de la regla de la cadena

Si  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , podemos escribir  $g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ .

Si definimos  $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x, y, z) = f(g(x, y, z)) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ , entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\left( \frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z} \right) = \left( \frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}, \frac{\partial f}{\partial w} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Ejemplo: Sea  $F(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$  con  $u = \frac{x-y}{2}$ ,  $v = \frac{x+y}{2}$ . Aplicar la regla de la cadena para calcular  $\vec{\nabla} F(x, y)$  en función de las derivadas parciales de  $f$ ,  $\frac{\partial f}{\partial u}$  y  $\frac{\partial f}{\partial v}$ .

Definimos  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $g(x, y) = (u(x, y), v(x, y)) = \left(\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$  y

$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, y) = (f \circ g)(x, y) = f\left(\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$

$$DF(x, y) = \vec{\nabla} F(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}\right) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v}, -\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v}\right)$$

## 4 Derivadas de orden superior y fórmula de Taylor

### 4.1 Derivadas parciales de orden superior

-Definición: Definimos las derivadas parciales de orden 2 de:

- $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  como:

$$\text{Iterados: } f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\text{Mixtos o cruzados: } f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

- $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  como:

$$f_{x_i x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$f_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \quad \forall i \neq j = 1, \dots, n$$

-Definición: Sea  $U \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto abierto y:

- $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ , decimos que  $f$  es de **clase  $C^k$**  si  $f$  y todas sus derivadas parciales de orden  $1, 2, \dots, k$  son continuas en  $U$ .
- $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ , tal que  $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$  decimos que  $f$  es de clase  $C^k$  en  $U$  si  $f_i$  es de clase  $C^k$  en  $U$  para  $i = 1, \dots, m$ .

\* Observación: Si  $f \in C^1(U) \Rightarrow f$  diferenciable en todo punto de  $U$ .

• Teorema: Sean  $U \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto abierto y  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  es de clase  $C^2$  en  $U$  entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales, es decir, si  $1 \leq i, j \leq n$  se tiene en  $U$ :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}}$$

## 4.2 Fórmula de Taylor

La idea es aproximar una función, cerca de un punto dado, por un polinomio imponiendo que comparta con la función las sucesivas derivadas.