

目次

0.1	H6 数学選択	1
0.2	H7 数学選択	3
0.3	H8 数学選択	5
0.4	H9 数学選択	6
0.5	H10 数学選択	6
0.6	H11 数学選択	7
0.7	H12 数学選択	8
0.8	H13 数学選択	8
0.9	H14 数学選択	9
0.10	H15 数学選択	9
0.11	H16 数学選択	10
0.12	H17 数学選択	11
0.13	H18 数学選択	12
0.14	H19 数学選択	13
0.15	H20 数学選択	13
0.16	H21 数学選択	14
0.17	H22 数学選択	14
0.18	H23 数学選択	15
0.19	H24 数学選択	15
0.20	H25 数学選択	16
0.21	H26 数学選択	16
0.22	H27 数学選択	17
0.23	H28 数学選択	18
0.24	H29 数学選択	19
0.25	H30 数学選択	19
0.26	H31 数学選択	20
0.27	R2 数学選択	20
0.28	R3 数学選択	21
0.29	R4 数学選択	22
0.30	R5 数学選択	23

0.1 H6 数学選択

[3] (1) E_1 上で $0 < f(x) < 1$ であるから, $f(x)^n > f(x)^{n+1}$ である. よって $f(x)^{\frac{1}{n+1}} > f(x)^{\frac{1}{n}}$ となるから $\{f(x)^{\frac{1}{n}}\}_{n=1}^{\infty}$ は単調増加. また $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x)^{\frac{1}{n}} = 1$ である. よって単調収束定理から $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1} f(x)^{\frac{1}{n}} dx = \int_{E_1} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)^{\frac{1}{n}} dx = \int_{E_1} 1 dx = \mu(E_1)$ となる.

(2) E_2 上で $1 \leq f(x)$ であるから, $f(x) \leq f(x)^n$ より $f(x)^{\frac{1}{n}} \leq f(x)$ となる. また $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x)^{\frac{1}{n}} = 1$ である. $f(x)$ は E_2 上可積分であるから, ルベーグの収束定理より $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_2} f(x)^{\frac{1}{n}} dx = \int_{E_2} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)^{\frac{1}{n}} dx = \int_{E_2} 1 dx = \mu(E_2)$

となる。

(3) \mathbb{R} 上可積分であるから、 E_2 上可積分である。また $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ であるから、 $\mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1 \cup E_2} f(x)^{\frac{1}{n}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)^{\frac{1}{n}} dx$ となる。

[4] (1) 0 が M の内点でないことを示す。内点ならば ε 近傍 $B(0, \varepsilon)$ がとれる。 X の基底の各ベクトル v について $\varepsilon \frac{v}{2\|v\|}$ とすることで、 $B(0, \varepsilon)$ の部分集合で X の基底となるものが存在すると分かる。これは $M \neq X$ に矛盾。 よって 0 は内点でない。

任意の $v \in M$ について v が内点ならば、 v の ε 近傍 $B(v, \varepsilon)$ が存在する。 $B(v, \varepsilon) - v = \varepsilon B(0, \varepsilon) \subset M$ となり、 0 も内点である。これは矛盾。

(2) X を $L^1([0, 1])$ とする。これは Banach 空間である。

$L^\infty([0, 1])$ は $L^1([0, 1])$ の無限次元の部分空間である。 $\frac{1}{x} \in L^1([0, 1])$ であるが、 $\frac{1}{x} \notin L^\infty([0, 1])$ である。したがって真部分空間である。また完備であるから閉集合である。これが (i) の例。

$C^0([0, 1])$ を $[0, 1]$ 上の連続関数全体とすればこれは、無限次元の部分空間である。 $\{x^n\}$ は X の収束列であり、 $C^0([0, 1])$ の数列であるが、極限は $f(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ であり、 $C^0([0, 1])$ には属さない。これが (ii) の例。

(3) すべての F_n が内点をもたないとする。 $x_1 \in X \setminus F_1$ を任意にとる。このとき開集合であるから $\text{Cl}(B(x_1, \delta_1)) \subset X \setminus F_1$ となる δ_1 をとれる。(Cl で閉包をあらわす。) $x_1 \in F_a$ となる a が存在する。 $a = 2$ としても一般性を失わない。 $x_1 \in F_2$ であるが、 F_2 は内点をもたないため、 $B(x_1, \delta_1) \cap X \setminus F_2 \neq \emptyset$ である。よって $x_2 \in B(x_1, \delta_1) \cap X \setminus F_2$ となる x_2 がとれる。 $0 < \delta_2 < \frac{\delta_1 - d(x_1, x_2)}{2}$ をみだし、 $\text{Cl}(B(x_2, \delta_2)) \subset X \setminus F_2$ となる δ_2 がとれる。 δ_2 の定め方から、 $B(x_2, \delta_2) \subset B(x_1, \delta_1)$ である。これを繰り返して点列 $\{x_n\}$ と数列 $\{\delta_n\}$ を得る。 $n \geq m$ に対して $\|x_n - x_m\| \leq \delta_m \leq \frac{\delta_1}{2^m} \rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$) であるから $\{x_n\}$ は Cauchy 列である。 X は完備であるから $\{x_n\}$ は収束する。 $x_* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ とする。 $x_* \in F_N$ なる N が存在する。 $\text{Cl}(B(x_N, \delta_N)) \subset X \setminus F_N$ であり、 $\{x_n\}_{n=N}^\infty$ は閉集合 $\text{Cl}(B(x_N, \delta_N))$ の収束点列であるから、 $x_* \in \text{Cl}(B(x_N, \delta_N)) \subset X \setminus F_N$ となる。これは矛盾。

[6] (1) 斉次式であることから可約であれば、 $x^2 + xy + y^2 = (x - ay)(x - by)$ ($a, b \in F$) とできる。 $x^2 + xy + y^2 = x^2 - (a+b)xy + abx^2$ となるから、 $a+b = -1, ab = 1$ より $a^2 + a + 1 = 0$ をみたす。また $b = a^2$ である。よって可約であれば $x^2 + xy + y^2 = (x - \varepsilon y)(x - \varepsilon^2 y)$ となる ε が存在して $\varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$ を満たす。

逆に $\varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$ をみたす $\varepsilon \in F$ が存在すれば、可約である。

$\text{ch} F \neq 3$ のとき、 $\varepsilon \neq 1$ である。 $\varphi: F^2 \rightarrow F^2; (x, y) \mapsto (x - \varepsilon y, x - \varepsilon^2 y)$ とする。 φ は加法群として準同型である。 $x - \varepsilon y = 0 = x - \varepsilon^2 y$ となるとき、 $\varepsilon \neq 1$ より $y = 0, x = 0$ となる。よって φ は単射であるから、全単射である。任意の $a \in F^\times$ に対して $uv = a$ なら $u = av^{-1}$ である。したがって $uv = a$ となる (u, v) の組は $|F| - 1$ 個である。 $a = 0$ なら $u = 0$ または $v = 0$ であるから $2|F| - 1$ 個である。 φ が全単射であるから、これが求める解の個数。

$\text{ch} F = 3$ のとき、 $\varepsilon = 1$ より $x^2 + xy + y^2 = (x - y)^2 = a$ である。よって $a = 0$ なら解は $\{(x, x) \in F^2 \mid x \in F\}$ より $|F|$ 個である。 $a \neq 0$ なら二乗して a になる数が存在するとき、 $\text{ch} F \neq 2$ より解は 2 個あるから $2|F|$ 個である。存在しないなら 0 個である。

(2) F の位数を q とする。既約であるから $\text{ch} F \neq 3$ である。すなわち $3 \nmid q$ である。また $3 \mid q - 1$ なら乗法群は巡回群であるから、位数 3 の元 ε が存在する。このとき $\varepsilon^3 - 1 = 0$ であり、 $\varepsilon \neq 1$ であるから $\varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$ である。これは既約性に矛盾。よって $3 \nmid q - 1$ である。

$a = 0$ のとき、解 $(x, y) \neq (0, 0)$ を持つと仮定する。対称性から $y \neq 0$ としてよい。 $x = \varepsilon y$ を満たす $\varepsilon \in F$ が存在する。このとき $\varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$ となり、既約性に矛盾。したがって解は 1 個である。

$a \neq 0$ のとき、 $\varepsilon^2 + \varepsilon + 1$ をみたす ε を F に添加した拡大体 $K := F(\varepsilon)$ を考える。 $\varepsilon^q = \varepsilon^2$ である。 K は F 上の 2 次元ベクトル空間であるから、任意の $z \in K$ は $z = \alpha - \varepsilon\beta$ ($\alpha, \beta \in F$) と一意にあらわせる。

$z^{q+1} = zz^q = (\alpha - \varepsilon\beta)(\alpha - \varepsilon^2\beta) = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ である. したがって $\phi: K^\times \rightarrow F^\times; z \mapsto z^{q+1}$ は群準同型である. $K^\times = \langle g \rangle$ となる g が存在する. $z \in \ker \phi$ について $g^k = z$ なる k が存在する. $(g^k)^{q+1} = 1$ より $(q^2 - 1) \mid k(q+1)$ である. これをみたす $0 \leq k < q^2 - 1$ は $0, q-1, 2(q-1), \dots, q(q-1)$ の $q+1$ 個である. したがって $|\ker \phi| = q+1$ である. よって $|\operatorname{Im} \phi| = |q^2 - 1|/|\ker \phi| = q-1 = |F^\times|$ である. よって ϕ は全射である. 以上より $0 \neq a \in F$ に対して $\phi^{-1}(a) \ni z = \alpha + \beta\varepsilon$ とすれば, $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = a$ であり, K^\times の元は $F^2 \setminus \{(0,0)\}$ と一対一対応するから, 解の個数は $q+1$ である.

(3) 単射にならない a を考える. $f(x) = f(y)$ かつ $x \neq y$ とする. $x^3 + ax = y^3 + ay$ より $(x-y)(x^2 + xy + y^2) = -a(x-y)$ であるから $x^2 + xy + y^2 = -a$ である.

$3 \mid (q+1)$ のとき, すなわち $x^2 + xy + y^2$ が既約なとき, $a \neq 0$ なら $x^2 + xy + y^2 = -a$ を満たす (x, y) は $q+1$ 個あるから, $x \neq y$ となる解も存在する. よって単射でない. $a = 0$ なら解は $(0,0)$ のみであるから単射.

$3 \mid q$ のとき, (1) から $a = 0$ あるいは二乗して $-a$ になる数が存在しないときに単射, それ以外は単射でない.

$3 \mid (q-1)$ のとき, $a = 0$ なら単射でない. $a \neq 0$ で単射な a が存在すると仮定する. 解の個数が $q-1$ であり, $(0,0)$ は解でないから解は (x, x) ($x \in F^\times$) である. すなわち $x^2 + x^2 + x^2 = -a$ より $x^2 = -3^{-1}a$ ($x \in F^\times$) である. 二次方程式であるから解は重複を含めて 2 個. よって $q-1 = |F^\times| \leq 2$ である. $3 \mid (q-1)$ よりこれを満たす $q \geq 2$ は存在しない. したがって $a \neq 0$ なら単射でない.

[7] 帰納法でとく. $n=1$ は明らか. $n-1$ 以下で成立すると仮定する. H_{n-1} を $n-1$ 次正方行列ですべての主小行列式が非零な行列な行列とする. 下三角行列 P_{n-1} と上三角行列 Q_{n-1} を用いて $H_{n-1} = P_{n-1}Q_{n-1}$ とできる. $0 \neq \det H_{n-1} = \det P_{n-1} \det Q_{n-1}$ であるから, $\det P_{n-1} \neq 0, \det Q_{n-1} \neq 0$ である.

$$H_n = \begin{pmatrix} H_{n-1} & a \\ b^T & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{n-1} & 0 \\ b^T Q_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{n-1} & P_{n-1}^{-1}a \\ 0 & c - b^T Q_{n-1}^{-1} P_{n-1}^{-1}a \end{pmatrix} = P_n Q_n$$

とすれば, P_n は下三角行列であり, Q_n は上三角行列である.

0.2 H7 数学選択

[4] (1) 距離空間においてコンパクト性と点列コンパクト性は同値である. 点列 $\{\alpha_{n,k}\}_{k=1}^\infty; \alpha_{n,k} := \delta_{n,k}$ は $\{\alpha_{n,k}\}_{k=1}^\infty \in B$ である. B の点列 $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty$ を $\alpha_n := \{\alpha_{n,k}\}_{k=1}^\infty$ とすると, $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty$ は収束部分列を持たない. (任意の異なる二項の差が 1 以上であるためコーシー列にならない.) よって B は点列コンパクトでない.

(2) $1 - \|x\|$ の連続性は明らか. $(\sum \frac{\zeta_k}{k})^2 \leq \sum \zeta_k^2 \sum \frac{1}{k^2}$ (コーシーシュワルツ) より収束性と連続性がわかる. よって f は連続で $f(\alpha_n) = \frac{1}{n}$ より $\inf_{x \in B} f(x) = 0$ である.

$\min_{x \in B} f(x)$ が存在すれば, $\|x\| = 1, \sum \frac{\zeta_k}{k} = 0$ だがこれを満たす x は存在しない.

[6] (1) $\operatorname{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ より galois 群の非自明な部分群はただ一つ. よって非自明な中間体もただ一つである.

(2) $\operatorname{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \operatorname{id}, \sigma, \sigma^2, \sigma^3$ とする. $\sigma^2((\sqrt{\alpha})^2) = \sigma^2(\alpha) = \alpha$ より $\sigma^2(\sqrt{\alpha}) = -\sqrt{\alpha}$ である. 同様に $\sigma^2(\sqrt{\beta}) = -\sqrt{\beta}$ である. よって $\sigma^2(\sqrt{\alpha\beta}) = (-\sqrt{\alpha})(-\sqrt{\beta}) = \sqrt{\alpha\beta}$ である. すなわち $\sqrt{\alpha\beta} \in F$ であるから $\alpha\beta$ は F の平方数.

(3) K/F は二次拡大であるから $K = F(\sqrt{x+y\sqrt{a}})$ ($x, y \in \mathbb{Q}$) と書ける. K/\mathbb{Q} が galois 拡大であることから, $\sqrt{x+y\sqrt{a}}$ の \mathbb{Q} 上の共役 $\sqrt{x-y\sqrt{a}} \in K$ である. また $K = F(\sqrt{x-y\sqrt{a}})$ であるから (2) より $x^2 - y^2a = (c+d\sqrt{a})^2$ となる $c, d \in \mathbb{Q}$ が存在する. $x^2 - y^2a = c^2 + d^2a + 2cd\sqrt{a}$ より $cd = 0$ である. $\sqrt{x+y\sqrt{a}}$ の \mathbb{Q} 上の共役は $\pm\sqrt{x \pm y\sqrt{a}}$ である. $\sigma(\sqrt{x+y\sqrt{a}}) = -\sqrt{x+y\sqrt{a}}$ なら $\sqrt{x+y\sqrt{a}} \in F$ となるから, $\sigma(\sqrt{x+y\sqrt{a}}) = \sqrt{x-y\sqrt{a}}$ としてよい. (σ と σ^3 の対称性) このとき, $-\sqrt{x+y\sqrt{a}} = \sigma^2(\sqrt{x+y\sqrt{a}}) =$

$\sigma(\sqrt{x-y\sqrt{a}}) = \sigma(\frac{\sqrt{x^2-y^2a}}{\sqrt{x+y\sqrt{a}}})$ より $\sigma(\sqrt{x^2-y^2a}) = -\sqrt{x+y\sqrt{a}}\sigma(\sqrt{x+y\sqrt{a}}) = -\sqrt{x^2-y^2a}$ となるから $\sqrt{x^2-y^2a} \notin \mathbb{Q}$ である.

よって $c=0$ であるから $x^2-y^2a=d^2a$ である. よって $a = \left(\frac{xd}{d^2+y^2}\right)^2 + \left(\frac{xy}{d^2+y^2}\right)^2$ である.

7 (1)

x^2+y^2-1 の既約性を示せばよいが、やや面倒. そこで UFD 上の原始多項式の既約性はその商体上の既約性と同値であることを使う.

x^2+y^2-1 が $K(y)[x]$ 上で既約であれば、 $K[x,y]$ 上でも既約である. x^2+y^2-1 が $K(y)[x]$ 可約なら $K(y)$ に根 $f(y)/g(y)$ ($f(y), g(y) \in K[y]$) をもつ. また $\text{ch} K \neq 2$ より $y-1 \neq y+1$ である. このとき $f(y)^2 = (1-y^2)g(y)^2$ であるが、 $K[y]$ の等式とみたときに素元 $1-y$ の個数が右辺と左辺で異なるため矛盾. よって可約でないから既約である. よって $K[x,y]$ は UFD だから x^2+y^2-1 は素元であり (x^2+y^2-1) は素イデアル, よって $R = K[x,y]/(x^2+y^2-1)$ は整域.

(2) x が既約であるが素元でないことを示す. x が素元 $\Leftrightarrow R/(x)$ は整域. ここで $R/(x) \cong K[y][x]/(x, x^2+y^2-1) \cong K[y]/(y^2-1)$ である. $y^2-1 = (y-1)(y+1)$ より y^2-1 は既約でないから $R/(x)$ は整域でない. よって x は素元でない.

$f(x,y) + I \in R$ について, $f(x,y) = (x^2+y^2-1)h(x,y) + ya(x) + b(x)$ となる $a(x), b(x) \in K[x]$ が存在する. $f(x,y) + I = g(x,y) + I$ なら $g(x,y) - f(x,y) = (x^2+y^2-1)p(x)$ となる $p(x) \in K[x]$ が存在して, $g(x,y) = (x^2+y^2-1)(h(x,y) + p(x)) + ya(x) + b(x)$ となる. よって $a(x), b(x)$ は R の各元に対して一意に定まる. ノルム $N: R \rightarrow K[x]$ を $N(a(x) + b(x)y + I) = a(x)^2 - b(x)^2(1-x^2)$ とする.

$$\begin{aligned} N((a(x) + b(x)y + I)(c(x) + d(x)y + I)) &= N(ac(x) + bd(x)(1-x^2) + (ad+bc)(x)y + I) \\ &= (ac(x) + bd(x)(1-x^2))^2 - (ad+bc)^2(1-x^2) = (a(x)^2 - b(x)^2(1-x^2))(c(x)^2 - d(x)^2(1-x^2)) \\ &= N(a(x) + b(x)y + I)N(c(x) + d(x)y + I) \end{aligned}$$

よって $N((f(x,y) + I)(g(x,y) + I)) = N(f(x,y) + I)N(g(x,y) + I)$ である.

有限次拡大 E/F に対して $m_a: E \rightarrow E$ が m 倍写像として定まる. E の F 上基底 S を一つ固定して S に関する表現行列の行列式が a のノルムである. (青雪江 4.12 節)

整域 R に対してその商体 P を考えれば α を添加した環 $R(\alpha)$ のノルムを $P(\alpha)/P$ のノルムの制限として考えられる.

上の観察から R は $K[x]$ に y を添加した環だと思える. (\mathbb{Z} に $\sqrt{2}$ を添加するのと同じノリ)

そこで R 上のノルムは $K[x]$ の商体 $K(x)$ 上のノルムを考えればよい. R の $K(x)$ 上の基底は $\{1, y\}$ である

から f 倍写像では $m_f(1) = a+by, m_f(y) = (1-x^2)b+ay$ である. 行列式は $\begin{vmatrix} a & (1-x^2)b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 - b^2(1-x^2)$

である. これがノルム.

以上を認めれば $N(fg) = N(f)N(g)$ が成り立つことは明らか.

$x + I = (a(x) + b(x)y + I)(c(x) + d(x)y + I)$ とする. $N(x + I) = x^2$ より, 次の 2 つ場合がある.

(i) $N(a(x) + b(x)y + I) = a(x)^2 - b(x)^2(1-x^2) = \pm x, N(c(x) + d(x)y + I) = c(x)^2 - d(x)^2(1-x^2) = \pm x$ (複号同順)

(ii) $N(a(x) + b(x)y + I) = a(x)^2 - b(x)^2(1-x^2) = \pm 1, N(c(x) + d(x)y + I) = c(x)^2 - d(x)^2(1-x^2) = \pm x^2$ (複号同順)

(i) のとき, x の次数が左辺は偶数で右辺は奇数だから矛盾. (ii) のとき, $(a(x)+b(x)y+I)(a(x)-b(y)+I) = a(x)^2 - b(x)^2(1-x^2) + I = \pm 1 + I$ より $a(x)+b(x)y+I$ は単元. よって x は既約元である.

よって R は UFD でない.

(3) 全射環準同型 $\varphi: K[x, y] \rightarrow K[u, v]/(uv-1); x \mapsto \frac{u+v}{2}, y \mapsto \frac{u-v}{2\sqrt{-1}}$ を考える. $\ker \varphi = ((x + \sqrt{-1}y)(x - \sqrt{-1}y) - 1) = (x^2 + y^2 - 1)$ である. よって $R \cong K[u, v]/(uv-1)$ である. $uv-1=0 \in K[u, v]/(uv-1)$ より $uv=1$ すなわち, $v=u^{-1}$ である. よって $R \cong K[u, u^{-1}]$ である. $K[u, u^{-1}]$ は $K[u]$ の $\{u^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$ による局所化である. $K[u]$ は UFD であるからその局所化もまた UFD である. よって R は UFD である.

0.3 H8 数学選択

6

群 G と $N \triangleleft G, H \leq G$ について $NH = G, H \cap N = \{e\}$ ならば半直積 $N \rtimes H \cong G$ である.

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}, H = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \right\} \text{ とする.}$$

$\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ より $NH = G$ でありまた $H \cap N = \{e\}$ である. よって $N \rtimes H \cong G$ である.

$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ は位数無限であり, $\begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ は位数 2 である.

$\varphi \in \text{Aut}(G)$ を任意にとる. $\varphi \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$ は位数が無限であるから $\varphi \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ となる.

同様に $\varphi \left(\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ となる. $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & an \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である. よって φ の全射性から $a = \pm 1$ である. 逆に $a = \pm 1, b \in \mathbb{Z}$ が定まれば同型写像 φ が一意に定まる. 半直積 $\mathbb{Z} \rtimes_f \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ を $f(i) = (n \mapsto (-1)^i n)$ で定める. このとき $\text{Aut}(G) \rightarrow \mathbb{Z} \rtimes_f \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; \varphi \mapsto (b, a)$ は全単射である. $\phi \mapsto (d, c)$ に対して $\varphi \circ \phi \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \varphi \left(\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & ac \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \varphi \circ \phi \left(\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \varphi \left(\begin{pmatrix} -1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 & b+ad \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ より $\varphi \circ \phi \mapsto (b+ad, ac) = (b+(-1)^a d, ac) = (b, a) \cdot (d, c)$ となるから $\text{Aut}(G) \rightarrow \mathbb{Z} \rtimes_f \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は同型射.

[7] (1) $f(x^2) = f(x)g(x)$ なる $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ が存在する. f の根 α に対して $f(\alpha^2) = f(\alpha)g(\alpha) = 0$ より α^2 も f の根である. f が n 次多項式であるから, 異なる根は高々 n 個である. よって $\alpha^{2^m} = \alpha^{2^k}$ となる $m > k$ が存在する. このとき $\alpha^{2^m - 2^k} = 1$ となるから α は 1 の冪根である.

α が偶数位数の根であるとする. すなわち $\alpha^{2^m} = 1$ となる最小の正の整数 m が存在する. このとき $\alpha^m = -1$ となる. また $x^m - 1 = 0$ は α^2 を根にもつ. f は α^2 の最小多項式であるから $x^m - 1 = f(x)h(x)$ となる $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ が存在する. α を代入すると $-2 = \alpha^m - 1 = f(\alpha)h(\alpha) = 0$ となり矛盾する. よって α は奇数位数の根である.

(2) f の根 α, β の位数を $s > t$ とする. $f(x)|(x^t - 1)$ であるから $\alpha^t = 1$ である. これは $s > t$ であることに矛盾する. よって f の根は全て位数が等しい.

f の根 α の位数が m であるとする. $f(-\alpha) = 0$ なら $(-\alpha)^m = (-1)^m \alpha^m = (-1)^m = 1$ となり m は偶数である. これは矛盾.

$f((-\alpha)^2) = f(\alpha^2) = f(\alpha)g(\alpha) = 0$ であり, $f((-\alpha)^2) = f(-\alpha)g(-\alpha) = 0$ であるから $g(-\alpha) = 0$ である. g

の次数は f と等しいから最高時の係数に注意すれば $g(x) = (-1)^n f(-x)$ である。

(3) f が奇数位数の冪根の最小多項式であるから f は円分多項式である。オイラーのトーシェント関数を φ とすると、位数 m の 1 の冪根を解に持つ円分多項式の次数は $\varphi(m)$ である。

$\varphi(m) \leq 6$ となる奇数 m を考える。1, 2, 4, 8, 16, $m-1$, 32 は m と互いに素である。したがって $m \geq 34$ なら $\varphi(m) > 6$ である。また $33 \geq m \geq 18$ で 3, 5, 7 のいずれも素因数にもつ数は存在しない。よって $m \geq 18$ なら $\varphi(m) > 6$ である。 $m = 1, 3, 5, 7, 9$ なら $\varphi(m) \leq 6$ であり、 $m = 11, 13, 15, 17$ なら $\varphi(m) > 6$ である。 $m = 1, 3, 5, 7$ に対応する円分多項式は $x-1, x^2+x+1, x^4+x^3+x^2+x+1, x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$ である。 $m=9$ なら $(x^9-1)/(x^3-1) = x^6+x^3+1$ である。

この 5 つが求める $f(x)$ である。

0.4 H9 数学選択

[6] (1) $p(t) = t^3 - x^3 \in L[t]$ が x の最小多項式であることを示す。 $p(t) = (t-x)(t-e^{2\pi i/3}x)(t-e^{4\pi i/3}x)$ である。したがって $p(t)$ は L 上で既約なモニック多項式。

(2) $L(x) \ni x^{-1}(xy) = y$ より $K = L(x)$ である。 $p(t)$ の根をすべて K は含むから K/L は正規拡大。よって K/L はガロア拡大で拡大次数は 3。すなわち $\text{Gal}(K/L) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

(3) $M(x) \cdot M(y) = M(xy) = K$ であり、 $M(x) \cap M(y) = L$ である。 $M(x)/M, M(y)/M$ は galois 拡大で $\text{Gal}(M(x)/M) \cong \text{Gal}(M(y)/M) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ である。galois 拡大の推進定理より $\text{Gal}(K/M) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ である。

$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ の非自明な部分群は $\langle(1,0)\rangle, \langle(1,1)\rangle, \langle(1,2)\rangle, \langle(0,1)\rangle$ である。 $\sigma \in \text{Gal}(M(x)/M)$ を $\sigma(x) = e^{2\pi i/3}x$ とし、 $\tau \in \text{Gal}(M(y)/M)$ を $\tau(y) = e^{2\pi i/3}y$ とする。 (σ, id) で不変な K の元は y であるから $\langle(1,0)\rangle$ に対応する中間体は $M(y)$ である。同様にしてそれぞれ $M(xy^2), M(xy), M(x)$ が対応する。

以上より中間体は $M, M(x), M(y), M(xy), M(xy^2), K$ である。

[8] (1) 位相空間 X が連結であるとは、 X の空でない開集合 U, V で $U \cap V = \emptyset, U \cup V = X$ を満たすものが存在しないことである。

位相空間 X が弧状連結であるとは、 X の任意の 2 点 x, y に対して連続写像 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ で $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ を満たすものが存在することである。

(2) X を局所弧状連結であり連結である位相空間とする。連結性から $X \neq \emptyset$ である。 $x, y \in X$ に対して、連続写像 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ で $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ を満たすものが存在するとき $x \sim y$ とかく。

$U = \{y \in X \mid x \sim y\}$ とする。 $y \in U$ に対して弧状連結な開近傍 U_y が存在する。任意の $z \in U_y$ に対して $z \sim y \sim x$ であるから $z \in U$ である。よって $U_y \subset U$ である。すなわち U は開集合である。

$z \in X \setminus U$ とする。 z に対して弧状連結な開近傍 U_z が存在する。 $U_z \cap U \neq \emptyset$ であるとする。すると $y \in U_z \cap U$ が存在する。このとき $x \sim y \sim z$ であるから $z \in X \setminus U$ に矛盾する。よって $U_z \cap U = \emptyset$ である。 z は任意であるから $X \setminus U$ は開集合である。よって U は開かつ閉である。 X は連結であるから $U = X$ である。すなわち X は弧状連結である。

(3) M を連結な多様体とする。(2) より局所弧状連結であることを示せばよい。 M の点 x に対して x を含む開集合 U と同相写像 $\varphi: U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ が存在する。 $\varphi(x) \in B(\varphi(x), \varepsilon) \subset V$ となる ε 開球が存在する。 $x \in \varphi^{-1}(B(\varphi(x), \varepsilon))$ は x を含む弧状連結な開集合である。よって局所弧状連結。

0.5 H10 数学選択

[6] L/K を有限次 galois 拡大とする。 $L[x]$ で $f(x) = g_1(x) \dots g_n(x)$ と既約元分解されたとする。 $f(x)$ の最小分解体を F で表す。 $i \neq j$ として g_i の根 α, g_j の根 β を任意にとって固定する。既約であるから g_j は β の

最小多項式と同伴である。 $f(x)$ は K 上で既約であるから、 $\sigma \in \text{Gal}(F/K)$ で $\sigma(\alpha) = \beta$ となるものが存在する。 $\sigma(g_i)(\beta) = \sigma(g_i(\alpha)) = 0$ であるから $\sigma(g_i)$ は β を根にもつ。 L/K が正規拡大であるから $\sigma|_L$ は L 上の K -自己同型である。 よって $\sigma(g_i)$ は $L[x]$ の既約多項式である。 よって $\sigma(g_i)$ も β の最小多項式と同伴である。 すなわち $\deg g_i = \deg \sigma(g_i) = \deg g_j$ である。

[7] (1) $(p, x^2 + 1)$ が $\mathbb{Z}[x]$ 上素イデアル $\Leftrightarrow \mathbb{Z}[x]/(p, x^2 + 1)$ が整域。 $\Leftrightarrow (\mathbb{Z}[x]/(p))/((p, x^2 + 1)/(p))$ が整域。
 $\Leftrightarrow \mathbb{F}_p[x]/(x^2 + 1)$ が整域。 $\Leftrightarrow x^2 + 1$ が $\mathbb{F}_p[x]$ 上既約。 $\Leftrightarrow -1$ が \mathbb{F}_p 上平方非剰余。

次が成り立つことを示す。 -1 が \mathbb{F}_p 上平方剰余 $\Leftrightarrow 4 \mid (p - 1)$ 。

\Rightarrow ある $x \in \mathbb{F}_p^\times$ が存在して $x^2 = -1$ となる。 $x^4 = 1$ であるから x は位数 4 の元。 よって $4 \mid (p - 1)$ 。

$\Leftarrow 4 \mid |\mathbb{F}_p^\times|$ であるから sylow の定理より位数 4 以上の 2-sylow 部分群が存在する。 $x^2 = -1$ をみたす $x \in \mathbb{F}_p^\times$ は $x = \pm 1$ のみであるから $x^2 = -1$ をみたす x が存在する。

以上より $(p, x^2 + 1)$ が $\mathbb{Z}[x]$ 上素イデアル $\Leftrightarrow 4 \nmid p - 1$ である。

-1 が平方剰余でないについては平方剰余の相互法則の第一補加法則 $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ から $\frac{p-1}{2}$ が奇数であることと同値である。 これは $p - 1$ が 4 の倍数でないことと同値である。

0.6 H11 数学選択

[7] Galois 群が推移的なとき。 $f(x)$ が可約であると仮定する。 $f(x) = g_1(x)g_2(x)\dots g_n(x)$ と $K[x]$ 上で既約分解される。 g_1 の根 α と g_2 の根 β を任意にとって固定する。 $f(x)$ の最小分解体を F で表す。 推移的であるから $\sigma \in \text{Gal}(F/K)$ で $\sigma(\alpha) = \beta$ となるものが存在する。 このとき $\sigma(g_1)(\beta) = \sigma(g_1(\alpha)) = 0$ であるから $\sigma(g_1)$ は β を根にもつ。 よって $\sigma(g_1)$ と g_2 は共に β の最小多項式と同伴である。 $g_1 \in K[x]$ より $\sigma(g_1) = g_1$ であるから g_1 と g_2 は同伴である。 このとき α は g_1, g_2 のどちらの根でもあるがこれは f の分離性に矛盾。

$f(x)$ が $K[x]$ 上で既約であるとき。 $f(x)$ の 2 根 α, β をとって固定する。 $\text{Gal}(F/K)\alpha = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ とする。 $g(x) = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$ とする。 このとき $\text{Gal}(F/K)g(x) = g(x)$ より $g(x) \in K[x]$ である。 $g(x)$ の根は α の共役であるから $g(x) \mid f(x)$ である。 既約性から $cg(x) = f(x)$ ($c \in K$) とできる。 これは $\text{Gal}(F/K)$ が推移的であることを意味する。

[8] (1) $f(x, y) = \sum a_{ij}x^i y^j$ とできる。 $f(tx, ty) = \sum a_{ij}t^{i+j}x^i y^j = t^n f(x, y) = \sum a_{ij}t^n x^i y^j$ である。 $K(x, y)[t]$ における等式とみれば $\sum_{i+j=k} a_{ij}t^k x^i y^j = 0$, ($k \neq n$) である。 したがって $a_{ij} = 0$ ($i + j \neq n$) である。 よって $f(x) = \sum_{i+j=n} a_{ij}x^i y^j$ である。

$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = x \sum_{i+j=n} a_{ij} i x^{i-1} y^j + y \sum_{i+j=n} a_{ij} j x^i y^{j-1} = \sum_{i+j=n} a_{ij} (i + j) x^i y^j = n f(x, y)$ である。

(2) $f(tx, ty) = (tx)^2 + (tx)(ty) + (ty)^2 = t^2(x^2 + xy + y^2) = t^2 f(x, y)$ である。 したがって (1) より $2f = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$ である。

よって $J_f = (f, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}) = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ である。

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2ax + 2by, \frac{\partial f}{\partial y} = 2bx + 2cy$ であるから $J_f = (2ax + 2by, 2bx + 2cy)$ である。

$a = b = 0$ のとき。 $J_f = (y)$ より $\mathbb{C}[x, y]/J_f \cong \mathbb{C}[x]$ である。 これは無限次元。 $b = c = 0$ のときも同様。

$a = c = 0, b \neq 0$ のとき。 $J_f = (x, y)$ である。 $\mathbb{C}[x, y]/J_f \cong \mathbb{C}$ である。 これは有限次元。

$a = 0, b \neq 0 \neq c$ のとき。 $J_f = (2by, 2bx + 2cy) = (x, y)$ である。 $\mathbb{C}[x, y]/J_f \cong \mathbb{C}$ である。 これは有限次元。
 $c = 0, a \neq 0 \neq b$ のときも同様。

$b = 0, a \neq 0 \neq c$ のとき。 $J_f = (2ax, 2cy) = (x, y)$ である。 よって有限次元。

$a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$ のとき。 $J_f = (\frac{a}{b}x + y, x + \frac{c}{b}y)$ である。 $(\frac{a}{b}x + y) - \frac{a}{b}(x + \frac{c}{b}y) = (1 - \frac{ac}{b^2})y$ より $J_f = (ax + by, (1 - \frac{ac}{b^2})y)$ である。

ここで $1 - \frac{ac}{b^2} = 0$ ならば $J_f = (ax + by)$ より $\mathbb{C}[x, y]/J_f \cong \mathbb{C}[y]$ である。 これは無限次元。

$1 - \frac{ac}{b^2} \neq 0$ ならば $J_f = (x, y)$ より有限次元.

以上より f が有限次元である条件は $ac \neq b^2$ である.

0.7 H12 数学選択

[8] (1) $\pi(ab) = (ab)^2 = a^2b^2 = \pi(a)\pi(b)$ である. よって準同型.

(2) $\pi(a) = b \in \text{Im } \pi$ に対して, $\pi(x) = b$ なら x は $x^2 - b = 0$ の根である. したがって $\pi(x) = b$ となる x は $a, -a$ のみ.

$a = -a$ なら $a = 0 \vee 2 = 0 \in \mathbb{F}_p^\times$ である. $a \in \mathbb{F}_p^\times$ より $a \neq 0$ で p は奇素数であるから $2 \neq 0$ である. よって $a \neq -a$ である.

したがって位数は $\frac{p-1}{2}$ である.

(3) $\ker \pi^2 = \{x \mid x^4 = 1\}$ である. $x^2 = 1$ となる x は $1, -1$ のみ. $x \in \ker \pi^2$ で $x \neq \pm 1$ なら $x^2 = -1$ である.

したがって $p-1$ が 4 の倍数ならば -1 は平方剰余であるから $\ker \pi^2$ は位数 4 の群 $\{-1, 1, a, -a\}$ ($a^2 = -1$) となる.

$p-1$ が 4 の倍数でないならば -1 は平方非剰余であるから $\ker \pi^2$ は位数 2 の群 $\{-1, 1\}$ となる.

(4) $1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 4^2 = 5, 5^2 = 3$ であるから, \mathbb{F}_{11}^\times は $x^2 - 2$ の根を持たない. よって $x^2 - 2$ は既約である.

$x^4 - 2 = (x^2 + 4x + 8)(x^2 + 7x + 8)$ であるから既約でない.

[9] (1) G による不変体を L^G とする. $G = \{\sigma, \tau, \sigma \circ \tau\}$ である. $\sigma(x^2 + y^2) = y^2 + x^2, \sigma(xy) = yx, \tau(x^2 + y^2) = x^2 + y^2, \tau(xy) = xy$ であるから $K \subset L^G$ である. $[L : L^G] = |\text{Gal}(L/L^G)| = |G| = 4$ である.

$L = K(x)$ である. $(t-x)(t+x)(t-y)(t+y) = t^4 - (x^2 + y^2)t^2 + x^2y^2$ であるから $[L : K] \leq 4$ である. したがって $K = L^G$ である. よって L/K は Galois 拡大で Galois 群は G である.

(2) G の非自明な部分群は $\langle \sigma \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma \circ \tau \rangle$ である. $\sigma(x+y) = y+x, \tau(x^2-y^2) = x^2-y^2, \sigma \circ \tau(x-y) = x-y$ であり, また $\tau(x+y) = -x-y, \sigma(x^2-y^2) = y^2-x^2, \tau(x-y) = -x+y$ である. よって $K(x+y), K(x^2-y^2), K(x-y)$ がそれぞれに対応する中間体である. これに L, K を加えたものが全ての中間体である.

0.8 H13 数学選択

[N] (1) $t^4 - zt^2 + 1 = (t-x)(t+x)(t-\frac{1}{x})(t+\frac{1}{x})$ であるから $K(x)/K(z)$ は正規拡大. $\text{ch } K \neq 2$ より $x \neq \frac{1}{x}$ より $t^4 - zt^2 + 1$ は分離多項式. よって x が $K(z)$ 上分離的であるから $K(z)/K(x)$ が Galois 拡大.

(2) $t^2 - ty + 1$ は $K(y)$ 上の x の最小多項式であり, 根は $x, \frac{1}{x}$ である. よって $K(y)/K(x)$ は Galois 拡大であるから $\text{Aut}(K(y)/K(x)) = \text{Gal}(K(y)/K(x))$ である. よって位数は 2 である.

$\text{ch } K \neq 2$ なら $K(x)/K(z)$ は Galois 拡大であった. $K(y)$ が非自明な中間体となるから $[K(x) : K(z)] = 4$ である. よって $\text{Aut}(K(x)/K(z))$ の位数は 4 である.

$\text{ch } K = 2$ なら $K(x)/K(z)$ は正規拡大であるが分離拡大でない. したがって $\sigma(x) = \frac{1}{x}$ と id の 2 個が $\text{Aut}(K(x)/K(z))$ の元である. 位数は 2 .

[O] (1) $m_{(a,b)} \subsetneq J$ なるイデアル J が存在すると仮定する. $f(x, y) \in J \setminus m_{(a,b)}$ となる $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ をとる. $f(x, y) = g(x, y)(x-a) + h(y)(y-b) + r$ となる $g(x, y) \in \mathbb{C}[x, y], h(y) \in \mathbb{C}[y], r \in \mathbb{C}$ が存在する. このとき $r \in J$ より $J = \mathbb{C}[x, y]$ である. よって $m_{(a,b)}$ は極大イデアルである.

(2) $\phi(x^3 - y^2) = 0$ より $\ker \phi \supset (x^3 - y^2)$ である. $f(x, y) \in \ker \psi$ に対して $f(x, y) = g(x, y)(x^3 - y^2) + h_1(x)y + h_2(x)$ となる $g(x, y) \in \mathbb{C}[x, y], h_1(x), h_2(x) \in \mathbb{C}[x]$ が存在する.

$0 = f(t^3, t^2) = h_1(t^2)t^3 + h_2(t^2)$ であるから $-h_1(t^2)t^3 = h_2(t^2)$ である. 右辺の t の次数は偶数であるから,

$h_1 = 0$ である. よって $h_2 = 0$ より $f(x, y) \in (x^3 - y^2)$ である. すなわち $\ker \psi = (x^3 - y^2)$ である.

(3) $\psi(m_{(a,b)}) = (t^3 - a, t^2 - b)$ である.

$b = 0$ のとき. $(t^3 - a, t^2 - b) = (t^3 - a, t^2) = (a, t^2) = \begin{cases} (t^2) & a = 0 \\ (1) & a \neq 0 \end{cases}$ である.

$b \neq 0$ のとき. $(t^3 - a, t^2 - b) = (-a - bt, t^2 - b) = (\frac{a}{b} + t, t^2 - b) = (\frac{a}{b} + t, \frac{a^2}{b^2} - b) = \begin{cases} (\frac{a}{b} + t) & a^2 = b^3 \\ (1) & a^2 \neq b^3 \end{cases}$ である.

0.9 H14 数学選択

[D] (1) $f(t) = \sum a_i t^i, g(t) = \sum b_j t^j$ とする. $\deg f > \deg g$ なら $f(t)^2 + g(t)^2$ の次数は $2 \deg f > 0$ となる. $\deg f = \deg g$ なら $f(t)^2 + g(t)^2$ なら最高次の係数は $a_n^2 + b_n^2 > 0$ より定数でない.

(2) 同型写像 $\phi: \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1) \rightarrow \mathbb{R}[t]$ があると仮定する. $x^2 + y^2 = 1 \in \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ より $\phi(x)^2 + \phi(y)^2 = 1 \in \mathbb{R}[t]$ である.

ψ は \mathbb{R} 上の同型写像であるから $\phi(x), \phi(y) \notin \mathbb{R}$ である. これは (1) に矛盾.

(3) $(x^2 + y^2 - 1)$ が素イデアルであることを示せばよく, そのためには $\mathbb{R}[x, y]$ は UFD であるから $x^2 + y^2 - 1$ が既約であることを示せばよい.

$\mathbb{R}[x]$ は UFD であるから, $\mathbb{R}[x][y]$ 上の既約性は $\mathbb{R}(x)[y]$ 上の既約性と同値である.

可約なら $x^2 + \frac{f(x)^2}{g(x)^2} = 1$ となる $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ が存在する. このとき $x^2 g(x)^2 + f(x)^2 = g(x)^2$ である. x の次数は $\max(2 + 2 \deg g, 2 \deg f) > 2 \deg g$ となり矛盾. したがって $x^2 + y^2 - 1$ は既約である.

0.10 H15 数学選択

[D] (1) $(p) = \mathcal{P} \subset J \subsetneq R$ なる R のイデアル J を任意にとる. PID であるから $J = (d)$ とかける. $R \neq (d)$ より d は単元ではない. $p = dk$ なる $k \in R$ が存在する. p は既約元であるから d, k のいずれかは単元である, よって k は単元. このとき $(d) = (p)$ となるから \mathcal{P} は極大イデアル.

(2) (a) \mathbb{Z} は Euclid 整域であるから PID

$I \subset \mathbb{Z}$ について d を I に属す最小の正整数とする. $a \in I$ について $a = qd + r$ ($0 \leq r < d$) となる q, r が存在する. $a - qd \in I$ より $r \in I$. d の最小性から $r = 0$ である. よって $a \in (d)$ より $I = (d)$ である.

(b) \mathbb{F}_p は体であるから, $\mathbb{F}_p[x]$ は体上の 1 変数多項式環だから PID

$I \subset \mathbb{F}_p[x]$ について $f(x)$ を I に属す次数最小の多項式のうちのひとつとする. $g(x) \in I$ について $g(x) = f(x)q(x) + r(x)$ ($0 \leq \deg r(x) < \deg f(x)$) とできる. $g(x) - f(x)q(x) = r(x)$ より $r(x) \in I$ であるから $r(x) = 0$ である. よって $I = (f(x))$ である.

(c) \mathbb{Z} は体でないから $\mathbb{Z}[x]$ は PID でない.

$I = (2, x)$ を考えると $2f(x) + xg(x) = 1$ なら $2f(0) = 1$ となり矛盾. よって $I \neq \mathbb{Z}[x]$ である. $I = (a(x))$ とすると $x = a(x)f(x)$ とできるが x は既約元であるから $f(x)$ は単元である. よって $f(x) = \pm 1$ であるが

このとき $a(x) = \pm x$ となり $2 \notin (a(x))$ となるから矛盾. よって PID でない.
 一般に $K[x]$ が PID $\Leftrightarrow K$ が体.

[E] (1) 1 列目のベクトルの選び方が $p^2 - 1$ 通り, 正則になるためには 2 列目が 1 列目の定数倍でなければよいから $p^2 - p$ 通り. よって $|G| = (p^2 - 1)(p^2 - p)$ 通り.

(2) $(x - \alpha)(x - \beta)$ と書ける多項式の数を考える. 異なる α, β を選ぶ場合は $p(p - 1)/2$ 通り. $\alpha = \beta$ を選ぶ場合は p 通り. よって $p(p - 1)/2 + p = p(p + 1)/2$ 通り. モニックな多項式の総数は p^2 通りであるから既約なモニック多項式の総数は $p^2 - p(p + 1)/2 = p(p - 1)/2$ 通り.

(3) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & a \end{pmatrix}$ とすれば固有多項式は $\det(xI - A) = x^2 + ax + b$ である. $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ とする. $BA = \begin{pmatrix} -by & x + ay \\ -bw & z + aw \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & w \\ -bx + az & -by + aw \end{pmatrix} = AB$ なら $z = -by, w = x + ay$ である. 逆に $z = -by, w = x + ay$ なら $BA = AB$ である. B は正則であるから $\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} y \\ w \end{pmatrix}$ となる $k \in \mathbb{F}_p$ が存在しない. 存在するとき, $-by = z = kw = kky + kay$ より $y(k^2 + ak + b) = 0$ となる. $x^2 + ax + b$ が既約であるから $k^2 + ak + b = 0$ となる k は存在しない. よって $y = 0$ である.

以上より $y \neq 0$ 以外の (x, y) 毎に $AB = BA$ を満たす B が存在する. したがって $|C(A)| = p^2 - 1$ である.

一般に次が成り立つ. K を体として $A \in M_n(K)$ とする. A の最小多項式が n 次なら $C_{M_n(K)}(A) = K[A]$ である. さらに A が既約なら $K[A]$ は体である.

前半の主張は単因子論を用いて $\{v, Av, \dots, A^{n-1}v\}$ が K^n の基底となる事を示して, $Bv = f \cdot v$ とすれば $Bu = f(A)u$ ($u \in K^n$) となることを示す. 後半の主張は $\varphi: K[x] \rightarrow M_n(K); f(x) \mapsto f(A)$ とすれば $K[x]/(p(x)) \cong K[A]$ となり $p(x)$ が既約なら $K[x]/(p(x))$ は体であるから $K[A]$ も体である. ($p(x)$ は最小多項式)

つまり (3) の答えは $|K[A]^\times| = p^2 - 1$ である.

(4) $A \in GL_2(\mathbb{F}_p)$ の固有多項式が既約な $x^2 + ax + b$ だとする. A は固有ベクトルを持たないから $0 \neq v \in \mathbb{F}_p^2$ について $\{v, Av\}$ は基底となる. この基底に関して A の表現行列は $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$ である. よって固有多項式が $x^2 + ax + b$ であるような行列は全て共役である. よって既約な固有方程式を持つ行列が含まれる共役類は既約な方程式の数に等しい. すなわち $p(p - 1)/2$ 通り.

可約な場合はジョルダン標準形と共役である. ジョルダン標準形の形は $\begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ のいずれかである. これらの異なる共役類の数は $(p - 1) + (p - 1) + ((p - 1)^2 - (p - 1))/2 = (p + 2)(p - 1)/2$ である.

以上より共役類の数は $p(p - 1)/2 + (p + 2)(p - 1)/2 = p^2 - 1$ である.

0.11 H16 数学選択

[A] (1) $x^4 - 14x^2 + 9 = 0$ とする. $x^2 = y$ とおけば $y^2 - 14y + 9 = 0$ より $y = 7 \pm 2\sqrt{10}$ となる. よって $x = \pm\sqrt{7 \pm 2\sqrt{10}}$ が根である.

$\sqrt{7 + 2\sqrt{10}}\sqrt{7 - 2\sqrt{10}} = 3$ より $\mathbb{Q}(\sqrt{7 + 2\sqrt{10}})/\mathbb{Q}$ は 4 次 Galois 拡大である.

$\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{7+2\sqrt{10}})/\mathbb{Q})$ は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ のいずれかである.

$\sigma(\sqrt{7+2\sqrt{10}}) = \sqrt{7-2\sqrt{10}}$ とする. $\sigma^2(\sqrt{7+2\sqrt{10}}) = \sigma(\sqrt{7-2\sqrt{10}}) = \sigma(3/\sqrt{7+2\sqrt{10}}) = 3/\sqrt{7-2\sqrt{10}} = \sqrt{7+2\sqrt{10}}$ より $\sigma^2 = \text{id}$ である.

$\sigma(\sqrt{7+2\sqrt{10}}) = -\sqrt{7+2\sqrt{10}}$ とする. これも $\sigma^2 = \text{id}$ である.

位数が 2 の元を 2 つ以上もつから $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{7+2\sqrt{10}})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である.

(2) $x^4 - 20x^2 + 98 = 0$ とする. $x^2 = y$ とおけば $y^2 - 20y + 98 = 0$ より $y = 10 \pm \sqrt{2}$ となる. よって $x = \pm\sqrt{10 \pm \sqrt{2}}$ が根である.

$\sqrt{10+\sqrt{2}}\sqrt{10-\sqrt{2}} = 7\sqrt{2}$ であり $(\sqrt{10+\sqrt{2}})^2 = 10+\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{10+\sqrt{2}})$ であるから $\mathbb{Q}(\sqrt{10+\sqrt{2}})/\mathbb{Q}$ は 4 次 Galois 拡大である.

$\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{10+\sqrt{2}})/\mathbb{Q})$ として $\sigma(\sqrt{10+\sqrt{2}}) = \sqrt{10-\sqrt{2}}$ とする. $10+\sigma(\sqrt{2}) = \sigma((\sqrt{10+\sqrt{2}})^2) = (\sqrt{10-\sqrt{2}})^2 = 10-\sqrt{2}$ より $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ である. $\sigma^2(\sqrt{10+\sqrt{2}}) = \sigma(\sqrt{10-\sqrt{2}}) = \sigma(7\sqrt{2}/\sqrt{10+\sqrt{2}}) = -7\sqrt{2}/\sqrt{10-\sqrt{2}} = -\sqrt{10+\sqrt{2}}$ より $\sigma^2 \neq \text{id}$ である.

位数が 2 でない元が属すから $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{10+\sqrt{2}})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ である.

[B] (1) k 上 1 次元ベクトル空間は k と同型である. よって $\rho: \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow GL(k)$ としてよい.

$f \in GL(k)$ の元は $a \in k$ に対して $f(a) = f(a \cdot 1_k) = af(1_k)$ であるから $f(1_k)$ で定まる. $i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ に対して $\rho(i)(1_k) = \alpha \in k$ とする. $\rho(i+i+i) = \rho(0) = \text{id}$ より $\rho^3(1_k) = \alpha^3 = 1_k$ である. k の標数は 3 であるから $x^3 - 1_k = (x - 1_k)^3$ より $\alpha = 1_k$ である. よって $\rho(i) = \text{id}$ である. すなわち $\rho(G) = \{\text{id}\}$ である.

(2) 略

(3) $V = W_1 \oplus W_2$ が存在するとする. $\rho(1+3\mathbb{Z})$ の V 上の最小多項式は W_1, W_2 上の最小多項式の最小公倍数である. $\rho(1+3\mathbb{Z})v = \lambda v$ ($\lambda \in k$) とすると, $v = \rho(0+3\mathbb{Z})v = \rho(1+3\mathbb{Z})^3v = \lambda^3v$ より $1_k = \lambda^3$ である. よって $\lambda = 1_k$ である. 最小多項式は固有値以外を根に持たないから W_1 上の最小多項式は $(t - 1_k)$ の因数, W_2 上の最小多項式は $(t - 1_k)^2$ の因数である. すなわち V 上の最小多項式は W_2 上の最小多項式と一致して 2 次以下である.

V の基底 $\{v_1, v_2, v_3\}$ による $\rho(1+3\mathbb{Z})$ の表現行列は $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ であり $(A - E_3)^2 \neq 0$ であるから最小

多項式は 3 次である. これは矛盾.

(4) $W_1 = \langle v_1 + v_2 + v_3 \rangle, W_2 = \langle -v_2 + v_3, v_1 - v_3 \rangle$ とする. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ より $V = W_1 \oplus W_2$ である.

$\rho(1+3\mathbb{Z})(v_1 + v_2 + v_3) = v_1 + v_2 + v_3$ より $\rho(G)W_1 \subset W_1$ である. $\rho(1+3\mathbb{Z})(-v_2 + v_3) = v_1 - v_3 \in W_2, \rho(1+3\mathbb{Z})(v_1 - v_3) = -v_1 + v_2 = -(-v_2 + v_3) - (v_1 - v_3) \in W_2$ より $\rho(G)W_2 \subset W_2$ である.

0.12 H17 数学選択

[L] (1) 二次方程式は $x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1$ の 4 つである. このうち既約なものは根を \mathbb{F}_2 に持たないもの, すなわち x^2+x+1 である.

(2) 二次のモニック多項式は p^2 個ある. 可約なモニック多項式は $(x-\alpha)(x-\beta)$ の形である. $\alpha \neq \beta$ に対して $(x-\alpha)(x-\beta) = (x-\beta)(x-\alpha)$ であることを踏まえると可約なモニック多項式の個数は $(p^2-p)/2 + p = (p^2+p)/2$ である.

よって既約なモニック多項式の個数は $p^2 - (p^2+p)/2 = (p^2-p)/2$ である.

(3) $x^2+1 \in \mathbb{F}_p[x]$ が既約 $\Leftrightarrow -1$ が平方剰余

-1 が平方剰余なら $\exists x \in \mathbb{F}_p^\times$ が $x^4 = 1$ である. すなわち \mathbb{F}_p は位数 4 の部分群を持つから $4|(p-1)$ である.

逆に $4|(p-1)$ なら Sylow の定理から位数が 4 以上の 2-Sylow 部分群 H が存在する. $x^2 = 1$ となる x は ± 1 のみであるから, 位数が 4 以上であることより $\exists x \in H$ が $x^2 = -1$ である. よって -1 は平方剰余である.

すなわち $x^2 + 1$ が既約 $\Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$ である.

[M] (1) $f^2 = \text{id}$ より f は対角化可能であり F 上ベクトル空間として $V = W_1 \oplus W_{-1}$ と分解できる. ここで W_i は固有値 i の固有空間である.

$\varphi: V \rightarrow V_f; v \mapsto v + f(v)$ とすれば $\ker \varphi = W_{-1}$ である. 全射でもあるから $\dim_F V_f = \dim_F V - \dim_F W_{-1}$ である. $W = W_1$ であるから $\dim_F W = \dim_F V - \dim_F W_{-1}$ である. よって $\dim_F V_f = \dim_F W$ である.

$f(v + f(v)) = f(v) + f^2(v) = f(v) + v$ より $V_f \subset W$ である. よって $V_f = W$ である.

K/F は二次拡大であるから $\sigma(\alpha) = -\alpha$ なる $\alpha \in K$ が存在する. W の F 上の基底 $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ をとる.

$\{\alpha v_1, \alpha v_2, \dots, \alpha v_m\}$ は W_{-1} の基底となる. $v \in W_{-1}$ に対して $\alpha v \in W$ より $\alpha v = \sum_{i=1}^m a_i v_i$ より $\alpha^2 v = \sum_{i=1}^m a_i \alpha v_i, \alpha^2 \in F$ より W_{-1} を生成する. また $\sum c_i \alpha v_i = 0$ ($c_i \in F$) なら $\sum c_i v_i = 0$ であるから $c_i = 0$ である. よって $\{\alpha v_1, \alpha v_2, \dots, \alpha v_m\}$ は W_{-1} の基底となる.

$u \in V$ に対して $u = u_1 + u_{-1}$ ($u_1 \in W_1, u_{-1} \in W_{-1}$) と一意にあらわせる. $u_1 \in W$ より $u_1 = \sum_{i=1}^m a_i v_i$ と表せる. また $u_{-1} = \sum_{i=1}^m b_i \alpha v_i$ と表せる. よって $u = \sum_{i=1}^m (a_i + b_i \alpha) v_i$ と表せる. すなわち $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ は K 上で V を生成する.

$\sum (a_i + b_i \alpha) v_i = 0$ ($a_i, b_i \in F$) とする. $\sum a_i v_i = 0 \in W, \sum b_i \alpha v_i = 0 \in W_{-1}$ である. よって $a_i = b_i = 0$ である. すなわち $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ は K 上で V の基底となる.

よって $m = n$ である. すなわち $\dim_F W = n$ である.

0.13 H18 数学選択

[1] (1) F/K が 2 次拡大であれば $\alpha \in F \setminus K$ の最小多項式の根は $a + b\sqrt{\beta}$ の形で表せる. この $\sqrt{\beta}$ を添加した体は F となる.

2 次の中間体の一つを $M = K(\sqrt{\beta})$ ($\beta \in K$) とする. L/M は 2 次拡大であるから, $L = M(\sqrt{\gamma})$ ($a, b \in K, \gamma = a + b\sqrt{\beta}$) と表せる.

$b \neq 0$ のとき. $(\gamma^2 - a^2)^2 = b^2 \beta$ より $x^4 - 2ax^2 + (a^2 - b^2 \beta) = 0$ の根は $\pm \sqrt{a \pm b\sqrt{\beta}}$ である. この多項式が可約なら $K(\sqrt{a + b\sqrt{\beta}})/K$ は 2 次拡大である. $(\sqrt{a + b\sqrt{\beta}})^2 = a + b\sqrt{\beta}$ より $K(\sqrt{a + b\sqrt{\beta}}) = K(\sqrt{\beta}) = M$ となる. これは矛盾. よって多項式は既約である.

$b = 0$ のとき $\delta = \sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma}$ とすると $(\delta - \sqrt{\beta})^2 = \gamma = a^2$ より $\delta^2 + \beta - a^2 = 2\sqrt{\beta}\delta$. よって $\delta^4 + 2(\beta - a^2)\delta^2 + (\beta - a^2)^2 = 4\beta\delta^2$ より $x^4 - 2(a^2 + \beta)x^2 + (\beta - a^2)^2 = 0$ の根は $\pm\sqrt{\beta} \pm \sqrt{\gamma}$ である. 標数が 2 でないから $K(\sqrt{\beta}, \sqrt{\gamma})/K$ は Galois 拡大である. Galois 群は $\{\text{id}, \sigma, \tau, \sigma \circ \tau\}$ ($\sigma(\sqrt{\beta}) = \sqrt{\beta}, \sigma(\sqrt{\gamma}) = \sqrt{\gamma}, \tau(\sqrt{\beta}) = -\sqrt{\beta}, \tau(\sqrt{\gamma}) = \sqrt{\gamma}$) である.

このとき任意の $f \in \text{Gal}(K(\sqrt{\beta}, \sqrt{\gamma})/K)$ に対して $f(\delta) \neq \delta$ であるから, $K(\delta)/K$ は 4 次拡大である. すなわち $x^4 - 2(a^2 + \beta)x^2 + (\beta - a^2)^2$ は既約である.

(2) $b \neq 0$ のとき, $a^2 - b^2 \beta = c^2$ ($c \in K$) である. $\sqrt{a + b\sqrt{\beta}}\sqrt{a - b\sqrt{\beta}} = \sqrt{a^2 - b^2 \beta} = c \in K$ より $K(\sqrt{a + b\sqrt{\beta}}) \ni \sqrt{a - b\sqrt{\beta}}$ である. よって L/K は Galois 拡大である.

$\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ について $\sigma(\sqrt{a + b\sqrt{\beta}}) = \sqrt{a - b\sqrt{\beta}}$ とする. このとき $\sigma^2(\sqrt{a + b\sqrt{\beta}}) = \sigma(\sqrt{a - b\sqrt{\beta}}) = \sigma(c/\sqrt{a + b\sqrt{\beta}}) = c/\sqrt{a - b\sqrt{\beta}} = \sqrt{a + b\sqrt{\beta}}$ より $\sigma^2 = \text{id}$ である. すなわち $\text{Gal}(L/K)$ は位数 2 の元を二つもつ.

$\text{Gal}(L/K)$ は位数 4 の群であるから, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ のいずれかである. 位数 2 の元を二つもつ群は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ であるから, $\text{Gal}(L/K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である.

よって中間体の数は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ の部分群の数であるから 5 である. 非自明な中間体は 3 個ある.

0.14 H19 数学選択

[7] (1) $\text{ch} F \neq 2$ より $\alpha \neq -\alpha$ である. したがって $F(\alpha)/F$ は Galois 拡大である. $\text{id} \neq \sigma \in \text{Gal}(F(\alpha)/F)$ をとる. $\sigma(\alpha) = -\alpha$ である. $F(\beta) = F(\alpha)$ より $\sigma(\beta) = -\beta$ である. よって $F(\alpha\beta) = \alpha\beta$ より $\alpha\beta \in F$ である. すなわち $ab = (\alpha\beta)^2$ となり F の平方数.

(2)(a) $\text{Gal}(L/F) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ であるから, 唯一の真部分群 $\{\bar{0}, \bar{2}\}$ に対応する中間体 K が唯一の非自明な中間体である.

(b) F 上 2 次の元とすると $F(\xi)/F$ は 2 次拡大であるから $F(\xi) = K = F(\gamma)$ である. このとき $L = K(\xi) = F(\xi)$ となり矛盾する. したがって 4 次の元である.

(c) ξ の F 上の最小多項式は $(x^2 - p)^2 = q^2 c$ である. この方程式の解は $\pm\sqrt{p \pm q\gamma}$ である. L/K は Galois 拡大であるから, $L = K(\sqrt{p+q\gamma}) = K(\sqrt{p-q\gamma})$ である. したがって $(p+q\gamma)(p-q\gamma) = p^2 - q^2\gamma^2 = (a+b\gamma)^2$ なる $a, b \in F$ が存在する. $p^2 - q^2c - a^2 - b^2c = 2ab\gamma$ より $ab = 0$ である.

$a = 0$ のとき, $p^2 - q^2c = b^2c$ より $p^2 = (b^2 + q^2)c$ である. よって $c = (\frac{pb}{b^2+q^2})^2 + (\frac{pq}{b^2+q^2})^2$ とできる.

$b = 0$ なら $\sqrt{p^2 - q^2c} = a \in F$ である. $\sigma(\sqrt{p+q\gamma}) = \sqrt{p-q\gamma}$ に対して $\sigma(\sqrt{p-q\gamma}) = \sigma(a/\sqrt{p+q\gamma}) = \frac{a}{\sqrt{p-q\gamma}} = \sqrt{p+q\gamma}$ である. したがって $\sigma^2 = \text{id}$ である. $\tau(\sqrt{p+q\gamma}) = -\sqrt{p+q\gamma}$ とすると $\tau^2 = \text{id}$ である. これは $\text{Gal}(L/K)$ が巡回拡大であることに矛盾.

0.15 H20 数学選択

[A] (1) $F(\beta)/F$ が 2 次拡大であり, β が F 上分離的であるから β の最小多項式は $(x - \beta)(x - \gamma)$ ($\beta \neq \gamma \in F(\beta)$) である. $(x - \beta)(x - \gamma) = x^2 - (\beta + \gamma)x + \beta\gamma$ であり $\beta + \gamma = 0 \Leftrightarrow \beta = -\gamma = \gamma$ ($\because \text{ch} F = 2$) より $\beta + \gamma \neq 0$ である.

$\beta^2 + a\beta + b = 0$ より $(\frac{\beta}{a})^2 + (\frac{\beta}{a}) + \frac{b}{a^2} = 0$ である. したがって $x^2 + x + \frac{b}{a^2}$ が α を根にもつ二次方程式.

(2) K/F が 2 次拡大であるから $K = F(\beta)$ なる β が存在する. 非自明な自己同型 σ によって $\sigma(\beta) \neq \beta$ となるから β は F 上分離的. したがって (1) から $x^2 + x + \frac{b}{a^2}$ の根 $\alpha \in F$ が存在する.

$(\frac{\beta}{a} + 1)^2 + (\frac{\beta}{a} + 1) + \frac{b}{a^2} = \frac{1}{a^2}(\beta^2 + a\beta + 1 + 2a\beta + a^2 + a^2) = 0$ より $\alpha + 1$ は α の F 上の共役である.

よって $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$.

[B] (1) $x^4 - (t^2 + \frac{1}{t^2})x^2 + 1$ について $t, \frac{1}{t}$ は根である. したがって $t, \frac{1}{t}$ は共に S 上整である. S 上整な元全体は環をなすから $S[t, \frac{1}{t}] = R$ は S 上整である.

(2) R の商体は $L = \mathbb{C}(t)$, S の商体は $K = \mathbb{C}(t^2 + \frac{1}{t^2})$ である. t の K 上の最小多項式は $x^4 - (t^2 + \frac{1}{t^2})x^2 + 1$ の因数である. よって根は $\pm t, \pm \frac{1}{t}$ のいずれかに限る. 全て $\mathbb{C}(t)$ の元であるから L/K は正規拡大. \mathbb{C} は完全体であるから L/K は Galois 拡大である.

(3) $\sigma(t) = -t, \tau(t) = \frac{1}{t}$ が共に L の K 上の自己同型となるから $[L : K] = 4$ であり, また σ, τ の位数が 2 であるから $\text{Gal}(L/K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ である.

σ で固定される体は $\mathbb{C}(t^2)$, τ で固定される体は $\mathbb{C}(t + \frac{1}{t})$, $\sigma \circ \tau$ で固定される体は $\mathbb{C}(t - \frac{1}{t})$ である. これに自明な中間体 L, K を加えた 5 つ全ての中間体.

(4) R は $\mathbb{C}[t]$ の $\{t^i \mid i = 0, 1, 2, \dots\}$ による局所化である. UFD の局所化は UFD であるから R は UFD.

L に対して R が S 上整であり, L は R の商体である. R は UFD であるから R は正規環. すなわち L の元で R 上整な元は R の元である. R 上整な元は S 上整であるから $T_L = R$ である.

K は S の商体であり, S は PID であるから正規環. よって $T_K = S$ である.

$\mathbb{C}(t^2)$ は $S \subset \mathbb{C}[t^2, \frac{1}{t^2}]$ の商体である. $\mathbb{C}[t^2, \frac{1}{t^2}]$ は UFD であるから同様に $T_{\mathbb{C}(t^2)} = \mathbb{C}[t^2, \frac{1}{t^2}]$ である.

$\mathbb{C}(t + \frac{1}{t})$ は $S \subset \mathbb{C}[t + \frac{1}{t}]$ の商体である. 上と同様に $T_{\mathbb{C}(t + \frac{1}{t})} = \mathbb{C}[t + \frac{1}{t}]$ である.

$\mathbb{C}(t - \frac{1}{t})$ は $S \subset \mathbb{C}[t - \frac{1}{t}]$ の商体である. 上と同様に $T_{\mathbb{C}(t - \frac{1}{t})} = \mathbb{C}[t - \frac{1}{t}]$ である.

0.16 H21 数学選択

[A] (1) $\tau^2 = \text{id}$ であり $\sigma^2(a) = -a - b, \sigma^2(b) = a$ より $\sigma^3 = \text{id}$ である. $\tau \circ \sigma \circ \tau(a) = \tau \circ \sigma(b) = \tau(-a - b) = -a - b = \sigma^2(a), \tau \circ \sigma \circ \tau(b) = \tau \circ \sigma(a) = \tau(b) = \sigma^2(b)$ である.

よって $\tau \circ \sigma \circ \tau = \sigma^{-1}$ となるから $G \cong D_3 \cong S_3$ である.

(2) $\tau(p) = p, \tau(q) = q, \sigma(p) = b(-a - b) + b^2 + (-a - b)^2 = ab + a^2 + b^2 = p, \sigma(q) = -b(-a - b)(b - a - b) = -ab(a + b) = q$ である. よって G 不変.

(3) $s_1 = a + b, s_2 = ab$ とする. $\tau(s_1) = s_1, \tau(s_2) = s_2$ である. τ 不変な元は対称式である. 対称式は基本対称式の多項式として表せるから $\mathbb{C}[s_1, s_2]$ が H 不変な元からなる環である.

(4) $h(s_1, s_2) = (s_1^2 - s_2, -s_1 s_2)$ とすれば $h \circ g(a, b) = h \circ (a + b, ab) = (ab + a^2 + b^2, -ab(a + b)) = f(a, b)$ である.

(5) $\mathbb{C}[P, X]$ は UFD であるから $X^3 - PX - Q$ の既約性はその商体 $\mathbb{C}(P, X)$ における既約性と等しい. $\mathbb{C}(P, X)[Q]$ は体上の多項式環であるから PID である. $\varphi: \mathbb{C}(P, X)[Q] \rightarrow \mathbb{C}(P, X); Q \mapsto X^3 - PX$ とすればこれは環準同型である. $\mathbb{C}(P, X)[Q]/(X^3 - X - Q) \cong \mathbb{C}(P, X)$ より $(X^3 - PX - Q)$ は素イデアル. したがって $X^3 - PX - Q$ は既約である.

よって $X^3 - PX - Q$ は $\mathbb{C}[P, X][Q] = \mathbb{C}[P, Q, X]$ 上で既約.

(6) $X^3 - (ab + a^2 + b^2)X + ab(a + b) = X^3 - (S_1^2 - S_2)X + S_1 S_2 = (X + S_1)(X^2 - S_1 X + S_2) = (X + a + b)(X^2 - (a + b)X + ab)$ となるから既約でない.

[B] (1) $x^p - q$ はアイゼンシュタインの既約判定法から $\mathbb{Z}[x]$ 上既約である. \mathbb{Z} は UFD であるから $\mathbb{Q}[x]$ 上でも既約. $\zeta_p = \cos \frac{2\pi}{p} + i \sin \frac{2\pi}{p}$ とすると, 根は $\zeta_p^i \sqrt[p]{q}$ ($i = 0, 1, \dots, p-1$) である.

また $\zeta_p \sqrt[p]{q} / \sqrt[p]{q} = \zeta_p$ であるから $\zeta_p \in K$ である. よって $K = \mathbb{Q}(\zeta_p, \sqrt[p]{q})$ である.

(2) $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大であり, Galois 群は $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ で与えられる. また $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})/\mathbb{Q}$ は p 次拡大である. $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q}) \cdot \mathbb{Q}(\zeta_p) = K$ となるから $K/\mathbb{Q}(\zeta_p)$ は p 次拡大である. よって $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ である. $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ とすれば $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大であるから $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \triangleleft G$ である. また推進定理より $K/\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})$ は Galois 拡大で $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ である.

$\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})/\mathbb{Q}$ は非自明な中間体をもたないから $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q}) \cap \mathbb{Q}(\zeta_p) = \mathbb{Q}$ である. $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \cap \text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})) = \text{Gal}(K/K) = 1, \text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \cdot \text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})) = \text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = G$ である. よって $G \cong \text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \rtimes \text{Gal}(K/\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$

0.17 H22 数学選択

[A] (1) $\mathbb{Z}[x]$ 上で 2 が \mathbb{Z} の素元であるからアイゼンシュタインの既約判定法より $x^2 - 2$ は既約である. \mathbb{Q} が \mathbb{Z} の商体であり \mathbb{Z} が UFD であることから, $\mathbb{Z}[x]$ 上の既約性と \mathbb{Q} 上の既約性が同値であることから $x^2 - 2$ は $\mathbb{Q}[x]$ 上既約である.

したがって $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ である.

$x^3 - 3$ も同様に既約. よって $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}), \mathbb{Q}] = 3$ である.

(2) $x^2 - 2$ は $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{3}]$ 上既約である. もし可約なら $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ となり \mathbb{Q} 上拡大次 2 の中間体を含むがこれは $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}) : \mathbb{Q}]$ が 3 次であることに矛盾.

よって $[F : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})] = 2$ より $[F : \mathbb{Q}] = 6$ である.

(3) $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \zeta_3)$ ($\zeta_3 = e^{\frac{2\pi i}{3}}$) である. これは $x^3 - 3$ の根が $\zeta_3^i \sqrt[3]{3}$ ($i = 0, 1, 2$) であり $\zeta_3 = \zeta_3 \sqrt[3]{3} / \sqrt[3]{3}$ であることからわかる.

$[\mathbb{Q}(\zeta_3) : \mathbb{Q}] = 2$ である. $L = F \cdot \mathbb{Q}(\zeta_3)$ である. また $\mathbb{Q}(\zeta_3) \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}$ より $F \cap \mathbb{Q}(\zeta_3) = \mathbb{Q}$ である. よって $[F : \mathbb{Q}] = 12$ である.

0.18 H23 数学選択

[B] (1) $\alpha^2 - 2 = \sqrt{2}$ より $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\alpha)$.

(2) $\alpha^4 - 4\alpha^2 + 2$ は $\mathbb{Q}[x]$ 上既約である. これは $2 \in \mathbb{Z}$ によってアイゼンシュタインの既約判定法によって $\mathbb{Z}[x]$ 上で既約であることからわかる.

よって $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$ である. すなわち $\alpha \notin \mathbb{Q}$ である.

(3) (2) より $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$.

(4) (2) より $x^4 - 4x^2 + 2$ である. \mathbb{Q} 上共役は $\pm\alpha, \sqrt{2-\sqrt{2}}$ である.

(5) $\sqrt{2+\sqrt{2}}\sqrt{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ より $\mathbb{Q}(\alpha) \ni \sqrt{2-\sqrt{2}}$ となる全ての共役元が $\mathbb{Q}(\alpha)$ に属すから正規拡大. \mathbb{Q} は完全体であるから Galois 拡大.

(6) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) \ni \sigma$ について $\sigma(\sqrt{2+\sqrt{2}}) = \sqrt{2-\sqrt{2}}$ とする. $2 + \sigma(\sqrt{2}) = \sigma((\sqrt{2+\sqrt{2}})^2) = (\sqrt{2-\sqrt{2}})^2 = 2 - \sqrt{2}$ であるから $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ である.

よって $\sigma^2(\sqrt{2+\sqrt{2}}) = \sigma(\sqrt{2-2\sqrt{2}}) = \sigma(\sqrt{2})/\sigma(\sqrt{2+\sqrt{2}}) = -\sqrt{2}/(\sqrt{2-\sqrt{2}}) = -\sqrt{2+\sqrt{2}}$ である.

よって $\sigma^2 \neq \text{id}$ である.

$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$ より $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ である.

0.19 H24 数学選択

[B] (1) $H \subset G \subset GL(2, \mathbb{F}_p)$ は明らか. $G \ni A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ に対して $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a & -b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である.

$G \ni B = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ に対して $BA^{-1} = \begin{pmatrix} c/a & -cb/a + d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ より $G \leq GL(2, \mathbb{F}_p)$ である.

$a = c = 1$ のとき $BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b + d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ であるから $H \leq G$ である.

$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & ac + b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & ac \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ より $H \triangleleft G$ である.

(2) L/K が Galois 拡大 $\Leftrightarrow \text{Gal}(F/L) \triangleleft \text{Gal}(F/K)$ である.

$S = \left\{ \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{F}_p^\times \right\}$ とする.

$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/a & -b/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -bc + b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin S$ より $S \triangleleft G$ でない. よって S に対応する中間体 L は L/K が Galois 拡大でない.

(3) $\text{Gal}(F/M) \cong H \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ であり $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ は非自明な部分群をもたないから F/M は非自明な中間体を持たない.

(4) $\text{Gal}(M/K) \cong \text{Gal}(F/K)/\text{Gal}(F/M) \cong G/H$ である.

$G \rightarrow \mathbb{F}_p^\times; \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto a$ とすれば全射準同型であり核は H であるから $G/H \cong \mathbb{F}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ である.

$a \in \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ に対して $\gcd(a, p-1) = d$ とすれば $ab + c(p-1) = d$ となる $b, c \in \mathbb{Z}$ が存在するから $\langle a \rangle = \langle d \rangle$ である. よって $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ の部分群は $p-1$ の正の約数の個数ある.

すなわち M/K の中間体の個数も $p-1$ の正の約数の個数ある.

[D] $\partial_0 \circ \partial_1 = 0, \partial_1 \circ \partial_2 = 0, \partial_2 \circ \partial_3 = 0$ である. ($\because \partial_1 = 0, \partial_3 = 0$)

(1) $\partial_2 = 0$ なら, $\forall i \in \{0, 1, 2, 3\}, \partial_i = 0$ である.

$\text{Ker } \partial_i = C_i, \text{Im } \partial_i = 0$ であるから $H_i \cong C_i$ である.

(2) $\text{ker } \partial_2 = 0, \text{Im } \partial_2 = \langle (2, 0) \rangle_{\mathbb{Z}}$ である. よって $H_2 = 0, H_1 = \mathbb{Z}^2 / \langle (2, 0) \rangle_{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, H_0 = C_0$ である.

(3) $p = q = 0$ なら (1) と同じ.

$pq \neq 0$ なら (2) と同様にして $H_1 = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ である.

0.20 H25 数学選択

[A] (1) $x^2 - 5$ は既約. よって $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 2$ である. 最小多項式の根は $\pm\sqrt{5}$ である. すなわち $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大である. Galois 群は $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である. 中間体は $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ である.

(2) $x^3 - 5$ は既約. よって $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}) : \mathbb{Q}] = 3$ である. 最小多項式の根は $\sqrt[3]{5}, \omega\sqrt[3]{5}, \omega^2\sqrt[3]{5}$ である. ただし $\omega = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$ とする. $\omega \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ であるから $\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}) \subset \mathbb{R}$ である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大でない.

Galois 閉包は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \omega)$ である. $x^2 + x + 1$ は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ 上既約であるから $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})] = 2$ である. よって $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \omega) : \mathbb{Q}] = 6$ である.

(3) $x^2 + x + 1$ は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上唯一の 2 次の既約なモニック多項式である. したがって $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上の可約な 4 次多項式で $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ に根を持たない多項式は $(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1$ のみである. すなわち $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上既約である.

仮に $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ が $\mathbb{Q}[x]$ 上可約であるとする. これは $\mathbb{Z}[x]$ 上可約であることを意味する. このとき $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ から誘導される写像で $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ を送ると, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[x]$ 上で可約となり矛盾する. したがって $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ は $\mathbb{Q}[x]$ 上既約である.

すなわち $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ は 4 次の Galois 拡大である.

$\sigma(\zeta_5) = \zeta_5^2$ とする. $\sigma^2(\zeta_5) = \zeta_5^4 \neq \zeta_5$ であるから $\sigma^2 \neq \text{id}$ である. よって σ の位数は 4 であるから $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ である.

よって中間体はただ一つ存在して $\mathbb{Q}(\zeta_5 + \zeta_5^{-1}) = \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{5})$ である.

円分体の知識をみとめれば, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ であることがすぐにわかる.

0.21 H26 数学選択

[A] (1) $\varphi: \mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}[z, \frac{1}{z}]$ を $\varphi(x) = z, \varphi(y) = \frac{1}{z}$ として定める. φ は全射準同型である. $\ker \varphi \supset (xy - 1)$ は明らか. $f(x, y) \in \ker \varphi$ とする. $f(x, y) = (xy - 1)g(x, y) + p(y)$ ($g \in \mathbb{C}[x, y], p \in \mathbb{C}[y]$) とできる. $\varphi(f(x, y)) = \varphi(p(y)) = p(\frac{1}{z}) = 0$ である. よって $p = 0$ であるから $f(x, y) \in (xy - 1)$ である. したがって $\ker \varphi = (xy - 1)$ である.

すなわち $\mathbb{C}[x, y]/(xy - 1) \cong \mathbb{C}[z, \frac{1}{z}]$ である.

$\mathbb{C}[z, \frac{1}{z}]$ の商体は $\mathbb{C}(z)$ であるから $\mathbb{C}[x, y]/(xy - 1)$ の商体は $\mathbb{C}(z)$ と同型である.

(2) $\mathbb{C}[z]^\times = \mathbb{C}^\times$ である.

また $\mathbb{C}[z, \frac{1}{z}]^\times = \{cz^k \mid c \in \mathbb{C}^\times, k \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{C}^\times \times \mathbb{Z}$ である.

すなわち乗法群が異なるから $\mathbb{C}[x, y]/(xy - 1), \mathbb{C}[z]$ は同型でない.

(3) $\varphi: \mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}; \varphi(x) = a, \varphi(y) = b$ とする. φ は全射準同型である. $\ker \varphi \supset ((x - a), (y - b))$ は明らか. $f(x, y) \in \ker \varphi$ とする. $f(x, y) = (x - a)g_1(x, y) + (y - b)g_2(y) + r$ ($g_1, g_2 \in \mathbb{C}[x, y], r \in \mathbb{C}$) とできる.

$\varphi(f(x, y)) = r = 0$ である. よって $f(x, y) \in ((x-a), (y-b))$ である. したがって $\ker \varphi = ((x-a), (y-b))$ である.

すなわち $\mathbb{C}[x, y]/((x-a), (y-b)) \cong \mathbb{C}$ であるから $((x-a), (y-b))$ は極大イデアルである.

(4) $xy - 1 \in ((x-a), (y-b))$ なら $xy - 1 = (x-a)g_1(x, y) + (y-b)g_2(x, y)$ とできる. $x = a, y = b$ として $ab = 1$ である.

逆に $ab = 1$ なら $xy - ab = (x-a)y + (y-b)a$ とできるから $xy - 1 \in ((x-a), (y-b))$ である. すなわち $ab = 1$ が必要十分条件.

[B] (1) \mathbb{Z} は UFD でありその商体は \mathbb{Q} であるから $\mathbb{Z}[x]$ 上既約な多項式は $\mathbb{Q}[x]$ 上既約である.

$x^4 - 2$ はアイゼンシュタインの既約判定法から $\mathbb{Z}[x]$ 上既約である. よって $\mathbb{Q}[x]$ 上既約である.

(2) $x^4 - 2$ が $\sqrt[4]{2}$ の最小多項式であるから $[L : \mathbb{Q}] = 4$ である.

(3) $x^4 - 2 = 0$ をといて $x = \sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}$ が $\sqrt[4]{2}$ の \mathbb{Q} 上の共役である.

(4) $L \subset \mathbb{R}$ より $i \notin L$ であるから L/\mathbb{Q} は正規拡大でない. よって Galois 拡大でない.

(5) L の \mathbb{Q} 上自己同型 σ は $\sqrt[4]{2}$ をその共役に移す. よって $\sigma(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$ または id の何れかである. すなわち $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である.

(6) $i\sqrt[4]{2}/\sqrt[4]{2} = i$ であるから $i \in F$ である. よって $F = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ である.

$\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ は二次拡大であるから $[F : \mathbb{Q}] = 8$ である.

0.22 H27 数学選択

[1] (1) 略.

(2) $\frac{1}{a+b\sqrt{5}} = \frac{a-b\sqrt{5}}{a^2-5b^2}$ より $a^2-5b^2 = \pm 1$ なら逆元を持つ. $(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5}) = -1$ である. $a_n + b_n\sqrt{5} = (2+\sqrt{5})^n$ とする. $\sigma(a+b\sqrt{5}) = a-b\sqrt{5}$ は A 上の同型射像であるから $(2-\sqrt{5})^n = \sigma((2+\sqrt{5})^n) = a_n - b_n\sqrt{5}$ である. よって $a_n^2 - 5b_n^2 = (a_n + b_n\sqrt{5})(a_n - b_n\sqrt{5}) = (2+\sqrt{5})^n(2-\sqrt{5})^n = (-1)^n$ より A^\times は無限群.

加法		0	1	$\sqrt{5}$	$1+\sqrt{5}$	乗法		[0]	[1]	$[\sqrt{5}]$	$[1+\sqrt{5}]$
(3)	0	0	1	$\sqrt{5}$	$1+\sqrt{5}$	[0]		[0]	[0]	[0]	[0]
	1	1	0	$1+\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$	[1]		[0]	[1]	$[\sqrt{5}]$	$[1+\sqrt{5}]$
	$\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$	$1+\sqrt{5}$	0	1	$[\sqrt{5}]$		[0]	$[\sqrt{5}]$	[1]	$[1+\sqrt{5}]$
	$1+\sqrt{5}$	$1+\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$	1	0	$[1+\sqrt{5}]$		[0]	$[1+\sqrt{5}]$	$[1+\sqrt{5}]$	[0]

$\sqrt{5})^2 = 0$ より整域でない. (4) $a + b\sqrt{5} \in A/J$ が逆元を持つ $\Leftrightarrow a^2 - 5b^2 \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ である.

a	$a^2 \pmod{7}$	$5a^2 \pmod{7}$
0	0	0
1	1	5
2	4	6
3	2	3
4	2	3
5	4	6
6	1	5

表より $a^2 - 5b^2 = 0$ となる (a, b) は $(a, b) = (0, 0)$ のみ. よって $(A/J)^\times = (A/J) \setminus \{0\}$ より A/J は体であり, $|A/J| = 49$ である.

[B] (1) $(x^2 - 2)^2 = 3$ とすればこれは α を根にもつ. 整理すると $x^4 - 4x^2 + 1$ である. $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ とする. $f(x)$ 既約であることと $f(x+1)$ が既約であることは同値である. $f(x+1) = (x+1)^4 - 4(x+1)^2 + 1 = x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 4x - 2$ となりこれはアイゼンシュタインの既約判定法から既約である. すなわち $f(x)$ が α の最小多項式である.

(2) α の \mathbb{Q} 上の共役は $f(x) = 0$ をといて $\pm\sqrt{2\pm\sqrt{3}}$ である. $\sqrt{2+\sqrt{3}}\sqrt{2-\sqrt{3}} = 1$ より $\mathbb{Q}(\alpha) \ni \sqrt{2-\sqrt{3}}$ より正規拡大. \mathbb{Q} は完全体であるから $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大.

(3) $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})$ について $\sigma(\sqrt{2+\sqrt{3}}) = \sqrt{2-\sqrt{3}}$ とする. $\sigma^2(\sqrt{2+\sqrt{3}}) = \sigma(\sqrt{2-\sqrt{3}}) = \sigma(1/\sqrt{2+\sqrt{3}}) = \sqrt{2+\sqrt{3}}$ より $\sigma^2 = \text{id}$ である. $\tau(\sqrt{2+\sqrt{3}}) = -\sqrt{2+\sqrt{3}}$ も $\tau^2 = \text{id}$ である.

位数 2 の元が 2 つ以上存在する位数 4 の群は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ のみである.

(4) $\mathbb{Q}(\alpha)$ に含まれる \mathbb{Q} の 2 次拡大は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ の真部分群に対応する. $\langle \sigma \rangle$ の固定体は $\mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}})$ である. $(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}})^2 = 6$ より $\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{6}$ である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ が $\langle \sigma \rangle$ の固定体.

$\langle \tau \rangle$ の固定体は $\mathbb{Q}(\alpha^2) = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ である.

$\langle \sigma \circ \tau \rangle$ の固定体は $\mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}})$ である. $(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}})^2 = 2$ より $\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{2}$ である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ が $\langle \sigma \circ \tau \rangle$ の固定体.

0.23 H28 数学選択

[A] (1) $\varphi(t^2 - ut + v) = x^2 - (x+y)x + xy = 0$ である. よって $\ker \varphi \supset (t^2 - ut + v)$ である. $f \in \ker \varphi$ とすると, $f(u, v, t) = (t^2 - ut + v)g(u, v, t) + h_1(u, v)t + h_2(u, v)$ である. よって $h_1(x+y, xy)x + h_2(x+y, xy) = 0$ である. $h_1(x+y, xy)x$ は対称式の項をもたず, $h_2(x+y, xy)$ は対称式の項のみからなるので, $h_1 = 0, h_2 = 0$ である.

(2) $\varphi(I_{(a,b)})$ が素イデアル. $\Leftrightarrow \mathbb{R}[x, y]/\varphi(I_{(a,b)})$ が整域. ここで $\mathbb{R}[x, y] \cong \mathbb{R}[u, v, t]/\ker \varphi$ であるから, $\mathbb{R}[x, y]/\varphi(I_{(a,b)}) \cong (\mathbb{R}[u, v, t]/\ker \varphi)/((\ker \varphi, I_{(a,b)})/\ker \varphi) \cong \mathbb{R}[u, v, t]/(\ker \varphi, I_{(a,b)})$ である.

$(\ker \varphi, I_{(a,b)}) = (t^2 - ut + v, u - a, v - b) = (t^2 - at + b, u - a, v - b)$ であるから, $\mathbb{R}[u, v, t]/(\ker \varphi, I_{(a,b)}) \cong \mathbb{R}[t]/(t^2 - at + b)$ である. これが整域となるのは $t^2 - at + b$ が既約であるときである. すなわち $a^2 - 4b < 0$ のときである.

以上より, $\varphi(I_{(a,b)})$ が素イデアルであるのは, $a^2 - 4b < 0$ のときである.

[B] (1) $F = \mathbb{Q}(\alpha)(\beta)$ とかける. β の $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上の最小多項式は $P(X)/(X - \alpha)$ の因数であるから 3 次以下である. よって $[F : \mathbb{Q}(\alpha)] \leq 3$ である.

(2) $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$ より $[F : \mathbb{Q}] = [F : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4[F : \mathbb{Q}(\alpha)]$ であるから (1) より $[F : \mathbb{Q}] = 4, 8, 12$ のいずれかである.

(3) F/\mathbb{Q} が Galois 拡大であるから Galois 群は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ か $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の何れかである. どちらも真部分群を含むから, F/\mathbb{Q} は非自明な中間体をもつ.

(4) $P(X) = X^4 - 4X^2 + 1$ とする. $P(X+1) = X^4 + 4X^3 + 2X^2 - 4X - 2$ は既約であるから $P(X)$ は既約多項式である. $P(X)$ の根は $\pm\sqrt{2\pm\sqrt{3}}$ である. $\sqrt{2+\sqrt{3}}\sqrt{2-\sqrt{3}} = 1$ より $F = \mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{3}})$ とすれば F/\mathbb{Q} は Galois 拡大で $[F : \mathbb{Q}] = 4$ である.

$\sigma(\sqrt{2+\sqrt{3}}) = \sqrt{2-\sqrt{3}}$ とすると, $\sigma^2(\sqrt{2+\sqrt{3}}) = \sigma(\sqrt{2-\sqrt{3}}) = \sigma(1/\sqrt{2+\sqrt{3}}) = \sqrt{2+\sqrt{3}}$ であるから, $\sigma^2 = \text{id}$ である.

また $\tau(\sqrt{2+\sqrt{3}}) = -\sqrt{2+\sqrt{3}}$ についても $\tau^2 = \text{id}$ であるから, $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ は位数 2 の元を 2 つ以上もつ. よって $\text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ より巡回群でない.

(5) β の $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上の最小多項式の次数は 2 である. したがって γ, δ のいずれか一方のみが $\mathbb{Q}(\alpha)$ に属す. $\gamma \in \mathbb{Q}(\alpha)$ として一般性を失わない. よって $\sigma(\alpha) = \gamma$ とすれば σ は $\mathbb{Q}(\alpha)$ の恒等写像でない同型射である.

$\mathbb{Q}(\alpha)$ の恒等写像でない同型射について, $\sigma(\alpha)$ は α の \mathbb{Q} 上共役であるから存在すれば $\sigma(\alpha) = \gamma$ のみである. よって一意性も示された.

0.24 H29 数学選択

[A] (1) $\varphi(f+g) = f+g, \varphi(fg) = fg, \varphi(1) = 1$ より部分環.

(2) $\psi(f(s, t, u)) = f(x^3, y^3, xy)$ とする. $\varphi(f(x^3, y^3, xy)) = f(x^3, y^3, xy)$ より $\psi(f) \in R$ である. 準同型であることは明らか. R の任意の元は $g(x, y) = \sum_{3|(i+2j)} a_{ij} x^i y^j$ と表される. $\sum_{3|(i+2j)} a_{ij} x^i y^j = \sum_{i \equiv 0 \equiv j} a_{ij} x^i y^j + \sum_{i \equiv 1, j \equiv -1} a_{ij} x^i y^j + \sum_{i \equiv 2, j \equiv 2} a_{ij} x^i y^j = \sum_{i \equiv 0 \equiv j} a_{ij} x^i y^j + xy \sum_{i \equiv 1, j \equiv -1} a_{ij} x^{i-1} y^{j-1} + (xy)^2 \sum_{i \equiv 2, j \equiv 2} a_{ij} x^{i-2} y^{j-2}$ とできる. $k \leq \ell$ に対して $x^{3k} y^{3\ell} = (xy)^{3k} y^{3(\ell-k)} = u^{3\ell} t^{\ell-k}$ とできるから $\sum_{i \equiv 0 \equiv j} a_{ij} x^i y^j$ は ψ の像である. 他の項も同様であるから ψ は全射である.

(3) $(st - u^3) \subset \ker \psi$ は明らかである. $f \in \ker \psi$ に対して $f(s, t, u) = (st - u^3)g(s, t, u) + u^2 h_1(s, t) + u h_2(s, t) + h_3(s, t)$ である. ψ で送れば $(xy)^2 h_1(x^3, y^3) + xy h_2(x^3, y^3) + h_3(x^3, y^3) = 0$ である. x, y の次数について 3 の剰余に着目すれば $h_1(x^3, y^3) = h_2(x^3, y^3) = h_3(x^3, y^3) = 0$ より $h_1 = h_2 = h_3 = 0$ がわかる. よって $\ker \psi = (st - u^3)$ である.

[B] (1) $f(T) = \frac{T^{17}-1}{T-1}$ である. よって $f(T+1) = \frac{(T+1)^{17}-1}{T}$ である. 0 次の係数は $\binom{17}{1} = 17$ である. 17 は素数であるから T^i ($i = 1, 2, \dots, 15$) の係数は 17 の倍数である. よってアイゼンシュタインの既約判定法から $f(T+1)$ は既約である. よって $f(T)$ も既約である.

(2) $f(T)$ の根は ζ_i ($i = 1, 2, \dots, 16$) である. したがって $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$ は正規拡大であるから \mathbb{Q} が完全体であることより Galois 拡大である.

(3) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ の任意の元は ζ の行き先で定まり, 行き先の候補は ζ_i ($i = 1, 2, \dots, 16$) のいずれかである. $\sigma(\zeta) = \zeta_i$ について $\varphi: \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \rightarrow (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times; \sigma \mapsto [i]$ とする.

全射準同型であることは明らか. $\varphi(\sigma) = 1$ は $\sigma(\zeta) = \zeta$ を意味するから φ は単射である. よって同型.

(4) $\mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$ である. よって $\mathbb{Q}(\alpha)$ は $\mathbb{Q}(\zeta)$ の真の部分体である. $x^2 - \alpha x + 1$ とすれば根は ζ, ζ^{-1} である. よって $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}(\alpha)$ は 2 次拡大である. $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$ が体であるから乗法群は巡回群となる. よって $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ である. $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ において位数 2 の元は $[8]$ のみであるから, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}(\alpha)) \cong \{[0], [8]\}$ である. よって正規部分群であるから $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/16\mathbb{Z})/\{[0], [8]\} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ である.

0.25 H30 数学選択

[A] (1) $\phi(f+g) = f(1, z) + g(1, z) + (z^2) = \phi(f) + \phi(g)$ である. $\phi(fg) = f(1, z)g(1, z) + (z^2) = \phi(f)\phi(g)$ である. $\phi(1) = 1 + (z^2) = 1_B$ である. よって ϕ は環準同型である.

(2) $\phi(x-1) = \phi(y^2) = 0$ である. $f \in \ker \phi$ について $f(x, y) = (x-1)g(x, y) + y^2 h(y) + ya + b$ とできる. $\phi(f) = 0$ より $\phi(f) = az + b = 0$ すなわち $\mathbb{Q}[z]$ のもとで $az + b \in (z^2)$ である. 次数を考えれば $a = b = 0$ がわかる. よって $\ker \phi = (x-1, y^2)$ である.

(3) $\mathbb{Q}[z]$ は PID であるから任意のイデアルは $(p(x))$ と書ける. 自然な全射準同型 $\pi: \mathbb{Q}[z] \rightarrow B$ によってイデアルが対応する. $\pi((p(x))) \neq 0$ であるためには $(p(x)) \not\supset (z^2)$ が必要. したがって $p(x) = 1, z$ の像のみが B の (0) でないイデアルである. すなわち $B, (z)$ が B の (0) でないイデアルで, $(0), (z), B$ が求める相異なるイデアル.

(4) 存在すると仮定するとイデアルの対応定理から $0 \subsetneq \phi(J) \subsetneq (z)$ となる. (3) から $\phi(J) = (0), (z), B$ のいずれかである. このうち $\phi(I) = 0 \subsetneq \phi(J) \subsetneq (z) = \phi(I + (y))$ を満たすものは存在しない. これは矛盾.

[B] (1) $\omega = e^{2\pi i/3}$ とする. $X^6 - 8 = (X - \sqrt{2})(X - \sqrt{2}\omega)(X - \sqrt{2}\omega^2)(X + \sqrt{2})(X + \sqrt{2}\omega)(X + \sqrt{2}\omega^2)$ である.

(2) $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{-3}}{2}$ である. よって $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}, \sqrt{2})$ である. $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ は明らか. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{R}$ であり,

$\sqrt{-3} \notin \mathbb{R}$ であるから $[\mathbb{Q}(\sqrt{-3}, \sqrt{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ である. よって $[F : \mathbb{Q}] = 4$ である.

(3) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cdot \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) = F, \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt{-3}) = \mathbb{Q}$ であるから推進定理より $\text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \times \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{-3})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である.

(4) F, \mathbb{Q} 以外 の 中間 体 は $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ の 真 部分 群 に 対 応 す る. し た が っ て 3 個 あり, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{-3}), \mathbb{Q}(\sqrt{2}\sqrt{-3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$ である.

0.26 H31 数学選択

[A] (1)(a) I_1, I_2 が互いに素とは $I_1 + I_2 = A$ であることをいう.

(b) $I_1 = I_1 A \supset I_1 I_2$ より $I_1 \cap I_2 \supset I_1 I_2$ である. $c \in I_1 \cap I_2$ を任意にとる. 互いに素であるから $x + y = 1$ なる $x \in I_1, y \in I_2$ が存在する. $c = cx + cy$ であり, $c \in I_2$ より $cx \in I_1 I_2$ である. また $c \in I_1$ より $cy \in I_1 I_2$ である. よって $c \in I_1 I_2$ である. すなわち $I_1 \cap I_2 = I_1 I_2$ である.

(c) $I_1 \supset I_1 I_2$ より自然な全射準同型 $\pi_1: A/I_1 I_2 \rightarrow A/I_1$ がある. 同様に $\pi_2: A/I_1 I_2 \rightarrow A/I_2$ がある. $\varphi: A/I_1 I_2 \rightarrow A/I_1 \times A/I_2; \varphi(a + I_1 I_2) = (\pi_1(a + I_1 I_2), \pi_2(a + I_1 I_2))$ とする.

$\varphi(a + I_1 I_2) = 0$ なら $\pi_1(a + I_1 I_2) = 0, \pi_2(a + I_1 I_2) = 0$ より $a \in I_1, I_2$ である. すなわち $a \in I_1 \cap I_2 = I_1 I_2$ より φ は単射である.

$(b + I_1, c + I_2) \in A/I_1 \times A/I_2$ に対して $\varphi(cx + by) = (cx + b(1 - x) + I_1, by + c(1 - y) + I_2) = (b + I_1, c + I_2)$ であるから φ は全射である. よって φ は同型である.

(2) (a) $(X - 2)(X^2 + 2X + 4) = X^3 - 8$ であり, $X - 2 \neq 0 \in A, X^2 + 2X + 4 \neq 0 \in A$ であるから A は整域でない.

(b) $(X - 2)(X + 4) - (X^2 + 2X + 4) = -12$ であるから $(X - 2), (X^2 + 2X + 4)$ は互いに素である. よって $A \cong \mathbb{R}[X]/(X - 2) \times \mathbb{R}[X]/(X^2 + 2X + 4)$ である.

$\psi: \mathbb{R}[X]/(X - 2) \times \mathbb{R}; X \mapsto 2$ は同型である. $\varphi: \mathbb{R}[X]/(X^2 + 2X + 4) \rightarrow \mathbb{C}; X \mapsto -1 + i\sqrt{3}$ とする. $a + bi = a + \frac{b}{\sqrt{3}} + \frac{b}{\sqrt{3}}(-1 + i\sqrt{3})$ であるから $\varphi(\frac{b}{\sqrt{3}}X + a + \frac{b}{\sqrt{3}}) = a + bi$ より全射. $\varphi(f + (X^2 + 2X + 4)) = 0$ なら $f(X) = (X^2 + 2X + 4)g(X) + aX + b$ とできる. $a \neq 0$ なら $a(-1 + i\sqrt{3}) + b = 0$ であるから $i = \frac{-b+a}{a\sqrt{3}} \in \mathbb{R}$ となり矛盾. よって $a = b = 0$ であるから φ は同型である.

したがって $A \cong \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ である. 右辺の単位元は $(1, 1)$ であるから $a^4 = 1$ なる $a \in A$ は $\pm 1 \in \mathbb{R}, i^k \in \mathbb{C}$ ($k = 0, 1, 2, 3$) に対応する分の 8 個存在する.

[B] (1) $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{-1}$ それぞれの \mathbb{Q} 上共役は $\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{-1}$ であるから全て F に含まれる. したがって F/\mathbb{Q} は正規拡大である. \mathbb{Q} は完全体であるから F/\mathbb{Q} は Galois 拡大である.

(2) $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ である. $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ である. よって $[F_0 : \mathbb{Q}] = 4$ である.

$[F_0(\sqrt{-1}) : F_0] = 2$ であるから $[F : \mathbb{Q}] = 8$ である.

(3) $F_0 = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cdot \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \mathbb{Q}$ であるから推進定理より $\text{Gal}(F_0/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \times \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である.

$F_0 \cdot \mathbb{Q}(\sqrt{-1}) = F, F_0 \cap \mathbb{Q}(\sqrt{-1}) = \mathbb{Q}$ であるから推進定理より $\text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(F_0/\mathbb{Q}) \times \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{-1})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である.

(4) $[L : \mathbb{Q}] = 4$ なら $[F : L] = 2$ である. よって位数 2 の $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ の部分群の個数を求めればよい. 位数 2 の部分群の個数は位数 2 の元の個数であり, 単位元以外のすべての元が位数 2 であるから 7 個である.

0.27 R2 数学選択

[A] (1) $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ である. ただし $\mathbb{Z}_{(p)}$ は積閉集合 $S = \mathbb{Z} \setminus (p)$ による \mathbb{Z} の局所化である.

したがって \mathbb{Q} の部分環となる.

(2) イデアル $pR \subsetneq J$ をとる. $\frac{m}{n} \in J \setminus pR, \frac{m}{n} \notin R^\times$ が存在する. しかし $p \nmid m$ であるから $\frac{m}{n} \frac{n}{m} = 1$ となり, $J = R$ となる. よって pR は極大イデアルである.

(3) 異なる極大イデアル J をもてば $J - pR$ の元について (2) と同様にして単元であるとなるので矛盾.

(3) で局所環であることを示すから R の単元全体に着目する. $\frac{m}{n} \in R^\times$ とする. ある $\frac{a}{b}$ が存在して $\frac{m}{n} \frac{a}{b} = 1$ となる. よって $ma = nb \in S$ である. 逆に $ma \in S$ なる a が存在すれば $\frac{m}{n} \frac{an}{ma} = 1$ となるから $\frac{m}{n} \in R^\times$ である. すなわち $R^\times = \{\frac{m}{n} \mid \exists a, ma \in S\}$ である.

$R \setminus pR = \{\frac{m}{n} \mid p \nmid m\} = R^\times$ であるから R は局所環で極大イデアルは pR である.

(4) \mathbb{Z} は UFD であるから原始多項式 $x^2 + 1$ の既約性は $\mathbb{Q}[x]$ での既約性と同値である. 同様に $\mathbb{Z}_{(p)}$ も UFD でその商体は \mathbb{Q} であり, 既約性が同値になる.

したがって $x^2 + 1$ は $\mathbb{Z}[x]$ 上既約であるから $\mathbb{Z}_{(p)}[x] = R[x]$ 上でも既約である.

(5) $\varphi: R \rightarrow R[x]/J$ を考えれば $\ker \varphi = R \cap J$ である. $R/(R \cap J) = \text{Im}(\varphi) \subset R[x]/J$ より整域であるから $R \cap J$ は素イデアルである.

$i: \mathbb{Z} \rightarrow R$ について $i^{-1}(R \cap J) = (q)$ (q は素数か 0) である. $0 \neq q \neq p$ なら $i(q) \in R^\times$ となるから $q = 0, p$ である. $q = 0$ なら $R \cap J = 0$ である. このとき $x^2 + 1 \in J$ より $f(x) \in J \setminus (x^2 + 1)$ なら $0 \neq ax + b \in J$ とできる. $(ax + b)(ax - b) = a^2x^2 - b^2 \in J$ より $a^2 + b^2 \in J$ である. すなわち $a = b = 0$ である. よって $J = I$ であるが I は極大イデアルでないから矛盾.

よって $q = p$ である. すなわち $pR[x] \subset J$ である.

[B] (1) $Q(\alpha^3) = 0$ は明らか. $P(X)$ は α の最小多項式である. $\alpha^3 \in K$ なら最小多項式の次数が 3 以下となり矛盾. したがって $\alpha^3 \notin K$ であるから $Q(X)$ は既約である.

(2)(1) より $[L:K] = 2$ である. また $[F:K] = 6$ であるから $[F:L] = 3$ である.

(3) L/K は完全体上の 2 次拡大であるから Galois 拡大である.

(2) より α の L 上最小多項式の次数が 3 であるから $X^3 - \alpha^3$ が L 上の最小多項式である. (最小多項式でなければ拡大次数が 2 以下となり矛盾する.)

その根は $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ であり, 全て F に含まれる. よって F/L は Galois 拡大である.

(4) $Q(\beta^3) = \beta^6 + a\beta^3 + b = c^6\alpha^{-6} + ac^3\alpha^{-3} + c^3 = c^3\alpha^{-6}(c^3 + a\alpha^3 + \alpha^6) = 0$ であるから $Q(X) = (X - \alpha^3)(X - \beta^3)$ である.

$P(X)$ の根は $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha, \beta, \omega\beta, \omega^2\beta$ であるから全て F に含まれる. よって F/K は Galois 拡大である.

$\sigma, \tau \in \text{Gal}(F/K)$ について $\sigma(\alpha) = \omega\alpha, \tau(\alpha) = \beta$ とする.

$\sigma \circ \tau(\alpha) = \sigma(\beta) = \sigma(c\alpha^{-1}) = c\omega^2\alpha^{-1}, \tau \circ \sigma(\alpha) = \tau(\omega\alpha) = \omega c\alpha^{-1}$ であるから $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$ である. よって非可換群.

0.28 R3 数学選択

[A] (1) $\varphi: k[x, y] \rightarrow k; x \mapsto a, y \mapsto b$ とする. φ は全射環準同型である. $\ker \varphi \supset (x - a, y - b)$ である. $f \in \ker \varphi$ とする. $f(x, y) = (x - a)g(x, y) + (y - b)h(y) + c$ ($g \in k[x, y], h \in k[y], c \in k$) とできる. $\varphi(f) = 0$ より $c = 0$ である. よって $\ker \varphi = (x - a, y - b)$ である.

すなわち $k[x, y]/(x - a, y - b) \cong k$ である. k は体であるから $(x - a, y - b)$ は極大イデアルである.

(2) $x^2 + y^2 - 1 \in (x - a, y - b)$ なら $\varphi(x^2 + y^2 - 1) = 0$ より $a^2 + b^2 = 1$ である. $a^2 + b^2 - 1 = 0$ なら $\varphi(x^2 + y^2 - 1) = 0$ より $x^2 + y^2 - 1 \in (x - a, y - b)$ である.

(3) J を $I = (xy, x^2 + y^2 - 1)$ を含む極大イデアルとする. $(x + J)(y + J) = 0 \in k[x, y]/J$ より $x + J = 0$ または $y + J = 0$ である. すなわち $x \in J$ または $y \in J$ である.

$x \in J$ なら $y^2 - 1 \in J$ であるから $y - 1 \in J$ または $y + 1 \in J$ である. ここで $\langle x, y - 1 \rangle \subset J$ とすると, 左辺は極大イデアルであるから $J = \langle x, y - 1 \rangle$ である.

同様にして J の候補は $\langle x, y + 1 \rangle, \langle x, y - 1 \rangle, \langle x + 1, y \rangle, \langle x - 1, y \rangle$ でつくされたとわかる.

[B] (1) $(\alpha - \omega)^3 = 5$ より $\alpha^3 - 3\alpha^2\omega + 3\alpha\omega^2 - 1 = 5$ である. $\omega^2 = -1 - \omega$ より $6 - \alpha^3 + 3\alpha = \omega(-3\alpha^2 - 3\alpha)$ である. $\alpha \neq 0, \alpha \neq -1$ より $\omega = \frac{\alpha^3 - 3\alpha - 6}{3\alpha^2 + 3\alpha}$ と表せる. よって $\omega \in F$ より $F \supset M$ である.

$\omega \in F$ より $\alpha - \omega = \sqrt[3]{5} \in F$ である. よって $\sqrt[3]{5}\omega \in F$ であるから, $F \supset L$ である.

(2)(1) より $F = \mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{5}\omega) = L(\omega)$ である. $\omega \in L$ なら L/M となる. L/\mathbb{Q} の拡大次数は $x^3 - 5$ が最小多項式となるため 3 である. M/\mathbb{Q} の拡大次数は $x^2 + x + 1$ が最小多項式となるため 2 である. これは $[L : \mathbb{Q}] = [L : M][M : \mathbb{Q}]$ に矛盾. したがって $\omega \notin L$ である. よって $[F : L] = 2$ であるから $[F : \mathbb{Q}] = [F : L][L : \mathbb{Q}] = 6$ である.

(3) $(\alpha - \omega)^3 = 5$ より $p(x) = x^3 - 3\omega x^2 + 3\omega^2 x - 6$ は α を根にもつ. $[F : M] = 3$ であるから α の M 上最小多項式は 3 次である. よって $p(x)$ が最小多項式.

(4) $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}, \omega)$ である. $\sqrt[3]{5}, \omega$ の \mathbb{Q} 上共役は全て F に属すから F/\mathbb{Q} は Galois 拡大である. したがって $F/L, F/M$ は Galois 拡大である. また M/\mathbb{Q} は Galois 拡大で L/\mathbb{Q} は Galois 拡大でない.

(5) $\alpha^3 = 5 + 3\sqrt[3]{5}^2\omega + 3\sqrt[3]{5}\omega^2 + 1$ である. $\sqrt[3]{5}\omega = \beta$ とすれば $R(x) = x^3 - 3\beta x - 6$ が L 上の α を根にもつ多項式である. F/L の拡大次数が 2 であるから, R は既約でないため R は L に根を持つはずである. $(x^3 - 3\beta x - 6) = (x - \alpha)(x^2 + \alpha x + \alpha^2 - 3\beta)$ である. よって $\frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4(\alpha^2 - 3\beta)}}{2} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{-3}\sqrt{\alpha^2 - 4\beta}}{2}$ である. $\alpha^2 - 4\beta = \sqrt[3]{5}^2 - 2\beta + \omega^2 = (\sqrt[3]{5} - \omega)^2$ より $\frac{-(\sqrt[3]{5} + \omega) \pm (2\omega + 1)(\sqrt[3]{5} - \omega)}{2}$ である. ここで $+$ のときは $\beta + 1$ となる. よって $x^3 - 3\beta x - 6 = (x - (\beta + 1))(x^2 + (\beta + 1)x + \beta^2 - \beta + 1)$ であるから $Q(x) = x^2 + (\beta + 1)x + \beta^2 - \beta + 1$ である.

0.29 R4 数学選択

[A] (1) $(\alpha_5^2 - 5)^2 = 5$ である. よって $x^4 - 10x^2 + 20 = P_5(x)$ は α を根にもつ. アイゼンシュタインの既約判定法から $P_5(x)$ は $\mathbb{Z}[x]$ 上既約であり, \mathbb{Z} は UFD で P_5 はモニック多項式であるから P_5 は $\mathbb{Q}[x]$ 上既約である.

(2) P_5 の根は $\pm\sqrt{5} \pm \sqrt{5}$ である. $\sqrt{5} + \sqrt{5}\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ であり, $\alpha^2 - 5 = \sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\alpha_5)$ より P_5 の根は全て $\mathbb{Q}(\alpha_5)$ に属す. よって $L_5 = \mathbb{Q}(\alpha_5)$ である.

(3) $\sigma \in \text{Gal}(L_5/\mathbb{Q})$ を $\sigma(\alpha_5) = \sqrt{5} - \sqrt{5}$ とする.

$\sigma(\sqrt{5}) = \sigma(\alpha_5^2 - 5) = (\sqrt{5} - \sqrt{5})^2 - 5 = -\sqrt{5}$ である. よって $\sigma^2(\sqrt{5} + \sqrt{5}) = \sigma(\sqrt{5} - \sqrt{5}) = \sigma(\frac{2\sqrt{5}}{\alpha_5}) = \frac{-2\sqrt{5}}{\sqrt{5} - \sqrt{5}} = -\alpha_5$ である.

よって σ は位数 4 の元であり, $\text{Gal}(L_5/\mathbb{Q})$ は位数 4 の群であるから巡回群.

(4) P_4 の根は $\pm\sqrt{4} \pm \sqrt{5}$ である. $\sqrt{4} + \sqrt{5}\sqrt{4} - \sqrt{5} = \sqrt{11} \in L_4, \sqrt{4} + \sqrt{5}^2 - 4 = \sqrt{5} \in L_4$ である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt{11}, \sqrt{5}) \subset L_4$ である.

$\sqrt{11} = a + b\sqrt{5}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) とする. $11 = a^2 + 2ab\sqrt{5} + 5b^2$ より $2ab\sqrt{5} = a^2 + 5b^2 - 11 \in \mathbb{Q}$ であるから $ab = 0$ である. $a = 0$ なら $5b^2 = 11$ であるが, これは両辺の 11 の指数を比べれば右辺は奇数であり, 左辺は偶数である. $b = 0$ なら $a^2 = 11$ であり, これも 11 の指数を比べれば矛盾すると分かる.

よって $\sqrt{11} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ である.

L_4/\mathbb{Q} が 4 次巡回拡大なら $\text{Gal}(L_4/\mathbb{Q}) \cong m\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ である.

したがって L_4/\mathbb{Q} は非自明な異なる中間体 $\mathbb{Q}(\sqrt{11}), \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ をもつが, これは $\text{Gal}(L_4/\mathbb{Q}) \cong m\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ であることに矛盾する. よって L_4/\mathbb{Q} が 4 次巡回拡大でない.

[B] (1) $\mathbb{Z}[x]/(p, x^2 + ax + b) \cong (\mathbb{Z}[x]/(p))/((p, x^2 + ax + b)/(p)) \cong \mathbb{F}_p[x]/(x^2 + \bar{a}x + \bar{b})$

(2) $\mathbb{Z}[x]/(3, x^2 + 9x - 1) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2 - 1)$ であり, $x^2 - 1 = (x - 1)(x - 2) \in \mathbb{F}_3[x]$ であるから整域でない.

(3) 環として同型なら同型写像 $\varphi: \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x - 1) \rightarrow \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x + 3)$ がある. $\varphi(3) = 3$ であるから $(\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x - 1))/(3) \cong (\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x + 3))/(3)$ である.

$(\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x - 1))/(3) \cong (\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x - 1))/((3, x^2 + 9x + 1)/(x^2 + 9x - 1)) \cong \mathbb{Z}[x]/(3, x^2 + 9x - 1) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2 - 1) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x - 1) \times \mathbb{F}_3[x]/(x - 2) \cong \mathbb{F}_3^2$ である. よって零元でないべき零元をもたない. $(\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 9x + 3))/(3) \cong \mathbb{Z}[x]/(3, x^2 + 9x + 3) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2)$ は x が零元でないべき零元である. これは矛盾. よって同型でない.

0.30 R5 数学選択

[A] (1) (a) K のイデアル I が $a \in K^\times \cap I$ をもつなら $1 \in I$ より $I = K$ である. よって K のイデアルは $(0), K$ である.

(b) $\ker \rho = F$ なら $\rho|_K = \text{id}$ に矛盾. よって $\ker \rho = (0)$ より ρ は単射である.

F, F' は体 K 上の有限次ベクトル空間とみなせる. $\rho: F \rightarrow F'$ が $\rho|_K = \text{id}$ なら ρ はベクトル空間の単射準同型写像である. よって $[F: K] = \dim_K F \leq \dim_K F' = [F': K]$ である.

(2) (a) $X^4 - 25X = X(X^3 - 25)$ である. $X^3 - 25$ の根は $\sqrt[3]{5^2}, \sqrt[3]{5^2}\omega, \sqrt[3]{5^2}\omega^2$ ($\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$) である.

よって $\sqrt[3]{5^2}\omega/\sqrt[3]{5^2} = \omega \in F$ である. $X^3 - 25$ はアイゼンシュタインの既約判定法から $\mathbb{Z}[X]$ 上既約である. \mathbb{Z} は UFD でその商体は \mathbb{Q} であり, $X^3 - 25$ は原始多項式であるから $X^3 - 25$ は $\mathbb{Q}[X]$ 上既約である. よって $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5^2}): \mathbb{Q}] = 3$ である. $\omega \in \mathbb{C}$ であり, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5^2}) \subset \mathbb{R}$ であるから $\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5^2})$ である. $X^2 + X + 1$ が ω の最小多項式であるから $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5^2})(\omega): \mathbb{Q}(\sqrt[3]{5^2})] = 2$ である. よって $[F: \mathbb{Q}] = 6$ である.


(b) $X^4 - 14X^2 - 14$ について $t = X^2$ とすれば $t^2 - 14t - 14$ であり根は $7 \pm \sqrt{7^2 + 14} = 7 \pm 3\sqrt{7}$ である. よって P の根は $\pm\sqrt{7 \pm 3\sqrt{7}}$ である. $\sqrt{7 + 3\sqrt{7}}\sqrt{7 - 3\sqrt{7}} = \sqrt{-14} \in F$ である.

$\sqrt{7 + 3\sqrt{7}} \in \mathbb{R}$ であるから $\sqrt{-14} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{7 + 3\sqrt{7}})$ である. よって $F = \mathbb{Q}(\sqrt{7 + 3\sqrt{7}})(\sqrt{-14})$ である. P はアイゼンシュタインの既約判定法から $\mathbb{Q}[X]$ 上既約である. したがって $[\mathbb{Q}(\sqrt{7 + 3\sqrt{7}}): \mathbb{Q}] = 4, [\mathbb{Q}(\sqrt{7 + 3\sqrt{7}})(\sqrt{-14}): \mathbb{Q}(\sqrt{7 + 3\sqrt{7}})] = 2$ であるから $[F: \mathbb{Q}] = 8$ である.

[B] (1) p を素元とする. $p = ab$ と表せるとき, $ab \in (p)$ であり, (p) は素イデアルであるから $a \in (p)$ または $b \in (p)$ である. $a \in (p)$ として一般性を失わない. $a = pc$ とかける. よって $p = pcb$ である. すなわち $p(1 - cb) = 0$ である. p は素元であるから $p \neq 0$. よって整域であるから $1 - cb = 0$ より $bc = 1$ すなわち b は単元である. よって p は既約元.

(2) $b \neq 0$ のとき, $I_{a,b} = (x^2 + ay^2, bx) = (x^2 + ay^2, x) = (ay^2, x)$ である. $\mathbb{R}[x, y]/I_{a,b} \cong \mathbb{R}[y]/(ay^2)$ である. $ay^2 = ay \cdot y$ であるから整域となるのは $a = 0$ のときのみ.

$b = 0$ のとき, $I_{a,b} = (x^2 + ay^2)$ である. $a \leq 0$ なら $x^2 + ay^2 = (x - \sqrt{-ay})(x + \sqrt{-ay})$ であるから $\mathbb{R}[x, y]/I_{a,b}$ は整域でない. $a > 0$ のとき, $(x^2 + ay^2)$ は $\mathbb{R}[x][y]$ 上可約なら, 係数環が UFD であるからその商体上の多項式間 $\mathbb{R}(x)[y]$ 上可約である. よって $x^2 + a(\frac{f(x)}{g(x)})^2 = 0$ となる $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ が存在する. $g(x_0) \neq 0$ なる $x_0 \neq 0$ について $x_0^2 + a(\frac{f(x_0)}{g(x_0)})^2 > 0$ となり矛盾. よって既約である. したがって素イデアル.



(3) 素イデアル \mathfrak{p} が全ての $I_{a,b}$ を含むとする. $x \in I_{a,1}$ であるから $x \in \mathfrak{p}$ である. また $y^2 \in I_{1,1}$ であるから

$y^2 \in \mathfrak{p}$ である。よって $(x, y^2) \subset \mathfrak{p}$ である。逆にイデアル J について $(x, y^2) \subset J$ なら J は全ての $I_{a,b}$ を含む。 (x, y^2) より大きい素イデアルは $\mathbb{R}[x, y]/(x, y^2) \cong \mathbb{R}[y]/(y^2)$ の素イデアルと対応する。

$\mathbb{R}[y]/(y^2)$ の非自明なイデアル J で $cy + d + (y^2) \in J$ とする。 $c = 0$ なら $J = \mathbb{R}[y]/(y^2)$ であるから $c \neq 0$ である。よって $y + d + (y^2) \in J$ である。 $(y + d)(y - d) = y^2 - d^2$ より $y + d + (y^2) \in J$ なら $d^2 + (y^2) \in J$ であるから、 J が真のイデアルであるから $d = 0$ である。したがって $J = (y + (y^2))$ である。

すなわち J の逆像 $\mathfrak{p} = (x, y)$ が求める素イデアル。