

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

卢玲珠(女)

项目号 T382480010

单位 无锡旅游商贸高等职业技术学校

联系电话 158****9418

项目简称 旅商学校

员工号

类别 员工

卡号 0510000002201133

部门 财会系

递送地址 旅商学校

递送方式 统一

体检号 5162408150023



爱康卓悦无锡崇安寺金鼎广场分院（无锡爱康卓悦门诊部有限公司）

检查日期 2024.08.15

36/6158

爱康卓悦
iKang Excel

爱康集团是中国中高端连锁体检与健康管理集团，通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理及医疗服务。

截至2024年8月初，爱康集团已在58大城市设有167家体检、齿科与医疗中心。同时，爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	07
	检查详细结果	
4	口腔检查结果	17
	口腔健康整体解决方案/建议	
5	健康咨询类项目说明	19
	咨询类项目说明	
6	医学名词科普知识	20
	医学名词科普知识内容	


尊敬的**卢玲珠**女士，您好！

爱康卓悦无锡崇安寺金鼎广场分院（无锡爱康卓悦门诊部有限公司）感谢您的光临和对我们的信任和支持。
现将您2024年08月15日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 双侧甲状腺结节
- 【2】 体重指数增高
- 【3】 尿酸增高
- 【4】 尿酮体阳性
- 【5】 双侧乳腺增生
- 【6】 子宫腺囊肿（纳氏囊肿）
- 【7】 心电图示T波改变



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 双侧甲状腺结节

甲状腺结节是临床常见的病征，成人中约4%可发生甲状腺结节，影像学检查可表现为囊性、实性或混合性病变，可单发或多发，大多数属于良性结节，恶性病变虽不常见，但性质难以鉴别。根据此次超声检查所见，建议3-6个月复查超声及甲功；若甲状腺结节突然迅速、无痛地增大或有甲状腺肿瘤家族史者，请您及时去医院专科做进一步检查，以便明确诊断。

02 体重指数增高

- 1、体重指数（体重(kg)÷身高(m)的平方）≥24为超重，≥28为肥胖。
- 2、饮食宜低脂肪、低糖、低盐，控制主食量，辅以适量优质蛋白（鱼、蛋、奶类等）以及各种蔬菜。
- 3、加强运动消耗多余脂肪。可依年龄及身体状况，选择适合自己的运动方式和运动时间，以达到减轻体重的目的。
- 4、推荐运动三要素，频率：每周至少三次；强度：心率达到（170-年龄）次/分；时间：平均每次半小时以上。运动以微汗为宜。

03 尿酸增高

- 1、多因饮酒、高蛋白或过食高嘌呤食物等引起血尿酸增高，提示嘌呤代谢紊乱和（或）尿酸排泄障碍，可为无症状的高尿酸血症。
- 2、高尿酸常与肥胖、高血压病、高脂血症、冠心病、2型糖尿病等代谢性疾病并存。高尿酸血症也是动脉硬化的危险因素，因此应引起您的注意。
- 3、及时调整饮食结构，忌食高嘌呤食物，如动物内脏、鱼卵、蟹黄、海鱼、豆类、香菇等，多吃五谷杂粮、奶制品、蛋类及水果蔬菜等低嘌呤食物，减少饮酒量。
- 4、建议动态观察，定期复查血尿酸（复查前三天不吃高嘌呤食物）。若持续增高，请到医院内分泌专科诊治。

04 尿酮体阳性

健康人在长时间空腹、饥饿时尿中可以出现酮体；如果没有明确的糖尿病病史，应该在近期复查以确定原因。

05 双侧乳腺增生

- 1、与雌激素水平有关，一般无明显症状。部分人可出现于月经周期有胀痛感，经前明显，经后减轻。
- 2、建议到医院乳腺专科诊治和随访，根据医院医嘱进一步检查和定期复查。
- 3、保持心情愉快，善于疏泄不良情绪，避免精神过度紧张。
- 4、注意膳食平衡，减少脂肪摄入量，多吃蔬菜与水果。
- 5、慎用化妆品和含雌激素的药物。

06 子宫颈腺囊肿（纳氏囊肿）

子宫颈腺囊肿又称纳氏囊肿，多因宫颈腺管阻塞，腺体分泌物潴留于腺腔内形成大小不等的囊性肿块。若腺囊肿直径超过10mm或伴感染并出现症状时，需到医院妇科治疗。

07 心电图示T波改变



下载爱康APP
查看彩色报告

- 1、生理性改变常见于精神紧张、劳累、熬夜、过度吸烟等；病理性改变常见于高血压、冠心病、贫血或药物影响等。
- 2、建议复查心电图。如仍异常，请到心血管内科就诊。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者: 孙锦秀

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	162.5	cm		
体重	66.8	Kg		
体重指数	25.3		↑	18.5—23.99
收缩压	132	mmHg		90.0—139.0
舒张压	71	mmHg		60.0—89.0

初步意见

体重指数增高

内科

检查者: 辛锦秀

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	60	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见

未见明显异常

外科

检查者: 曹忠

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，结节不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	

初步意见

乳腺增生（双侧）

眼科

检查者：张倩倩

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.0	
矫正视力(左)	1.0	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
眼底镜检查	未见明显异常	

初步意见

未见明显异常

耳鼻咽喉科

检查者：张倩倩

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	

鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：尹娜 审核者：吴慧林

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	5.90		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	4.26		3.8—5.1	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	131.0		115—150	g/L
红细胞比容	HCT	0.390		0.35—0.45	%
平均红细胞体积	MCV	91.0		80—100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	30.8		27.0—34.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	340.0		316—354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.9		11—16	%
血小板计数	PLT	267.00		125—350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	6.1		6.0—10.0	fL
血小板分布宽度	PDW	12.3		9.0—18.0	FL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	35.9		20—50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	53.2		40.0—75.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.1		1.1—3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.1		1.80—6.30	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	42.0		39—52	fL
血小板压积	PCT	0.160		0.110—0.280	%

单核细胞百分比	MONO%	6.20		3.0—10.0	%
单核细胞绝对值	MONO	0.37		0.10—0.60	10~9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	4.7		0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.280		0.02—0.52	10~9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.00		0.0—1.0	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0.0—0.06	10~9/L

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：尹娜

审核者：吴慧林

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	备注
尿比重	SG	1.025		1.010—1.025		
尿酸碱度	PH	6.0		4.5—8.0		
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性		
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L	
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L	
尿酮体	KET	2+	↑	阴性	mmol/L	已复查
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL	

小结

尿酮体阳性

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：丁馨雨 张景凤 汪钦

审核者：吴慧林 杨彭慧

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
甲胎蛋白（T-12）	AFP	2.45		0.00—20.00	ng/ml

癌胚抗原（T-12）	CEA	0.74		0.00—5.00	ng/ml
糖类抗原242（T-12）	CA242	8.10		0.00—20.00	U/ml
糖类抗原125（T-12）	CA125	9.43		0.00—35.00	U/ml
细胞角蛋白19片段（T-12）	CYFRA21-1	2.00		0—3.3	ng/ml
神经元特异性烯醇化酶（T-12）	NSE	9.17		0.00—25.00	ng/ml
人绒毛膜促性腺激素游离β亚基（T-12）	free-β-hCG	0.19		0.00—4.00	ng/ml
丙氨酸氨基转移酶	ALT	19.4		7—50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	22.4		7—40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	28.4		7—60	U/L
碱性磷酸酶	ALP	71.0		35—135	U/L
总胆红素	TBIL	8.9		0.01—21	umol/L
直接胆红素	DBIL	2.50		0.01—5	umol/L
间接胆红素	IBIL	6.40		0.01—17	umol/L
总蛋白	TP	72.8		60—80	g/L
白蛋白	ALB	44.6		35—55	g/L
球蛋白	GLb	28.20		20—30	g/L
白蛋白/球蛋白比值	A/G	1.6		1.2—2.8	
尿素	UREA	4.47		1.7—8.3	mmol/L
肌酐	Cr	61.40		44—106	umol/L
尿酸	UA	387.00	↑	150—360	umol/L
空腹血葡萄糖	FBG	5.18		3.90—6.10	mmol/L
总胆固醇	TC	5.10		0.01—5.2	mmol/L
甘油三酯	TG	0.72		0.01—2.26	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.32		0.91—1.68	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	3.67		0.01—4.14	mmol/L

幽门螺杆菌抗体	Hp-Ab	1.8	0.01—15	AU/mL
血清钙	Ca	2.30	2.11—2.52	mmol/L
游离三碘甲状腺原氨酸	FT3	3.19	2.69—5.85	pmol/L
游离甲状腺素	FT4	12.68	9.14—19.31	pmol/L
三碘甲状腺原氨酸	T3	1.07	0.77—2.41	nmol/L
甲状腺素	T4	93.32	62.29—150.84	nmol/L
促甲状腺激素	TSH	3.9200	0.280—4.300	mIU/L

小结

尿酸增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者： 

检查项目	检查所见	单位
心电图	T波改变	

初步意见

T波改变







超声检查室







检查者： 






检查项目	检查所见	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
子宫	宫颈可见多个无回声区，最大约5×3mm	
附件	双侧卵巢显示清晰，形态大小正常，CDFI:血流显示正常	
甲状腺	甲状腺双侧叶均可见边界尚清晰的结节，右侧大小约3×2mm，左侧大小约10×6mm。CDFI：血流未见明显异常	
颈动脉	颈动脉未见明显异常	

初步意见

1.双侧甲状腺结节
2.子宫颈腺囊肿（纳氏囊肿）







* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

CT室

检查者： 吕诗敏 审核者： 孙晓敏

检查项目	检查所见	单位
胸部（CT）	胸部CT平扫：两肺纹理走行规则。肺内未见异常致密阴影。气管、支气管通畅。心脏、大血管未见异常。纵隔内未见肿大淋巴结。	

初步意见

未见明显异常

主检医师：

王

iKang爱康




扫码下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



口腔腺体

1、未见明显异常

牙周★

- 1、牙龈炎
- 2、牙结石
- 3、牙龈萎缩：I

颞下颌关节★

- 1、颞下颌关节左弹响
- 2、颞下颌关节右弹响

牙列

1、未见明显异常

舌

1、未见明显异常

唇

1、未见明显异常

腭

1、未见明显异常

牙体★

1、智齿:左上:【8】左下:【8】

口腔粘膜

1、未见明显异常

口腔科其它

1、未见明显异常

口腔健康整体解决方案/建议

操作者: 孙

结论	建议
智齿	智齿: 位置不正、反复发炎的请及时到医院口腔科或口腔科门诊治疗。欢迎来爱康齿科门诊治疗。
牙龈红肿	牙龈红肿: 请及时到医院口腔科或口腔科门诊治疗。欢迎来爱康齿科门诊治疗。
牙龈萎缩	牙龈萎缩: 请及时到医院口腔科或口腔科门诊治疗。欢迎来爱康齿科门诊治疗。
颞下颌关节右弹响	颞下颌关节右弹响: 请及时到医院口腔科或口腔科门诊治疗。
颞下颌关节左弹响	颞下颌关节左弹响: 请及时到医院口腔科或口腔科门诊治疗。
牙结石	牙结石: 1、是附着在牙表面的沉积或正在沉积的细菌钙化性团块。2、多与缺乏口腔清洁习惯、牙面粗糙或牙排列不齐有关。可引发牙龈炎、牙周炎。3、建议到口腔科洁牙, 保持口腔清洁。

牙齿护理知识

- 定期洁牙, 提倡每半年或一年洁牙一次, 定期清洁牙石, 预防牙周疾病的发生。
- 不要用牙齿咬坚硬的物品, 以防止外伤。

- 正确合理的刷牙方式是保护牙齿的最佳方法。
- 建议定期去齿科医院进行检查，养成看牙医的习惯，早点治疗可以避免病情恶化或导致全身其他疾病的发生。

1



2



3



4



5



6



齿科咨询热线

4006-190-920



看齿科 来爱康

5. 健康咨询类项目说明

以下项目属于健康咨询类服务，不作为体检诊断项目，仅作为参考，评测结果将以独立的报告形式呈现。本体检报告不包含独立检测项目

★ iCare+南方基因-常见肿瘤a1 (500元)

项目说明

生活在这个伟大的时代，我们很幸运，因为这个时代赋予了我们主宰自己健康的能力，这就是从健康的本质原因（基因）出发，个性化地预防疾病，改善健康质量，延缓甚至避免疾病的发生，从而实现健康长寿。

肿瘤相关套餐从以下几点阐述基因和健康的关系

1，根据受检者易感基因的风险高低，提示生活中需要引起注意的事项，指导适合自己的个性化体检项目和精准的生活指导；

2，宫颈癌、卵巢癌、乳腺癌、子宫内膜癌女性四项肿瘤，能更好的给与女性器官提前预警，关爱女性高发肿瘤，提醒对于雌激素受体的不同风险的人群，指导常规保养的注意事项，针对市面上较多的保健品，如蜂王浆、雪蛤、羊胎素等，可以指导是否适合个体的补充，做到科学补充，避免盲目选择对身体造成危害。

3，针对肺癌高危人群，指导不同个体对于香烟的耐受能力，对于抽烟人群，风险高的能更好的树立戒烟的信心，对于不抽烟的人群，可以指导二手烟、油烟、雾霾等于不同个体危害的程度。

4，针对饮酒人士，可以了解酒精在身体内代谢的速度，从而降低酒精中毒，酒精过敏等风险。

5，常见心脑血管疾病的预防，给出精准的指导建议，根据不同的基因型，对于未发人群，怎样降低如高血压、心肌梗死、脑溢血等的发病率，对于已发人群，怎么控制疾病的进步发展并帮助恢复正常，针对常规体检项目如甘油三酯、胆固醇、血粘度等出现异常的指标，给出科学的建议，促进体检指标恢复正常。

6，针对不同基因型的高血压，指导科学用药、精准用药，从而降低长期用药的副作用及并发症。




下载爱康APP

随时随地看报告

6.医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

■ 什么是体重指数？




目前常用的体重指数（body mass Index）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

■ 什么是甲状腺结节？



甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄>70岁；④结节增长迅速且直径>2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

■ 什么是乳腺增生？



乳腺增生又名乳腺结构不良，可分为囊性小叶增生、腺性小叶增生和纤维性小叶增生。乳腺增生是生理过程中，或在某些激素分泌失调情况下，表现出乳腺组织成分的大小和数量构呈比例及形态上的周期性变化，是一组临床综合征。乳腺增生并非炎症性或肿瘤性疾病，甚至其大多数情况下都是代表乳腺组织对激素的生理性反应，而不是真正的疾病。仅有少部分可能属于疾病，其中极少数出现非典型增生，可再发展成原位癌，甚至最终演变成浸润性乳腺癌。注意，这个过程并非线性进展，随时可以在浸润性乳腺癌之前的任一环节停下来，所以不能把乳腺增生视作癌前期病变。乳腺增生可发生于青春期末至绝经期的任何年龄，以20~40岁多见，35~40岁为高峰。常为双侧，亦可单侧发病，病变呈多发、弥漫性分布。多无明显症状；少数可有疼痛感或胀痛，疼痛与月经周期有关，经前明显，经后减轻；部分患者疼痛与情绪有关。发病初期可无明显体征，到一定阶段表现出乳腺组织增厚感或结节感，可有压痛。腋下淋巴结不肿大。



下载爱康APP
查看彩色报告

■ 什么是牙结石？



是一种沉积于牙面或修复体表面的钙化或正在钙化的菌斑，由唾液或龈沟液中的矿物盐逐渐沉积而形成，且不易去除。牙石是牙龈病和牙周病的重要病因。按其附着位置不同分为龈上牙石和龈下牙石。龈上牙石颜色较浅，常为白黄色或灰黄色，质地较软，易为洁治器所除去，常分布于全口，但以唾液腺管口邻接的牙面沉积最多。龈下牙石沉积于龈沟或牙周袋中的牙面上，颜色较深，常为黑褐色，质地较硬，不易为刮治器所刮尽，不一定分布于全口牙，与唾液腺管口也无明显的关系。

■ 什么是尿酸增高？




尿酸是体内和食物中嘌呤代谢的最终产物，又是细胞新陈代谢的副产品。肝是尿酸的主要生成场所，大部分尿酸通过肾排，血液中存在少量的尿酸。当肾脏不能清除尿液中足够的尿酸时，血液中尿酸增高，血中过多的尿酸可导致尿酸盐结晶沉积于关节内；同时食用高嘌呤饮食并饮酒可增加尿酸增高程度。尿酸增高不仅会引起痛风发作，还可导致肾脏病变。临床资料证实，尿酸还与高血压、糖尿病、冠心病等疾病密切相关。尿酸增高常见于肾小球滤过功能损伤、原发性痛风、血液病、恶性肿瘤等疾病，长期使用利尿剂和抗结核药也会导致尿酸增高。对于首次检出尿酸增高者，建议复查，明确病因，尽早治疗；对于有病史受检者，及时到肾内科就诊。

体检号:5162408150023

客户信息:卢玲珠/女/36

HR:70bpm PR:0.121s QTc:443 RV5/SV1:0.57mV/0.57mV
RR:0.848s QT:0.408s R+S:1.14 P/QRS/T轴:0°/61°/56°



A8E787E201D7572940F746A207AC0207D2A53EF0DDE39F74CE0716A7C5CA1905 A8E787E201D7572940F746A207AC0207D2A53EF0DDE39F74CE0716A7C5CA1905

检查者 2/12/23