

# FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

📺 Rappels du cours de 1<sup>ère</sup> en vidéo : <https://youtu.be/wJb3CSS3cg>


## Partie 1 : Cosinus, sinus et cercle trigonométrique

### 1) Définitions et propriétés

#### Exemple :

A l'aide du cercle trigonométrique, il est possible de lire le cosinus et le sinus d'un nombre.


Le **cosinus** se lit sur l'axe des abscisses et le **sinus** sur l'axe des ordonnées.



Définitions : Soit M le point du cercle trigonométrique associé au nombre  $x$  (qui est un angle orienté).

- Le **cosinus** de  $x$  est l'abscisse de M et on note **cos**( $x$ ).

- Le **sinus** de  $x$  est l'ordonnée de M et on note **sin**( $x$ ).



Propriétés :


1)  $-1 \leq \sin(x) \leq 1$  et  $-1 \leq \cos(x) \leq 1$

2)  $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

3) Valeurs remarquables des fonctions cosinus et sinus :

► Vidéo : <https://youtu.be/ECNX9hnhG9U>

$x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Méthode : Résoudre une équation et une inéquation trigonométrique

► Vidéo <https://youtu.be/p6U55YsS440>

► Vidéo <https://youtu.be/PcgvyxU5FCc>

► Vidéo [https://youtu.be/raU77Qb\\_-lw](https://youtu.be/raU77Qb_-lw)

1) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :  $\cos^2(x) = \frac{1}{2}$ .

2) Résoudre dans  $[-\pi ; \pi]$ , l'inéquation :  $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Correction**

$$1) \cos^2(x) = \frac{1}{2}$$

$$\cos^2(x) - \frac{1}{2} = 0$$

$$\cos^2(x) - \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2 = 0$$

$$\cos^2(x) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 0$$

$$\text{En effet : } \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Soit :

$$\left(\cos(x) - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\cos(x) + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

$$\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ou } \cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Soit :

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2k_1\pi, & k_1 \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2k_2\pi, & k_2 \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + 2k_3\pi, & k_3 \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2k_4\pi, & k_4 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$2) \sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- On commence par résoudre l'équation  $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$  dans  $[-\pi; \pi]$ .

$$\text{Soit : } x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3}.$$



- On veut des valeurs de sinus inférieures à  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Elles correspondent à la **partie du cercle trigonométrique** située en dessous des points

associés à  $\frac{\pi}{3}$  et  $\frac{2\pi}{3}$ .

Ainsi :

$$S = \left[-\pi; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$$





## Partie 2 : Propriétés des fonctions cosinus et sinus

### 1) Définitions

#### Définitions :

- La **fonction cosinus** est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  qui, à tout réel  $x$ , associe  $\cos(x)$ .
- La **fonction sinus**, est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  qui, à tout réel  $x$ , associe  $\sin(x)$ .



### 2) Périodicité

- Propriétés :**
- 1)  $\cos(x) = \cos(x + 2k\pi)$  où  $k$  entier relatif.
  - 2)  $\sin(x) = \sin(x + 2k\pi)$  où  $k$  entier relatif.


Démonstration : Aux points de la droite orientée d'abscisses  $x$  et  $x + 2k\pi$  ont fait correspondre le même point du cercle trigonométrique.

Remarque :


On dit que les fonctions cosinus et sinus sont **périodiques de période  $2\pi$** .

Cela signifie qu'on retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur  $2\pi$ .

Fonction cosinus



Fonction sinus



### 3) Parité

Définitions : - Une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées est une **fonction paire**.

- Une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère est une **fonction impaire**.

Remarques :

- Pour une fonction paire, on a :  $f(-x) = f(x)$ .

- Pour une fonction impaire, on a :  $f(-x) = -f(x)$ .

Ce sont ces résultats qu'il faudra vérifier pour prouver qu'une fonction est paire ou impaire.

Propriétés :


- La fonction cosinus est paire et on a :  $\cos(-x) = \cos(x)$

- La fonction sinus est impaire et on a :  $\sin(-x) = -\sin(x)$

Démonstration :

Les angles de mesures  $x$  et  $-x$  sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses donc :

$$\sin(-x) = -\sin x \quad \text{et} \quad \cos(-x) = \cos x.$$

Remarques :

- La courbe de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- La courbe de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine.

Méthode : Étudier la parité d'une fonction trigonométrique

**Vidéo** <https://youtu.be/hrbgxnCZW> I

Démontrer que la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \sin(x) - \sin(2x)$  est impaire.

**Correction**

On a :

$$f(-x) = \sin(-x) - \sin(-2x) = -\sin(x) + \sin(2x) = -(\sin(x) - \sin(2x)) = -f(x).$$


La fonction  $f$  est donc impaire.

Sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Méthode : Compléter un graphique par parité et périodicité


**Vidéo** <https://youtu.be/KbCpgXSvR8M>

Soit  $f$  une fonction impaire et périodique de période  $\pi$ . Compléter sa représentation graphique sur l'intervalle  $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ .

**Correction**


**1<sup>ère</sup> étape :** La fonction est impaire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.

On complète donc par symétrie centrale.



**2<sup>e</sup> étape :** La fonction est périodique de période  $\pi$ . On retrouve le même morceau de courbe sur chaque intervalle de longueur  $\pi$ .

Le morceau déjà tracé a pour longueur  $\pi$ , on le reproduit à gauche et à droite.



## Partie 3 : Variations des fonctions cosinus et sinus

### 1) Dérivées

Fonction	Dérivée
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(ax + b)$ $a$ et $b$ réels	$-a \sin(ax + b)$
$\sin(ax + b)$ $a$ et $b$ réels	$a \cos(ax + b)$

### 2) Tableaux de variations


$x$	0	$\pi$
$\cos'(x) = -\sin(x)$	0	0
$\cos(x)$	1	-1

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
$\sin'(x) = \cos(x)$	+	0	-
$\sin(x)$	0	1	0

### 3) Représentations graphiques


● On retrouve la représentation graphique de cosinus en complétant les données du tableau de variations :

- **par symétrie** avec l'axe des ordonnées (cosinus est paire),
- **par translation** (cosinus est périodique de période  $2\pi$ ).



● On retrouve la représentation graphique de sinus en complétant les données du tableau de variations :

- **par symétrie** avec l'origine du repère (sinus est impaire),
- **par translation** (sinus est périodique de période  $2\pi$ ).



Méthode : Étudier une fonction trigonométrique

▶ Vidéo <https://youtu.be/uOXv5XnAiNk>

▶ Vidéo <https://youtu.be/s3S85RL06ks>



▶ Vidéo [https://youtu.be/X6vJog\\_xQRY](https://youtu.be/X6vJog_xQRY)

▶ Vidéo <https://youtu.be/ol6UtCpFDQM>

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \cos(2x) - \frac{1}{2}$ .

- Étudier la parité de  $f$ .
- Démontrer que la fonction  $f$  est périodique de période  $\pi$ .
- Étudier les variations de  $f$  sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ .
- Représenter graphiquement la fonction  $f$  sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$  et prolonger de part et d'autre la représentation par symétrie et par translation.

### Correction

$$a) f(-x) = \cos(-2x) - \frac{1}{2} = \cos(2x) - \frac{1}{2} = f(x)$$

La fonction  $f$  est donc paire. Dans un repère orthogonal, sa représentation graphique est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$$\begin{aligned} b) f(x + \pi) &= \cos(2(x + \pi)) - \frac{1}{2} \\ &= \cos(2x + 2\pi) - \frac{1}{2} \\ &= \cos(2x) - \frac{1}{2} = f(x) \end{aligned}$$

On en déduit que la fonction  $f$  est périodique de période  $\pi$ .

$$c) f(x) = \cos(2x) - \frac{1}{2} = v(u(x)) - \frac{1}{2}$$


$$\begin{aligned} \text{Avec : } u(x) &= 2x \rightarrow u'(x) = 2 \\ v(x) &= \cos x \rightarrow v'(x) = -\sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } f'(x) &= u'(x) \times v'(u(x)) \\ f'(x) &= 2 \times (-\sin(2x)) = -2 \sin(2x) \end{aligned}$$

Si  $x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ , alors  $2x \in [0 ; \pi]$  et donc  $\sin(2x) \geq 0$ .

Donc si  $x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ , alors  $f'(x) \leq 0$ . Ainsi  $f$  est décroissante sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ .

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	0	0
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$



$$f(0) = \cos(2 \times 0) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$


$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

d) - On commence par tracer la courbe sur l'intervalle  $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ .

- La fonction  $f$  est paire, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

On peut ainsi prolonger la courbe **par symétrie axiale** sur l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2} ; 0\right]$ .

- La fonction  $f$  est périodique de période  $\pi$ , on peut ainsi prolonger la courbe **en translatant** horizontalement la portion de courbe déjà tracée. En effet, la portion déjà tracée se trouve sur l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$  de longueur  $\pi$ .



Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

[www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales](http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales)