


【実験 1】 通常環境 (環境抵抗あり・ S 字型成長曲線)

キャラ [] ①エサ [30/60/120] pt ② 広さ [30/60/120] 匹 ③清掃 [こまめ/サボリ]


日数	個体数	日数	個体数
1 日		16 日	
2 日		17 日	
3 日		18 日	
4 日		19 日	
5 日		20 日	
6 日		21 日	
7 日		22 日	
8 日		23 日	
9 日		24 日	
10 日		25 日	
11 日		26 日	
12 日		27 日	
13 日		28 日	
14 日		29 日	
15 日		30 日	



【実験 2】 理想環境 (環境抵抗ゼロ・ J 字型成長曲線) / 条件変更

キャラ [] ①エサ [無限/] ②広さ [無限/] ③清掃 [うんち無/]

日数	個体数	日数	個体数
1 日		16 日	
2 日		17 日	
3 日		18 日	
4 日		19 日	
5 日		20 日	
6 日		21 日	
7 日		22 日	
8 日		23 日	
9 日		24 日	
10 日		25 日	
11 日		26 日	
12 日		27 日	
13 日		28 日	
14 日		29 日	
15 日		30 日	



💡 気づいたこと・考察 (密度の影響、増え方の違い、環境収容力など)

【問いの例】 ① 通常環境と理想環境で増え方 (グラフの曲線) はどう違ったか？ ② 最も急増した時期や頭打ちになった理由として何が考えられるか？