

DAFTAR ISI

<u>General FAQs.....</u>	<u>3</u>
<u>Vaksin HPV Kuadrivalent (Gardasil).....</u>	<u>3</u>
<u>Vaksin Pneumokokus/Pneumococcal (PCV) 13-valent (Prevenar).....</u>	<u>9</u>
<u>Vaksin Influenza (Flubio & Vaxigrip Tetra).....</u>	<u>13</u>
<u>Vaksin Rotavirus Monovalen (Rotarix).....</u>	<u>16</u>
<u>Vaksin Tdap (Boostrix).....</u>	<u>20</u>
<u>Vaksin Tifoid (Typhim Vi).....</u>	<u>24</u>
<u>Vaksin Hepatitis A (Havrix 720 Junior).....</u>	<u>28</u>
<u>Vaksin Hepatitis B (Engerix B 20mg).....</u>	<u>31</u>
<u>Vaksin Varicella (Varivax).....</u>	<u>34</u>
<u>Vaksin DTap - Hib - Polio IPV (Hexaxim).....</u>	<u>38</u>
<u>Vaksin MMR (M-M-R II).....</u>	<u>42</u>
<u>Vaksin Dengue (QDenga).....</u>	<u>46</u>
<u>Vaksin Meningokokus (Menivax).....</u>	<u>46</u>
<u>Vaksin Herpes Zoster Shingrix.....</u>	<u>64</u>
<u>Vaksin Flu Singapura (Inlive).....</u>	<u>68</u>

General FAQs Vaksin

1. **Kapan sebaiknya melakukan vaksinasi?**
 - a. Disarankan melakukan vaksinasi saat kondisi tubuh sedang fit agar sistem imun bereaksi secara optimal.
2. **Saya baru sembuh dari sakit (flu, ispa, covid, diare, mual, muntah, dll - penyakit ringan) apakah saya boleh melakukan vaksinasi?**
 - a. Disarankan melakukan vaksinasi saat kondisi tubuh sedang fit agar sistem imun bereaksi secara optimal terhadap vaksin. Anda disarankan untuk melakukan vaksinasi minimal 7-14 hari setelah sembuh. Jika Anda melakukan vaksinasi saat kondisi tubuh belum benar-benar fit, respon sistem imun yang diharapkan mungkin kurang optimal.
3. **Saya memiliki kondisi imunodefisiensi (bisa karena penyakit HIV, obat yg menurunkan kekebalan seperti kortikosteroid, kemoterapi & radiasi dari kanker, penurun imun untuk autoimun, dll) dan autoimun (apapun autoimunnya), apakah saya bisa melakukan vaksinasi di halodoc? → ini kalo pasien blm sebut vaksin apa ya baru nanya2 aja**
 - a. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
4. **Saya memiliki riwayat sering pingsan, apakah boleh mendapatkan vaksinasi di halodoc?**
 - a. Untuk kondisi seperti ini, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit dengan fasilitas yg memadai.
5. **Saya memiliki riwayat alergi lateks, apakah boleh mendapatkan vaksinasi di halodoc?**
 - a. Beberapa vaksin mengandung lateks, dan mayoritas dokter kami juga menggunakan sarung tangan berbahan lateks. Jika Anda memiliki alergi lateks, sebaiknya melakukan vaksinasi di rumah sakit agar dapat melakukan vaksinasi dengan perlengkapan alternatif. Informasikan dokter atau perawat mengenai alergi Anda, ya.
6. **Saya memiliki riwayat anafilaksis, apakah boleh mendapatkan vaksinasi di halodoc?**
 - a. Untuk kondisi seperti ini, sebaiknya melakukan vaksinasi di rumah sakit, ya.
7. **Apakah saya/anak saya boleh mendapatkan imunisasi jika usia/intervalnya kurang 3 hari sebelum waktunya?**
 - a. Anda dapat melakukan vaksinasi dosis selanjutnya/vaksinasi booster paling cepat 4 hari sebelum tanggal yang ditentukan. Misalnya, jika Anda

dijadwalkan untuk vaksinasi booster tanggal 24, maka Anda sudah boleh divaksin paling cepat pada tanggal 20.

8. Apabila vaksin yang saya terima menjelang masa kadaluarsa, apakah ada dampak terhadap efikasi atau pun kondisi lainnya?

- a. ED (expiry date) vaksin merujuk pada tanggal kadaluarsa, bukan berarti vaksin tersebut tidak aman atau berkualitas buruk. Expiry date, contohnya EXP:12/23, artinya vaksin ini masih dapat digunakan dengan aman hingga akhir bulan Desember 2023 (aman sampai 31 Desember 2023).
- b. Vaksin diproduksi dalam serangkaian batch, dan tanggal kadaluarsa ditentukan oleh studi stabilitas, kondisi penyimpanan, dan pedoman regulasi. Beberapa vaksin juga diproduksi dengan masa kadaluarsa yang lebih singkat dari tanggal produksi untuk menjaga efektivitas dan relevansinya, misalnya hanya beberapa bulan hingga di bawah setahun, namun tetap aman untuk digunakan.
- c. Tanggal kadaluarsa yang singkat tidak mengindikasikan rendahnya kualitas atau efikasi vaksin, tetapi merupakan upaya untuk menjaga agar vaksin tetap efektif dan bermutu tinggi selama digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan.

9. Bagaimana cara vaksin ini diserahkan ke dokter home care? Bukankah vaksin harus berada di suhu yang tetap dingin?

- a. Kami mengikuti standar penanganan vaksin dengan sistem '*cold chain*', yang berarti vaksin disimpan dan akan dibawa oleh dokter Home Lab di dalam vaccine *carrier* khusus dengan pemantauan suhu yang ketat untuk memastikan bahwa vaksin tetap berada pada suhu yang optimal sepanjang waktu. Kami juga memastikan semua vaksin yang kami gunakan memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas, segel keamanan tidak rusak, dan kami hanya bekerja dengan distributor vaksin yang terpercaya dan berlisensi.

Vaksin HPV Kuadivalent (Gardasil 4)

- 1. Apa itu vaksin HPV Gardasil quadrivalent, dan mengapa vaksin ini penting?**
 - a. Vaksin Gardasil quadrivalent adalah vaksin rekombinan yang melindungi dari 4 tipe Human Papillomavirus (HPV), yaitu HPV tipe 6, 11, 16, dan 18. Indonesia berada pada urutan nomor satu penderita kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara. Vaksinasi HPV direkomendasikan oleh WHO, ACOG, CDC, dan HOGI sebagai pencegahan utama penyakit terkait HPV karena vaksinasi ini efektif memberikan perlindungan dari kanker serviks, pra kanker vulva, pra kanker vagina, pra kanker anal, dan kutil kelamin yang disebabkan HPV tipe 6, 11, 16, dan 18.
- 2. Bagaimana penularan virus HPV?**
 - a. Virus HPV dapat ditularkan melalui rute seksual maupun non-seksual. Rute seksual termasuk kontak dengan alat kelamin, sedangkan rute non-seksual termasuk penularan melalui pakaian, handuk, prosedur medis, ibu ke anak dalam kandungan, ujung jari, selaput mata, dan lainnya.
- 3. Siapa yang seharusnya menerima vaksin HPV Gardasil?**
 - a. Vaksin HPV Gardasil direkomendasikan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, vaksin dapat diberikan mulai dari usia 9-45 tahun. Untuk laki-laki, vaksin dapat diberikan mulai dari usia 9-26 tahun. Vaksin ini paling efektif saat diberikan sebelum terpapar HPV atau sebelum melakukan aktivitas seksual.
- 4. Bagaimana dosis dan pemberian Gardasil?**
 - a. Untuk perempuan berusia 14 - 45 tahun: 3 dosis. Dosis kedua diberikan 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Ketiga dosis ini harus selesai diberikan dalam periode 1 tahun. Setiap dosis 0.5 mL diberikan ke dalam otot melalui lengan atas.
 - b. Untuk laki-laki berusia 14 - 26 tahun: 3 dosis. Dosis kedua diberikan 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Ketiga dosis ini harus selesai diberikan dalam periode 1 tahun. Setiap dosis 0.5 mL diberikan ke dalam otot melalui lengan atas.
 - c. Untuk anak perempuan dan laki-laki berusia 9 - 13 tahun: 2 dosis, dosis kedua diberikan 6 bulan setelah dosis pertama.
- 5. Bagaimana jika pasien lupa kapan terakhir vaksin HPV atau dosis tidak lengkap?**
 - a. Jika jadwal vaksinasi terinterupsi, dosis vaksin tidak perlu diulang (tidak ada interval maksimum), lanjutkan dengan dosis yang direkomendasikan berikutnya. Jika saat ini usia pasien di atas 14 tahun, pemberian vaksin HPV untuk pasien ini adalah total 3 kali.
- 6. Apakah ada efek samping dari vaksin HPV quadrivalent?**

- a. Menurut uji klinis, efek samping/reaksi yang terkait dengan vaksin hanya muncul kurang dari 1%. Reaksi yang umum terjadi termasuk demam; kemerahan, nyeri, bengkak, pendarahan, dan gatal di lokasi suntik; urtikaria; dan bronkospasme yang sangat jarang.

7. Apakah ada kontraindikasi untuk menerima vaksin HPV Gardasil?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi HPV GARDASIL:

- a. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap komponen aktif atau pada salah satu komponen tambahan pada vaksin (sel ragi, natrium klorida, L-histidine, polysorbate 80, natrium borat, dan air untuk injeksi).
- b. Jika pasien mengalami gejala hipersensitivitas dari dosis pertama vaksin HPV Gardasil, maka dosis selanjutnya tidak boleh diberikan.
- c. Pemberian vaksin Gardasil harus ditunda jika pasien sedang mengalami demam/infeksi akut yang parah.
- d. Tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 9 tahun.
- e. Tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil.
- f. Jika Anda mengalami gangguan respon imun dan/atau gangguan pembekuan darah, konsultasi dahulu dengan dokter sebelum mendapatkan vaksin ini.

8. Apakah ibu hamil dan menyusui boleh menerima vaksin HPV Gardasil?

- a. Vaksin HPV Gardasil tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil, namun boleh diberikan kepada ibu yang menyusui.

9. Berapa lama vaksin HPV memberikan perlindungan?

- a. Vaksin HPV Gardasil memberikan perlindungan setidaknya selama 10 tahun.

10. Apakah seseorang dapat menerima vaksin HPV jika mereka sudah di diagnosis HPV?

Vaksin tidak bisa membantu mengobati atau melindungi terhadap jenis HPV yang sudah menginfeksi orang tersebut karena vaksin Gardasil tidak memiliki efek terapi. Oleh karena itu, vaksin ini tidak dimaksudkan untuk pengobatan pada kanker serviks, kelainan tingkat tinggi pada serviks, vulva, dan vagina, atau kutil kelamin. Pemberian vaksin pada orang yang telah terinfeksi HPV tidak menimbulkan kerugian, namun efektivitas vaksin menjadi lebih rendah.

11. Apakah vaksin HPV efektif melawan semua jenis HPV?

- a. Tidak. Vaksin Gardasil tidak melindungi terhadap tipe yang bukan komponen vaksin (tipe 6, 11, 16, dan 18.) atau infeksi HPV yang sudah ada sebelum vaksinasi. Tidak ada vaksin yang 100% efektif, oleh karena itu, pemeriksaan serviks rutin sangat penting dan tindakan pencegahan terhadap penyakit menular seksual lainnya tetap perlu dilanjutkan.

12. Apakah vaksin HPV dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Belum ada penelitian terkait interaksi vaksin HPV Gardasil dengan vaksin lain, sehingga pemberian dengan vaksin lain belum direkomendasikan.

13. Apakah vaksin HPV dapat diberikan saat pasien sedang menggunakan KB hormonal?

- a. Dalam studi klinis, penggunaan kontrasepsi hormonal tidak mempengaruhi respon imun terhadap vaksin HPV Gardasil.

14. Saya sudah menikah, apakah perlu pap smear terlebih dahulu agar bisa mendapatkan vaksin HPV?

- a. Mendapatkan vaksin HPV dengan atau tanpa pap smear tetap bisa dilakukan. Pap smear berguna untuk membantu mendeteksi tanda-tanda awal penyakit serviks yang disebabkan oleh HPV, sehingga kelainan tersebut dapat ditangani sesegera mungkin. Sebaliknya, vaksin HPV berguna sebagai perisai yang membantu mencegah penyakit tersebut dari awal.

Namun, perlu diingat bahwa vaksin HPV tidak memiliki efek terapi jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit atau lesi kanker. Idealnya, yang terbaik adalah melakukan keduanya: vaksin HPV untuk pencegahan dan pap smear untuk deteksi dini. Jika Anda ragu, silahkan berkonsultasi dulu dengan dokter di Halodoc.

15. Ada Gardasil-4 dan ada Gardasil-9? Apa bedanya? Mana yang lebih baik?

- a. Perbedaan utama adalah pada jumlah jenis HPV dalam kandungan vaksin. Gardasil quadrivalent atau 4 strain menargetkan 4 jenis HPV yang terkait dengan kanker serviks dan kutil kelamin (6, 11, 16, dan 18), sedangkan vaksin 9 strain memberikan perlindungan yang lebih luas dan melindungi terhadap lebih banyak jenis HPV, yaitu termasuk yang dicakup oleh vaksin quadrivalent dan tambahan 5 strain lain (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 dan 58).
- b. Vaksin mana yang lebih sesuai untuk Anda, tergantung pada kondisi Anda dan tingkat perlindungan yang Anda inginkan. Vaksin Gardasil-4 tetap memberikan perlindungan yang signifikan terhadap jenis-jenis HPV paling umum seperti penyebab kanker serviks dan kutil kelamin. Pilihan biasanya bergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kebiasaan aktivitas seksual. Jika Anda ragu, silakan konsultasikan dengan dokter di Halodoc.

16. Saya mendengar kabar bahwa vaksin HPV dapat membuat mandul. Apakah hal tersebut benar?

- a. Vaksin HPV telah menjalani penelitian yang luas dan uji klinis untuk menilai keamanannya, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa vaksin ini dapat menyebabkan kemandulan atau masalah reproduksi.

17. Kenapa hanya dianjurkan untuk pria umur 14-26 tahun dan wanita 14-45 th? Apakah pria >26 th atau wanita >45 th tidak mungkin terkena penyakit yang disebutkan diatas?

- a. Panduan usia untuk vaksinasi HPV tersebut didasarkan pada uji klinis terhadap efektivitas vaksin, manfaat terbesar, dan beban penyakit yang lebih tinggi pada kelompok usia tertera. Ini tidak berarti bahwa pasien di luar kelompok usia ini tidak mungkin terkena penyakit yang terkait dengan HPV. Namun, manfaat vaksinasi mungkin lebih rendah pada kelompok usia yang lebih tua, terutama jika mereka telah terpapar HPV sebelumnya.

18. Dimanakah saya bisa cek pemeriksaan HPV? Apakah bisa di Halodoc?

- a. Pemeriksaan HPV biasanya dilakukan melalui tes Pap smear atau tes HPV DNA. Namun, untuk saat ini, Halodoc belum menyediakan layanan tersebut.

19. Apakah benar vaksin HPV tidak direkomendasikan untuk yang sudah berumur lebih dari 26 tahun karena efektifitasnya berkurang?

- a. Vaksinasi HPV direkomendasikan untuk wanita bahkan setelah usia 26 tahun, namun untuk laki laki sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam/spesialis urologi dan melakukan vaksin HPV dirumah sakit. Vaksin HPV biasanya paling efektif jika diberikan sebelum seseorang terpapar virus HPV, oleh karena itu, program vaksinasi sering kali diarahkan pada kelompok usia yang lebih muda, seperti remaja. Meskipun demikian, vaksinasi masih dapat memberikan manfaat bagi orang yang lebih tua.

20. Apa bedanya Vaksin HPV yg disediakan oleh Halodoc dengan Vaksin HPV yang diwajibkan oleh negara?

- a. Vaksin HPV yang tersedia di Halodoc (vaksin HPV Gardasil) bukan bagian dari kerja sama dengan program vaksin HPV gratis dari pemerintah. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan tanyakan ke fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan program pemerintah, seperti puskesmas atau rumah sakit umum.

21. Jika vaksin HPV sebelumnya merk lain/strain nya beda dengan jadwal yang tidak sesuai, bagaimana?

- a. Jika sebelumnya Anda telah mendapatkan vaksin HPV dengan merk atau strain yang berbeda, atau jadwal dosis vaksin HPV lanjutan Anda terinterupsi, Anda tetap boleh melakukan vaksinasi HPV dosis lanjutan dengan vaksin HPV Gardasil.

22. Apakah Gardasil halal?

- a. Keputusan mengenai kehalalan vaksin umumnya menjadi keputusan pribadi dan agama. Berikut kandungan dalam vaksin HPV Gardasil:
 - i. Human papillomavirus (HPV) tipe 6 L1 protein 20 mcg, HPV tipe 11 L1 protein 40 mcg, HPV tipe 16 L1 protein 40 mcg, HPV tipe 18 L1 protein 20 mcg. Protein L1 dalam bentuk partikel mirip virus diproduksi dalam sel ragi (*Saccharomyces cerevisiae*) CANADE 3C-5

(Strain 1895) melalui teknologi DNA rekombinan dan diadsorpsi pada adjuvan amorf aluminium hidroksifosfat sulfat (225 mcg Al).

- ii. Gardasil juga mengandung bahan tambahan berikut: Natrium klorida, L-histidine, polysorbate 80, natrium borat, dan air untuk injeksi.
- b. Kami hanya dapat memberi informasi kandungan vaksin dan keterangan bahwa bahan-bahan yang tercantum tidak mencakup zat yang berasal secara langsung dari hewan. Sel ragi (yeast), meskipun bukan hewan, adalah mikroorganisme eukariotik.

23. Durasi kekebalan?

- a. Vaksin HPV Gardasil memberikan perlindungan dari HPV selama kurang lebih 10 tahun.

Vaksin HPV 9-valent (Gardasil 9)

24. Apa itu vaksin HPV Gardasil 9, dan mengapa vaksin ini penting?

- a. Vaksin Gardasil 9-ivalent adalah vaksin rekombinan yang melindungi dari 4 tipe Human Papillomavirus (HPV), yaitu HPV tipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Indonesia berada pada urutan nomor satu penderita kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara. Vaksinasi HPV direkomendasikan oleh WHO, ACOG, CDC, dan HOGI sebagai pencegahan utama penyakit terkait HPV karena vaksinasi ini efektif memberikan perlindungan dari kanker serviks, pra kanker vulva, pra kanker vagina, pra kanker anal, dan kutil kelamin yang disebabkan HPV tipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58.

25. Bagaimana penularan virus HPV?

- a. Virus HPV dapat ditularkan melalui rute seksual maupun non-seksual. Rute seksual termasuk kontak dengan alat kelamin, sedangkan rute non-seksual termasuk penularan melalui pakaian, handuk, prosedur medis, ibu ke anak dalam kandungan, ujung jari, selaput mata, dan lainnya.

26. Siapa yang seharusnya menerima vaksin HPV Gardasil?

- a. Vaksin HPV Gardasil direkomendasikan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, vaksin dapat diberikan mulai dari usia 9-45 tahun. Untuk laki-laki, vaksin dapat diberikan mulai dari usia 18-26 tahun. Vaksin ini paling efektif saat diberikan sebelum terpapar HPV atau sebelum melakukan aktivitas seksual.

27. Bagaimana dosis dan pemberian Gardasil?

- a. Untuk perempuan berusia 14 - 45 tahun: 3 dosis. Dosis kedua diberikan 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Ketiga dosis ini harus selesai diberikan dalam periode 1 tahun. Setiap dosis 0.5 mL diberikan ke dalam otot melalui lengan atas.
- b. Untuk laki-laki berusia 18 - 26 tahun: 3 dosis. Dosis kedua diberikan 2 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Ketiga dosis ini harus selesai diberikan dalam periode 1 tahun. Setiap dosis 0.5 mL diberikan ke dalam otot melalui lengan atas.
- c. Untuk anak perempuan berusia 9 - 13 tahun: 2 dosis, dosis kedua diberikan 6 bulan setelah dosis pertama.

28. Bagaimana jika pasien lupa kapan terakhir vaksin HPV atau dosis tidak lengkap?

- a. Jika jadwal vaksinasi terinterupsi, dosis vaksin tidak perlu diulang (tidak ada interval maksimum), lanjutkan dengan dosis yang direkomendasikan berikutnya. Jika saat ini usia pasien di atas 14 tahun, pemberian vaksin HPV untuk pasien ini adalah total 3 kali.

29. Apakah ada efek samping dari vaksin HPV 9 valent?

- a. Menurut uji klinis, efek samping/reaksi yang terkait dengan vaksin hanya muncul kurang dari 1%. Reaksi yang umum terjadi termasuk demam; kemerahan, nyeri, bengkak, pendarahan, dan gatal di lokasi suntik; urtikaria; dan bronkospasme yang sangat jarang.

30. Apakah ada kontraindikasi untuk menerima vaksin HPV Gardasil?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi HPV GARDASIL:

- a. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap komponen aktif atau pada salah satu komponen tambahan pada vaksin (sel ragi, natrium klorida, L-histidine, polysorbate 80, natrium borat, dan air untuk injeksi).
- b. Jika pasien mengalami gejala hipersensitivitas dari dosis pertama vaksin HPV Gardasil, maka dosis selanjutnya tidak boleh diberikan.
- c. Pemberian vaksin Gardasil harus ditunda jika pasien sedang mengalami demam/infeksi akut yang parah.
- d. Tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 9 tahun.
- e. Tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil.
- f. Jika Anda mengalami gangguan respon imun dan/atau gangguan pembekuan darah, konsultasi dahulu dengan dokter sebelum mendapatkan vaksin ini.

31. Apakah ibu hamil dan menyusui boleh menerima vaksin HPV Gardasil?

- a. Vaksin HPV Gardasil tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil, namun boleh diberikan kepada ibu yang menyusui.

32. Berapa lama vaksin HPV memberikan perlindungan?

- a. Vaksin HPV Gardasil memberikan perlindungan setidaknya selama 10 tahun.

33. Apakah seseorang dapat menerima vaksin HPV jika mereka sudah di diagnosis HPV?

Vaksin tidak bisa membantu mengobati atau melindungi terhadap jenis HPV yang sudah menginfeksi orang tersebut karena vaksin Gardasil tidak memiliki efek terapi. Oleh karena itu, vaksin ini tidak dimaksudkan untuk pengobatan pada kanker serviks, kelainan tingkat tinggi pada serviks, vulva, dan vagina, atau kutil kelamin. Pemberian vaksin pada orang yang telah terinfeksi HPV tidak menimbulkan kerugian, namun efektivitas vaksin menjadi lebih rendah.

34. Apakah vaksin HPV efektif melawan semua jenis HPV?

- a. Tidak. Vaksin Gardasil tidak melindungi terhadap tipe yang bukan komponen vaksin (tipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58.) atau infeksi HPV yang sudah ada sebelum vaksinasi. Tidak ada vaksin yang 100% efektif, oleh karena itu, pemeriksaan serviks rutin sangat penting dan tindakan pencegahan terhadap penyakit menular seksual lainnya tetap perlu dilanjutkan.

35. Apakah vaksin HPV dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Belum ada penelitian terkait interaksi vaksin HPV Gardasil dengan vaksin lain, sehingga pemberian dengan vaksin lain belum direkomendasikan.

36. Apakah vaksin HPV dapat diberikan saat pasien sedang menggunakan KB hormonal?

- a. Dalam studi klinis, penggunaan kontrasepsi hormonal tidak mempengaruhi respon imun terhadap vaksin HPV Gardasil.

37. Saya sudah menikah, apakah perlu pap smear terlebih dahulu agar bisa mendapatkan vaksin HPV?

- a. Mendapatkan vaksin HPV dengan atau tanpa pap smear tetap bisa dilakukan. Pap smear berguna untuk membantu mendeteksi tanda-tanda awal penyakit serviks yang disebabkan oleh HPV, sehingga kelainan tersebut dapat ditangani sesegera mungkin. Sebaliknya, vaksin HPV berguna sebagai perisai yang membantu mencegah penyakit tersebut dari awal.

Namun, perlu diingat bahwa vaksin HPV tidak memiliki efek terapi jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit atau lesi kanker. Idealnya, yang terbaik adalah melakukan keduanya: vaksin HPV untuk pencegahan dan pap smear untuk deteksi dini. Jika Anda ragu, silahkan berkonsultasi dulu dengan dokter di Halodoc.

38. Ada Gardasil-4 dan ada Gardasil-9? Apa bedanya? Mana yang lebih baik?

- a. Perbedaan utama adalah pada jumlah jenis HPV dalam kandungan vaksin. Gardasil quadrivalent atau 4 strain menargetkan 4 jenis HPV yang terkait dengan kanker serviks dan kutil kelamin (6, 11, 16, dan 18), sedangkan vaksin 9 strain memberikan perlindungan yang lebih luas dan melindungi terhadap lebih banyak jenis HPV, yaitu termasuk yang dicakup oleh vaksin quadrivalent dan tambahan 5 strain lain yaitu 31, 33, 45, 52 dan 58.
- b. Vaksin mana yang lebih sesuai untuk Anda, tergantung pada kondisi Anda dan tingkat perlindungan yang Anda inginkan. Vaksin Gardasil-4 tetap memberikan perlindungan yang signifikan terhadap jenis-jenis HPV paling umum seperti penyebab kanker serviks dan kutil kelamin. Pilihan biasanya bergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kebiasaan aktivitas seksual. Jika Anda ragu, silakan konsultasikan dengan dokter di Halodoc.

39. Jika saya sudah divaksin Gardasil 4, apakah bisa menerima vaksin Gardasil 9?

- a. Anda bisa menerima vaksin Gardasil 9 dan memulai vaksin Gardasil 9 dari dosis pertama hingga ke 3

40. Saya mendengar kabar bahwa vaksin HPV dapat membuat mandul. Apakah hal tersebut benar?

- a. Vaksin HPV telah menjalani penelitian yang luas dan uji klinis untuk menilai keamanannya, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa vaksin ini dapat menyebabkan kemandulan atau masalah reproduksi.

41. Kenapa hanya dianjurkan untuk pria umur 14-26 tahun dan wanita 14-45 th? Apakah pria >26 th atau wanita >45 th tidak mungkin terkena penyakit yang disebutkan diatas?

- a. Panduan usia untuk vaksinasi HPV tersebut didasarkan pada uji klinis terhadap efektivitas vaksin, manfaat terbesar, dan beban penyakit yang lebih tinggi pada kelompok usia tertera. Ini tidak berarti bahwa pasien di luar kelompok usia ini tidak mungkin terkena penyakit yang terkait dengan HPV. Namun, manfaat vaksinasi mungkin lebih rendah pada kelompok usia yang lebih tua, terutama jika mereka telah terpapar HPV sebelumnya.

42. Dimanakah saya bisa cek pemeriksaan HPV? Apakah bisa di Halodoc?

- a. Pemeriksaan HPV biasanya dilakukan melalui tes Pap smear atau tes HPV DNA. Namun, untuk saat ini, Halodoc belum menyediakan layanan tersebut.

43. Apakah benar vaksin HPV tidak direkomendasikan untuk yang sudah berumur lebih dari 26 tahun karena efektifitasnya berkurang?

- a. Vaksinasi HPV direkomendasikan untuk wanita bahkan setelah usia 26 tahun, namun untuk laki laki sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam/spesialis urologi dan melakukan vaksin HPV dirumah sakit. Vaksin HPV biasanya paling efektif jika diberikan sebelum seseorang terpapar virus HPV, oleh karena itu, program vaksinasi sering kali diarahkan pada kelompok usia yang lebih muda, seperti remaja. Meskipun demikian, vaksinasi masih dapat memberikan manfaat bagi orang yang lebih tua.

44. Apa bedanya Vaksin HPV yg disediakan oleh Halodoc dengan Vaksin HPV yang diwajibkan oleh negara?

- a. Vaksin HPV yang tersedia di Halodoc (vaksin HPV Gardasil) bukan bagian dari kerja sama dengan program vaksin HPV gratis dari pemerintah. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan tanyakan ke fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan program pemerintah, seperti puskesmas atau rumah sakit umum.

45. Jika vaksin HPV sebelumnya merk lain/strain nya beda dengan jadwal yang tidak sesuai, bagaimana?

- a. Jika sebelumnya Anda telah mendapatkan vaksin HPV dengan merk atau strain yang berbeda, atau jadwal dosis vaksin HPV lanjutan Anda terinterupsi, Anda tetap boleh melakukan vaksinasi HPV dosis lanjutan dengan vaksin HPV Gardasil.

46. Apakah Gardasil 9 halal?

- a. Keputusan mengenai kehalalan vaksin umumnya menjadi keputusan pribadi dan agama. Berikut kandungan dalam vaksin HPV Gardasil:
 - i. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 6
 - ii. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 11

- iii. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 16
 - iv. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 18
 - v. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 31
 - vi. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 33
 - vii. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 45
 - viii. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 52
 - ix. L1 protein Human papillomavirus (HPV) tipe 58
 - x. Gardasil juga mengandung bahan tambahan berikut: Natrium klorida, L-histidine, polysorbate 80, natrium borat, dan air untuk injeksi.
- b. Kami hanya dapat memberi informasi kandungan vaksin dan keterangan bahwa bahan-bahan yang tercantum tidak mencakup zat yang berasal secara langsung dari hewan. Sel ragi (yeast), meskipun bukan hewan, adalah mikroorganisme eukariotik.

47. Durasi kekebalan?

- a. Vaksin HPV Gardasil memberikan perlindungan dari HPV selama kurang lebih 10 tahun.

Vaksin Pneumokokus/Pneumococcal (PCV) 13-valent (Prevenar)

1. Apa itu PCV 13 (Prevenar 13), dan apa manfaatnya?

- a. PCV 13 adalah vaksin konjugat pneumokokal yang melindungi dari 13 serotipe bakteri *Streptococcus pneumoniae* (serotipe 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, dan 23F) yang dapat menyebabkan penyakit invasif, pneumonia, dan otitis media akut yang disebabkan oleh *Streptococcus pneumoniae* pada bayi, anak-anak, dan remaja mulai dari 6 minggu hingga 17 tahun; dan penyakit pneumokokus (termasuk pneumonia dan penyakit invasif) pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas.

2. Apakah isi dari vaksin PCV 13 dan apakah mengandung babi?

Tidak terdapat adanya jaringan babi di dalam vaksin PCV 13. Berikut daftar komponennya:

- a. Tiap dosis 0.5 mL mengandung: Polisakarida pneumokokus serotipe 1* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 3* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 4* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 5* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 6A* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 6B* 4,4 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 7F* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 9V* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 14* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 18C* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 19A* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 19F* 2,2 µg, Polisakarida pneumokokus serotipe 23F* 2,2 µg. Dikonjugasikan dengan protein pengangkut CRM197 dan diadsorpsi pada aluminium fosfat (0,125 mg aluminium).
- b. Eksiipien/Bahan Tambahan Tidak Aktif: Natrium klorida, Asam suksinat, Polisorbit 80, Air untuk injeksi, Aluminium fosfat.

3. Siapa yang sebaiknya mendapatkan vaksin PCV 13?

- a. Vaksin PCV 13 direkomendasikan untuk bayi mulai dari usia 6 minggu, hingga orang dewasa berusia di atas 50 tahun. Vaksin ini dianjurkan terutama untuk pasien dengan komorbiditas, daya tahan tubuh rendah, lansia, pasien yang lama dirawat di rumah sakit, dan pasien yang berencana untuk bepergian karena kondisi-kondisi ini meningkatkan risiko terkena penyakit pneumokokus.

4. Bagaimana cara kerja vaksin PCV 13?

- a. Vaksin PCV 13 merangsang sistem imun untuk menghasilkan respons antibodi terhadap serotipe bakteri *Streptococcus pneumoniae* yang terkandung di dalam vaksin. Sehingga, jika suatu saat terpapar dengan antigen yang sama, pasien tersebut sudah memiliki antibodi yang cukup untuk melawan infeksi dan mencegah terjadinya penyakit.
- 5. Apa efek samping yang mungkin timbul setelah mendapatkan vaksin PCV 13?**
 - a. Efek samping umum meliputi kemerahan atau pembengkakan di tempat suntikan atau demam, sehingga dapat menyebabkan anak rewel. Umumnya efek samping umum yg normal ini bersifat ringan dan sementara (kurang dari 3 hari).
- 6. Apakah vaksin PCV 13 aman?**
 - a. Ya, vaksin PCV 13 dianggap aman dan disetujui oleh lembaga pengawas. Seperti vaksin pada umumnya, manfaat perlindungannya lebih besar daripada risikonya.
- 7. Berapa dosis vaksin PCV 13 yang diperlukan?**
 - a. Untuk bayi usia 6 minggu - 6 bulan: Vaksin seri primer terdiri dari 3 dosis, diberikan dengan interval minimal 1 bulan antar dosis.
Berikut rekomendasi waktu pemberian vaksin: Dosis pertama diberikan pada usia 2 bulan; dosis kedua pada usia 4 bulan; dan dosis ketiga pada usia 6 bulan. Kemudian, dosis keempat (booster) diberikan pada usia antara 11 hingga 15 bulan.
- 8. Apabila anak saya terlambat atau saya lupa jadwal vaksinasi sebelumnya bagaimana?**
 - a. Untuk bayi usia 7 - 11 bulan yang sebelumnya divaksinasi atau terlambat: 2 dosis, masing-masing 0,5 mL, dengan interval minimal 1 bulan antara dosis. Dosis ketiga disarankan pada tahun kedua kehidupan (minimal 8 minggu setelah dosis ke-2).
 - b. Untuk anak-anak usia 12 - 23 bulan yang belum divaksinasi atau terlambat: 2 dosis, masing-masing 0,5 mL, dengan interval minimal 2 bulan antara dosis.
 - c. Untuk anak-anak usia 2 - 5 tahun yang belum divaksinasi atau terlambat: Satu dosis tunggal 0,5 mL sebelum berusia 5 tahun.
- 9. Anak sebelumnya divaksin dengan merek vaksin PCV yang berbeda, apakah sekarang boleh menggunakan Prevenar?**
 - a. Tidak, seri vaksinasi dengan Prevenar harus menggunakan merek/jenis vaksin yang sama.
- 10. Bagaimana dosis untuk orang dewasa?**

- a. Pemberian vaksin PCV13 dianjurkan untuk pasien berusia 19 tahun ke atas dan diprioritaskan pada kelompok yang mengalami komorbid ataupun imunokompromais.
 - b. Orang dewasa yang baru divaksinasi PPSV23 pertama kali (contoh: Pneumovax23): 1 dosis vaksin PCV13, diberikan 1 tahun setelah vaksinasi PPSV23.
 - c. Orang dewasa yang belum pernah mendapat vaksin pneumokokus: 1 dosis vaksin PCV13 dahulu sebanyak 1 dosis, kemudian dapat diberikan tambahan vaksin PPSV23 1 tahun kemudian.
- Pada kondisi imunokompromais atau pasien berusia 50 tahun ke atas, pemberian vaksin PPSV23 dapat dipercepat, paling cepat dilakukan 8 minggu setelah pemberian vaksin PCV-13.

11. Bisakah vaksin PCV 13 diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya?

- a. Ya, vaksin PCV 13 (Prevenar) dapat diberikan bersamaan vaksin difteri, tetanus, acellular atau whole-cell pertussis (DTaP/DTP), Haemophilus influenzae tipe b (HiB), inactivated poliomyelitis (IPV), hepatitis B, meningokokus serogrup C, campak, gondongan, rubella (MMR), varisela, rotavirus, dan influenza. Apabila diberikan bersamaan dengan vaksin lain, lokasi suntikan akan berbeda.

12. Berapa lama kekebalan berlangsung setelah mendapatkan vaksin PCV 13?

- a. Umumnya kekebalan didapatkan setelah 4 minggu pasca vaksinasi. Durasi kekebalan dapat bervariasi tergantung pasien dan jumlah vaksin yang sudah diterima.

13. Apakah vaksin PCV 13 dicover oleh asuransi?

- a. Vaksinasi PCV 13 mungkin ditanggung oleh asuransi Anda. Silakan tanyakan kepada penyedia asuransi Anda untuk mengetahui apakah vaksin ini ditanggung.

14. Apakah saya/anak saya perlu mendapatkan vaksin PCV 13 jika sudah mendapatkan vaksinasi pencegah pneumonia lainnya?

- a. Ya, vaksin PCV 13 direkomendasikan sebagai vaksin wajib oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk pasien anak dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) untuk orang dewasa. Meskipun anak telah menerima vaksinasi lain yang berkaitan dengan pneumonia (seperti vaksinasi influenza, vaksin Haemophilus influenzae type B (HiB), vaksin COVID-19, lainnya), vaksin PCV 13 masih diperlukan untuk melindungi dari infeksi pneumokokus.

15. Apakah vaksin PCV 13 tersedia di pusat kesehatan pemerintah?

- a. Ya, vaksin PCV 13 tersedia di Puskesmas melalui program vaksinasi nasional. Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Puskesmas terdekat, ya.

16. Apakah vaksin PCV 15 dan PCV 20 ada?

- a. Vaksin PCV 15 dan PCV 20 belum tersedia di Halodoc.

17. Apakah vaksin PCV 13 dapat diberikan kepada ibu hamil?

- a. Pemberian vaksin PCV 13 belum disarankan untuk ibu hamil dan menyusui, karena belum ada data penelitian yang cukup. Namun, keamanan dan manfaatnya dievaluasi secara individual. Apabila manfaat menerima vaksin lebih besar daripada risikonya, maka vaksin boleh diberikan pada pasien ini. Silakan konsultasi dengan spesialis kandungan sebelum melakukan vaksinasi.

18. Apakah pasien dengan kondisi khusus seperti HIV, kanker, trombositopenia, transplant organ, penyakit ginjal berat, gangguan imun lainnya (cacat genetik, disfungsi limpa kongenital/acquired), sindroma nefrotik, lainnya) dan pasien dengan kondisi kronis lainnya boleh menerima vaksin ini?

- a. Pasien dengan kondisi khusus seperti ini terutama yang berat mungkin dapat mengalami penurunan respons antibodi terhadap imunisasi aktif dan vaksinasi sebaiknya dipertimbangkan secara individual, tergantung pada kondisi kesehatan saat ini dan faktor-faktor lainnya yang hanya bisa ditentukan oleh dokter spesialis yang merawat (umumnya dokter spesialis penyakit dalam). Silakan konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi.

19. Saya sedang demam/pilek/batuk/diare/infeksi akut lainnya. Apakah boleh menerima vaksin ini?

- a. Vaksinasi Prevenar seharusnya ditunda pada pasien yang menderita demam atau infeksi akut yang parah. Namun, adanya infeksi minor, seperti infeksi ringan saluran pernafasan atas atau demam tingkat rendah, dan jika pasien demam di bawah 38 derajat dan dapat beraktivitas dengan normal, maka bukan termasuk kontraindikasi untuk imunisasi. Namun, efektivitas vaksin akan lebih baik apabila diberikan dalam kondisi tubuh sedang sehat total.

Vaksin Influenza (Flubio & Vaxigrip Tetra)

1. Apa saja manfaat injeksi Imunisasi Influenza?

- a. Imunisasi/Vaksin Influenza bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus influenza.

2. Persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan injeksi Vaksin?

- a. Cukup pastikan tubuh Anda dalam keadaan sehat, ya.

3. Persiapan apa saja yang perlu dihindari sebelum melakukan injeksi Vaksin?

Berikut hal yang perlu diingat **sebelum** vaksinasi:

- a. Jangan mengonsumsi obat yang dapat mempengaruhi sistem imun tubuh.
- b. Jangan mengonsumsi obat penurun demam/nyeri sebelum vaksinasi.

4. Bagaimana cara atau di mana injeksinya? apakah di lengan, di pantat atau lewat infus?

- a. Bayi 1 - 12 bulan: Di paha.
- b. Anak usia 1- 10 tahun: Di paha atau lengan atas.
- c. Anak usia >11 tahun: Di lengan atas.
- d. Dewasa: Di lengan atas.

5. Apa saja yang perlu dihindari setelah injeksi Vaksin?

Berikut hal yang perlu diingat **setelah** vaksinasi:

- a. **Jangan mengonsumsi** obat penurun demam/nyeri segera setelah vaksinasi (obat penurun demam/nyeri hanya dikonsumsi setelah ada gejala).
- b. Jangan mengonsumsi obat yang dapat mempengaruhi sistem imun tubuh.
- c. Jangan menekan atau menggosok area suntikan.
- d. Hindari mengonsumsi alkohol dan merokok.

6. Kapan saya boleh mengulang injeksi Vaksin Influenza?

- i. Untuk anak berusia 6 - 35 bulan: 2 dosis dengan interval minimal 1 bulan antar dosis, dapat diulang pada tahun berikutnya.
- ii. Untuk anak berusia 3 - 8 tahun: 2 dosis dengan interval minimal 1 bulan antar dosis, dapat diulang pada tahun berikutnya.
- iii. Untuk pasien diatas 9 tahun: 1 dosis, diulang setiap tahun.

7. Apakah saya boleh mengonsumsi obat paracetamol/ibuprofen sebelum vaksinasi untuk mengurangi reaksi efek samping?

- a. **Tidak disarankan** untuk meminum obat-obatan ini sebelum vaksinasi untuk mencegah efek samping ya, karena obat-obatan yang dijual bebas dapat mempengaruhi efektivitas vaksin.

8. Apakah perbedaan vaksin Vaxigrip Tetra dengan Flubio?

Berikut perbedaan antara vaksin Vaxigrip Tetra dan Flubio:

- a. Vaxigrip Tetra (quadrivalent) dapat memberikan respons kekebalan tubuh terhadap 4 varian virus flu.

- b. Vaksin Flubio (trivalen) hanya memberikan respons kekebalan tubuh pada 3 varian flu.
- 9. Apakah vaksinasi Vaxigrip Tetra dan/atau flubio aman untuk ibu hamil dan menyusui?**
- a. Vaxigrip Tetra dan Flubio aman untuk ibu hamil dan menyusui, ya.
- 10. Mulai usia berapa yang diperbolehkan injeksi vaksin influenza Vaxigrip Tetra/Flubio?**
- a. Vaxigrip Tetra dapat diberikan kepada bayi mulai dari usia 6 bulan, ya.
- 11. Vaksin Flu mengandung formalin (formaldehyde), apakah aman?**
- a. Benar, pada Vaksin Flu terdapat kandungan formaldehid dalam jumlah yang terkontrol (sudah diteliti) dan kadar sangat rendah sehingga aman untuk digunakan.
 - b. Fungsi formaldehyde di vaksin antara lain:
 - i. Menonaktifkan strain virus yang ada di dalam vaksin tersebut, sehingga kemungkinan pasien sakit setelah divaksin menjadi kecil.
 - ii. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak diharapkan dalam vaksin yang bisa menurunkan fungsi dan keamanan vaksin.
- 12. Dimana saja jangkauan lokasi injeksi Vaksin Flu Home Lab saat ini?**
- a. Saat ini Vaksinasi Halodoc Home Lab hanya tersedia Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi.
- 13. Apakah boleh melakukan injeksi Vitamin C dan Vaksin Influenza secara bersamaan?**
- a. Ya, kedua tindakan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan apabila tidak ada kontraindikasi yang terdeteksi saat skrining.
- 14. Bagaimana saya dapat memastikan tenaga medis yang memberikan injeksi Vaksin sudah memenuhi standar yang ditetapkan Halodoc?**
- a. Halodoc memprioritaskan keamanan dan keselamatan pasien, sehingga seluruh staf medis kami sudah tersertifikasi dan memiliki kompetensi yang diperlukan.
- 15. Apa saja efek samping, risiko, atau hal yang perlu diperhatikan setelah injeksi Vaksinasi?**
- Berikut hal yang perlu diperhatikan setelah Anda divaksinasi:
- a. Bila timbul gejala demam, nyeri dan/atau kemerahan pada lokasi suntikan, dapat segera menghubungi Admin Klinik Halodoc Home Lab & Vaksinasi (**0858xxx**) atau datang fasilitas kesehatan terdekat.
 - b. Bila ada keluhan alergi, pusing, pandangan kabur, sesak nafas, hingga penurunan kesadaran, segera kunjungi Instalasi Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit terdekat.
- 16. Apakah efek samping tersebut selalu terjadi?**

- a. Efek samping tidak selalu terjadi, namun tergantung pada kondisi tubuh Anda saat divaksinasi.

17. Apa saja jenis Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ringan?

- a. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Keluhan ringan, yang pada umumnya akan hilang setelah 1-2 hari setelah pengobatan, di antaranya:
 - i. Reaksi lokal : nyeri dan kemerahan pada lokasi suntikan
 - ii. Reaksi sistemik : demam, nyeri otot, kelelahan.

18. Apa yang harus saya lakukan jika saya mendapatkan efek samping setelah injeksi Vaksin?

- a. Konsultasi dengan dokter apabila Anda mengalami reaksi efek samping sesaat atau setelah pemberian vaksin, ya.

19. Apakah saya boleh mengonsumsi obat paracetamol/ibuprofen sebelum vaksinasi untuk mengurangi reaksi efek samping?

- a. **Tidak disarankan** untuk meminum obat-obatan ini sebelum vaksinasi untuk mencegah efek samping ya, karena tidak diketahui bagaimana obat-obatan yang dijual bebas dapat mempengaruhi seberapa efektivitas baik kerja vaksin.

20. Saya memiliki riwayat alergi, apakah boleh melakukan injeksi vaksin?

- a. Anda tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi Influenza jika memiliki riwayat alergi terhadap vaksin Influenza sebelumnya.
- b. Peringatan alergi untuk Vaksin Vaxigrip Tetra: Tidak disarankan bagi pasien dengan riwayat alergi telur (ovalbumin, protein ayam), neomisin, formaldehida dan oktaksinol-9
- c. Peringatan alergi untuk vaksin Flubio: Tidak disarankan bagi pasien dengan hipersensitivitas terhadap salah satu komponen vaksin, riwayat alergi berat telur dan protein ayam.

21. Siapa saja yang tidak boleh mendapatkan injeksi/kontraindikasi vaksinasi Vaxigrip Tetra dan/atau flubio

- a. Vaksin Vaxigrip Tetra tidak dianjurkan jika Anda/pasien:
 - i. Hipersensitivitas terhadap zat aktif, terhadap salah satu komponen yang tercantum dalam vaksin, atau terhadap komponen telur (ovalbumin, protein ayam), neomisin, formaldehida dan oktaksinol-9.
 - ii. Sedang mengalami demam dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau penyakit akut lainnya. Silakan tunda vaksinasi hingga kondisi kesehatan kembali optimal.
- b. Vaksin Flubio tidak diajarkan jika Anda/pasien:
 - i. Hipersensitivitas terhadap salah satu komponen vaksin.
 - ii. Memiliki riwayat alergi terhadap vaksin Influenza sebelumnya.
 - iii. Memiliki riwayat alergi berat terhadap telur dan protein ayam.

22. Apakah Injeksi Vaksin FluBio dan Vaxigrip Tetra ini aman?

- a. Halodoc menggunakan produk yang sudah teregistrasi di BPOM, sehingga keamanannya terjamin.

23. Apakah vaksin Flubio/Vaxigrip Tetra Halal?

- a. Saat ini, vaksin Flubio/Vaxigrip Tetra belum mencantumkan logo Halal pada kemasannya. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal** (halal.go.id).

24. Durasi kekebalan?

- a. Vaksin influenza memberikan perlindungan terhadap penyakit influenza selama kurang lebih 1 tahun. Untuk perlindungan optimal, ulangi dosis sesuai dengan anjuran

Vaksin Rotavirus Monovalen (Rotarix)

1. Apa itu Rotarix?

- a. Rotarix adalah vaksin yang dirancang untuk mencegah gastroenteritis yang disebabkan oleh rotavirus, khususnya strain RIX4414. Vaksin ini membantu mengurangi kejadian diare, komplikasi diare, dan dehidrasi..

2. Kepada siapa Rotarix direkomendasikan?

- a. Vaksinasi Rotarix direkomendasikan untuk bayi dan anak-anak guna memberikan perlindungan terhadap gastroenteritis yang disebabkan oleh rotavirus.

3. Mengapa vaksinasi Rotarix penting?

- a. Vaksinasi Rotarix penting karena dapat membantu mengurangi risiko infeksi rotavirus yang berat. Rotavirus adalah penyebab umum diare parah pada bayi dan anak-anak kecil, yang dapat menyebabkan komplikasi dan dalam beberapa kasus, perlu rawat inap.

4. Apa komplikasi yang mungkin terjadi akibat infeksi rotavirus?

- a. Infeksi rotavirus dapat menyebabkan gastroenteritis, yaitu peradangan pada lambung dan usus. Meskipun sebagian besar kasus infeksi rotavirus bersifat ringan dan sembuh sendiri, dalam beberapa kasus dapat menyebabkan komplikasi, terutama pada kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak kecil. Beberapa potensi komplikasi meliputi:
 - i. Dehidrasi: Komplikasi paling umum dan serius dari infeksi rotavirus. Diare dan muntah yang berkepanjangan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit, terutama pada bayi dan anak-anak kecil. Dehidrasi dapat berbahaya jika tidak segera ditangani.
 - ii. Rawat Inap: Pada kasus yang parah, terutama pada bayi, rawat inap mungkin diperlukan untuk mengatasi dehidrasi dan memberikan perawatan pendukung. Rawat inap lebih umum terjadi di daerah dengan akses terbatas terhadap perawatan medis dan larutan rehidrasi oral.
 - iii. Dampak pada Pertumbuhan dan Perkembangan: Episode berulang atau berat gastroenteritis akibat rotavirus dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan, terutama di daerah di mana kekurangan gizi sudah menjadi masalah.

5. Siapa yang merekomendasikan vaksinasi Rotarix?

- a. Vaksinasi Rotarix direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai bagian dari imunisasi wajib untuk bayi dan anak-anak.

6. Apakah Rotarix dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Ya, vaksin Rotarix dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain, termasuk DTaP-HBV-IPV/Hib, DTwP, DTaP, Hib, IPV, Hepatitis B, PCV, dan vaksin meningokokus serogrup C, selama penerima lulus uji skrining vaksin.
- 7. Apa jadwal pemberian dosis yang direkomendasikan untuk Rotarix?**
- a. Vaksin Rotarix melibatkan 2 dosis secara oral. Dosis pertama diberikan pada bayi berusia 6 minggu, dan dosis kedua diberikan minimum 4 minggu setelah dosis pertama. Disarankan untuk menyelesaikan kedua dosis sebelum bayi mencapai usia 24 minggu.
- 8. Apakah ada kontraindikasi untuk vaksinasi Rotarix?**
- a. Vaksin Rotarix tidak boleh diberikan kepada bayi yang sangat hipersensitif terhadap komponen vaksin, memiliki riwayat atau masalah dengan usus (kongenital atau kondisi yang terkait atau berpotensi menyebabkan intususepsi), dan bayi yang sedang mengalami infeksi akut berat, demam tinggi, diare, dan muntah.
- 9. Apakah Rotarix dapat diberikan kepada bayi dengan kondisi kesehatan tertentu?**
- a. Untuk bayi dengan kondisi kesehatan khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter anak sebelum memberikan Vaksin Rotarix, karena mungkin memerlukan pertimbangan atau pemantauan khusus.
- 10. Apakah Rotarix efektif melawan semua jenis rotavirus?**
- a. Vaksin Rotarix pada dasarnya menargetkan strain rotavirus RIX4414, yang merupakan penyebab umum gastroenteritis. Meskipun dapat memberikan beberapa perlindungan silang, efektivitasnya tertinggi terhadap strain yang ditargetkan.
- 11. Apa efek samping umum dari Rotarix?**
- a. Efek samping umum mungkin meliputi iritabilitas ringan, demam ringan, dan kehilangan nafsu makan sementara. Efek samping yang parah meliputi reaksi alergi berat, namun jarang terjadi.
- 12. Apakah Rotarix dapat menyebabkan intususepsi?**
- a. Ada risiko intususepsi minimal yang terkait dengan vaksin Rotarix. Namun, manfaat vaksinasi dalam mencegah infeksi Rotavirus yang parah lebih besar daripada risikonya.
- 13. Apakah Rotarix bisa diberikan kepada bayi prematur?**
- a. Vaksin Rotarix dapat diberikan kepada bayi prematur, tetapi waktu vaksinasi mungkin disesuaikan berdasarkan usia gestasional bayi. Konsultasikan dengan dokter spesialis anak untuk mengetahui waktu vaksinasi yang paling sesuai untuk bayi Anda.
- 14. Berapa lama perlindungan yang diberikan oleh Rotarix?**
- a. Vaksin Rotarix memberikan perlindungan selama periode bayi paling rentan terhadap infeksi rotavirus yang parah.
- 15. Apakah Rotarix cocok untuk bayi yang sedang menyusui?**

- a. Ya, vaksin Rotarix cocok untuk bayi yang sedang menyusui. Menyusui dapat terus dilakukan sebelum, selama, dan setelah vaksinasi Rotarix.

16. Apa yang harus dilakukan jika bayi muntah setelah menerima Rotarix?

- a. Jika bayi muntah sedikit/sebagian kecil, dosis tidak perlu diulang. Jika bayi memuntahkan keseluruhan/sebagian besar vaksin, maka dokter dapat mempertimbangkan pengulangan dosis. Bayi dapat langsung makan atau minum setelah menerima vaksin Rotarix.

17. Apakah Rotarix tersedia untuk orang dewasa?

- a. Tidak, vaksin Rotarix dirancang khusus untuk bayi.

18. Anak sebelumnya divaksin dengan merek vaksin rotavirus yang berbeda, apakah sekarang boleh menggunakan Rotarix?

- a. Tidak, seri vaksinasi rotavirus harus menggunakan merek/jenis vaksin yang sama.
- b. Merk lain vaksin rotavirus yang digunakan di Indonesia di antaranya adalah Rotateq.

19. Apakah isi dari vaksin Rotarix dan apakah mengandung babi?

- a. Vaksin Rotarix belum mencantumkan logo Halal pada kemasannya. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (halal.go.id).
- b. Berikut komponen yang terkandung dalam vaksin Rotarix.
- c. Tiap 1 dosis (1.5 ml) mengandung:
Bahan aktif: Human Rotavirus RIX4414 strain
Bahan inaktif: Sukrosa, Disodium adipate , Dulbecco's modified Eagle Medium (DMEM) dan air steril.
Material Porcine Circovirus tipe 1 (PCV-1) telah terdeteksi dalam vaksin Rotarix.
- d. Vaksin mengandung materi yang terkait dengan Porcine Circovirus tipe 1. Porcine circovirus (PCV) adalah virus umum pada babi yang ditemukan di seluruh dunia. Porcine circovirus adalah virus, bukan bahan dari babi atau hewan lainnya. PCV-1 tidak diketahui menyebabkan penyakit pada hewan dan tidak diketahui dapat menginfeksi atau menyebabkan penyakit pada manusia. Tidak ada bukti bahwa keberadaan PCV-1 menimbulkan risiko keamanan.
- e.

20. Durasi kekebalan?

- a. Vaksin Rotarix memberikan perlindungan terhadap rotavirus selama kurang lebih 2 - 3 tahun usia anak.

21. Apa ada merek vaksin rotavirus lain? Apakah ada bedanya?

- a. Di Indonesia, ada merek lain yaitu Rotateq yang dapat melindungi dari 5 strain rotavirus dan meliputi 3 dosis. Sementara itu, vaksin Rotarix

melindungi dari 1 strain dan meliputi 2 dosis. Saat ini, Halodoc hanya menyediakan vaksinasi Rotarix.

22. Apabila anak saya sudah lebih dari 24 minggu bagaimana?

- a. Batas akhir usia anak yang disarankan untuk mendapatkan vaksin Rotarix adalah 24 minggu. Jika anak melewati usia ini, silakan konsultasi terlebih dulu ke dokter spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi.

Vaksin Tdap (Boostrix)

1. Apa itu Boostrix?

- a. Vaksin Boostrix adalah vaksin yang memberikan imunisasi booster terhadap difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan/batuk 100 hari) untuk pasien berusia 10 tahun ke atas.

2. Apa itu difteri, tetanus, dan pertusis?

- a. Difteri adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* yang mempengaruhi pernapasan. Gejala awal termasuk sakit tenggorokan, demam ringan, dan pembengkakan kelenjar. Saat penyakit berkembang, membran abu-abu dapat terbentuk di tenggorokan, menyebabkan kesulitan bernapas dan bisa berkomplikasi menimbulkan masalah jantung, saraf, hingga kematian.
- b. Tetanus disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani*, yang bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka atau sayatan. Gejala termasuk kekakuan otot, kram rahang (lockjaw), kesulitan menelan, dan demam. Komplikasi parah dapat mencakup patah tulang, kesulitan bernapas, hingga kematian.
- c. Pertusis (Batuk Rejan/batuk 100 hari) adalah penyakit pernapasan yang sangat menular yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis*. Gejala awal menyerupai pilek biasa, tetapi berkembang menjadi serangan batuk yang parah, sering terdengar suara "bersiul" (whooping) saat batuk. Komplikasi mencakup pneumonia, kejang, penurunan berat badan, dan kematian.

3. Mengapa Boostrix direkomendasikan?

- a. Vaksin Boostrix direkomendasikan sebagai pelindung dari penyakit difteri, tetanus, dan pertusis, serta untuk mencegahnya dari terjadi kembali. Vaksin ini terutama dianjurkan bagi remaja dan orang dewasa yang sudah mendapatkan vaksin yang mengandung DTP lebih dari 5 tahun yang lalu.
- b. Vaksin Boostrix juga direkomendasikan untuk diberikan pada ibu hamil di trimester terakhir kehamilan. Ini bermanfaat untuk memberikan perlindungan pasif terhadap pertusis pada bayi baru lahir karena bayi baru akan mendapat vaksinasi DTP pada usia 2 bulan.

4. Kapan Boostrix harus diberikan?

- a. Dosis awal vaksin Boostrix diberikan 5 tahun atau lebih setelah dosis terakhir DTaP atau dosis Td.
- b. Dosis tambahan dapat diberikan 9 tahun atau lebih setelah vaksin Tdap awal.
- c. Ibu hamil dapat menerima vaksin Boostrix pada trimester ketiga (27 - 36 minggu) untuk mencegah pertusis pada bayi baru lahir.

5. Bagaimana Boostrix diberikan?

- a. Vaksin Boostrix diberikan melalui suntikan ke dalam otot pada lengan bagian atas.

6. Siapa yang tidak boleh menerima Boostrix?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum mendapatkan vaksin Boostrix:

- a. Vaksin Boostrix tidak boleh diberikan kepada pasien yang sangat hipersensitif terhadap komponennya atau memiliki riwayat reaksi alergi berat terhadap vaksin dengan komponen serupa (vaksin yang mengandung strain difteri, tetanus, atau pertusis).
- b. Vaksin Boostrix tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat trombositopenia transien (trombosit dalam tubuh menurun) atau komplikasi neurologis setelah imunisasi difteri, pertusis, atau tetanus sebelumnya.
- c. Vaksin Boostrix dikontraindikasikan bagi pasien dengan alergi lateks berat.
- d. Vaksinasi Boostrix harus ditunda jika pasien sedang mengalami infeksi akut berat, demam tinggi, atau keadaan neurologis (contohnya epilepsi) yang tidak stabil.
- e. Vaksin Boostrix tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 10 tahun.

7. Apakah Boostrix dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Ya, Vaksin Boostrix dapat diberikan bersamaan dengan vaksin inaktif lainnya, termasuk untuk meningokokus, pneumokokus, Hib, tifoid, HPV, influenza, hepatitis A, dan hepatitis B, selama pasien lolos skrining pra-vaksinasi.

8. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?

- a. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan oleh dokter yang teregistrasi.
- b. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.

9. Apakah Boostrix aman selama kehamilan?

- a. Ya, Vaksin Boostrix boleh diberikan kepada ibu hamil untuk membantu melindungi bayi baru lahir dari pertusis. Ibu hamil disarankan untuk mendapatkan vaksin ini pada usia kehamilan 27 - 36 minggu.

10. Apa efek samping umum dari Boostrix?

- a. Efek samping umum dapat mencakup nyeri atau pembengkakan di lokasi suntikan, demam ringan, dan kelelahan. Efek samping serius seperti gangguan neurologis mungkin ada namun sangat jarang terjadi.

11. Apakah orang dengan gangguan sistem imun seperti HIV boleh menerima vaksin ini?

- a. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) tidak dianggap sebagai kontraindikasi untuk vaksinasi difteri, tetanus, dan pertusis, namun respon

sistem imun yang diharapkan mungkin tidak optimal. Jika Anda/pasien adalah pasien imunokompromais, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum mendapatkan vaksinasi ini dan jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

12. Berapa lama kekebalan berlangsung setelah mendapatkan vaksin Boostrix?

- a. Pada umumnya, kekebalan akan didapatkan 4 minggu setelah vaksinasi. Durasi kekebalan dapat bervariasi tergantung pasien dan jumlah vaksin yang sudah diterima.

13. Apakah Vaksin Boostrix Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?

- a. Vaksin Boostrix memberikan perlindungan terhadap difteri, tetanus dan pertusis selama kurang lebih 10 tahun. Untuk perlindungan optimal, ulangi dosis sesuai dengan anjuran.

14. Apakah isi dari vaksin Boostrix dan apakah mengandung babi?

- a. Tidak terdapat jaringan dari babi di dalam komponen vaksin Boostrix. Berikut komponennya:
- b. Tiap dosis 0.5 mL mengandung:
Toksoid difteri: Tidak kurang dari 2 Unit Internasional (IU) (2,5 Lf)
Toksoid tetanus: Tidak kurang dari 20 Unit Internasional (IU) (5 Lf)
Antigen Bordetella Pertusis:
 - i. Toksoid Pertusis: 8 mikrogram
 - ii. Filamentous haemagglutinin: 8 mikrogram
 - iii. Pertactin: 2,5 mikrogramSemua komponen diadsorpsi pada aluminum hidroksida ($\text{Al}(\text{OH})_3$) 0,3 miligram Al^{3+} dan fosfat aluminium (AlPO_4) 0,2 miligram Al^{3+} .
- c. Bahan tambahan/Bahan tidak aktif: Natrium klorida, air untuk suntikan. Formaldehida, polisorbat 80, dan glisin hadir sebagai sisa dari proses pembuatan.

15. Vaksin Boostrix mengandung formalin (formaldehyde), apakah aman?

- a. Benar, pada vaksin Boostrix terdapat kandungan formaldehid dalam jumlah yang terkontrol (sudah diteliti) dan kadar sangat rendah sehingga aman untuk digunakan.
- b. Fungsi formaldehyde di vaksin antara lain:
 - i. Menonaktifkan strain virus yang ada di dalam vaksin tersebut, sehingga kemungkinan pasien sakit setelah divaksin menjadi kecil.
 - ii. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme lain yang bisa menurunkan fungsi dan keamanan vaksin.

16. Apakah DTap dan Tdap sama?

- a. Tdap adalah vaksin yang ditujukan untuk pasien di atas usia 7 tahun dan dewasa, sedangkan DTaP diberikan untuk pasien anak berusia 2 bulan hingga 7 tahun.

Tdap (Tetanus, Diphtheria, acellular Pertussis) dan DTaP (Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis) adalah dua vaksin kombinasi yang melibatkan proteksi terhadap penyakit tetanus, difteria, dan pertusis. Meskipun keduanya melibatkan imunisasi terhadap penyakit yang serupa, terdapat perbedaan komponen pertusis dan difteri yang lebih kecil pada Tdap (sehingga huruf “d” dan “p” kecil).

17. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

Vaksin Tifoid (Typhim Vi)

1. **Apa itu Typhim Vi, dan apa tujuan utamanya?**
 - a. Typhim Vi adalah vaksin yang bertujuan memberikan perlindungan aktif melawan demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri *S typhi*.
2. **Siapa yang sebaiknya mendapatkan vaksin Typhim Vi?**
 - a. Vaksin Typhim Vi direkomendasikan untuk pekerja makanan, pekerja laboratorium yang terpapar *S. typhi*, wisatawan di daerah berisiko, dan pasien yang mungkin terpapar melalui kontak dekat dengan penderita atau makanan dan air terkontaminasi. Vaksin ini dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) sebagai bagian dari imunisasi wajib.
3. **Apa itu demam tifoid dan kenapa vaksin ini penting?**
 - a. Demam tifoid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *S typhi*. Penyakit ini utamanya ditularkan melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh seseorang yang terinfeksi. Bakteri ini menyerang usus, menyebabkan penyakit sistemik dengan gejala seperti demam, nyeri otot, hilangnya nafsu makan, ketidaknyamanan perut, dan sakit kepala. Dalam kasus yang parah, dapat terjadi komplikasi seperti perforasi usus dan pendarahan, yang dapat berujung pada tingkat kematian yang tinggi tanpa pengobatan yang tepat.
 - b. Sejumlah kecil penderita dapat berkembang menjadi *chronic carrier*, di mana pasien, seringkali tanpa menyadari, menjadi inang tempat penyimpanan bakteri ini. Hal ini khususnya penting di daerah di mana demam tifoid masih endemis, dan wabah seringkali disebabkan oleh penderita *carrier* yang tidak bergejala, seperti pekerja makanan/*food handler*.
 - c. Demam tifoid masih merupakan kekhawatiran di banyak negara, terutama di kalangan anak-anak sekolah, menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang signifikan. Vaksinasi terhadap demam tifoid, seperti Typhim Vi, sangat penting karena dapat mengurangi risiko infeksi, mencegah penyakit parah, dan membantu memutus rantai penularan.
4. **Pada usia berapa Typhim Vi direkomendasikan untuk diberikan?**
 - a. Vaksin Typhim Vi dapat diberikan pada pasien berusia 2 tahun ke atas hingga lansia.
5. **Seberapa sering Typhim Vi seharusnya diberikan?**
 - a. Dosis pertama diberikan pada usia 2 tahun, kemudian diulang setiap 3 tahun. Untuk pasien dewasa, satu dosis diulang setiap 3 tahun.
6. **Apakah Typhim Vi direkomendasikan untuk pelancong, dan daerah mana yang memiliki risiko tinggi terpapar demam tifoid?**

- a. Ya, Typhim Vi direkomendasikan untuk wisatawan, terutama yang melakukan perjalanan ke daerah dengan risiko tinggi demam tifoid, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Tengah dan Selatan. Vaksin Typhim Vi juga dianjurkan jika Anda/pasien berencana/sedang menetap di lokasi yang berisiko terpapar secara berkepanjangan terhadap makanan dan air yang mungkin terkontaminasi bakteri S Typhi.
- 7. Apakah Typhim Vi dapat diberikan kepada pasien yang sedang hamil atau menyusui?**
 - a. Vaksin Typhim Vi tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang hamil atau menyusui. Jika sangat dibutuhkan, konsultasi dengan dokter spesialis kandungan sebelum melakukan vaksinasi.
- 8. Apa efek samping yang mungkin timbul dari Typhim Vi?**
 - a. Efek samping umum dari vaksin Typhim Vi termasuk gangguan saluran pencernaan: Mual, muntah, diare, nyeri perut
 - b. Gangguan umum dan kondisi di lokasi penyuntikan: Nyeri di tempat penyuntikan, peradangan, indurasi, dan eritema; limfadenopati, demam, astenia, malaise, episode mirip flu
 - c. Reaksi berat lain seperti syok anafilaktik yang jarang terjadi.
- 9. Apakah ada kontraindikasi atau kondisi yang dapat mencegah seseorang menerima Typhim Vi?**

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi Typhim Vi:

 - a. Vaksin Typhim Vi tidak boleh diberikan kepada pasien dengan hipersensitivitas terhadap komponen vaksin Typhim Vi.
 - b. Vaksin Typhim Vi tidak boleh diberikan pada pasien yang sedang mengalami infeksi akut berat dan demam tinggi.
 - c. Vaksin Typhim Vi tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang hamil atau menyusui.
 - d. Vaksin Typhim Vi tidak dapat diberikan kepada pasien dengan alergi lateks berat.
- 10. Apakah Typhim Vi dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?**
 - a. Vaksin Typhim Vi dapat diberikan bersamaan dengan vaksin-vaksin umum lainnya (hepatitis A, demam kuning, difteri, tetanus, polio, rabies, meningitis A+C, dan hepatitis B) di lokasi suntikan yang berbeda.
- 11. Apakah Typhim Vi dapat diberikan kepada pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah/kondisi khusus lainnya?**
 - a. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi dan jika diperbolehkan, silahkan melakukan vaksinasi dirumah sakit.
- 12. Berapa lama sebelum paparan demam tifoid diharapkan Typhim Vi diberikan?**

- a. Vaksin Typhim Vi lebih efektif jika diberikan setidaknya dua minggu sebelum diperkirakan terpapar bakteri S typhi.

13. Apakah ada pertimbangan khusus untuk pasien dengan riwayat reaksi alergi terhadap vaksin terkait Typhim Vi?

- a. Bagi pasien dengan riwayat alergi terhadap vaksin atau komponen Typhim Vi, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi dan jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

14. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

15. Apakah isi dari vaksin Typhim Vi dan apakah mengandung babi?

- a. Tidak terdapat jaringan dari babi di dalam komponen vaksin Typhim Vi. Berikut kandungannya:
- b. Setiap dosis 0,5 mL diformulasikan untuk mengandung 25 mcg polisakarida sel Vi yang dimurnikan dalam larutan saline fosfat isotonik yang tidak berwarna (pH $7 \pm 0,3$), diekstrak dari Salmonella enterica serovar Typhi, khususnya dari strain S typhi Ty2, dibiakkan dalam medium semi-sintetis, dengan menggunakan bahan mentah yang berasal dari kasein pada awal proses manufaktur selama proses fermentasi.
- c. Polisakarida kapsular diendapkan dari supernatan kultur yang terkonsentrasi dengan penambahan bromida heksadesiltrimetilamonium.
- d. Setiap dosis 0,5 mL mungkin mengandung jumlah residu formaldehida (tidak lebih dari 100 mcg) yang digunakan untuk inaktivasi kultur bakteri. 0,25% fenol ditambahkan sebagai pengawet. Vaksin dapat mengandung residu polidimetilsiloksan atau antifoam berbasis ester asam lemak.
- e. Mengandung 4,150 mg Natrium Klorida, 0,065 mg Disodium Phosphate, 0,023 mg Monosodium Phosphate, dan 0,5 mL Air Steril untuk Injeksi.
- f. Tutup vial dan tutup plunger pada jarum suntik tidak terbuat dari lateks alami.

16. Vaksin Typhim Vi mengandung formalin (formaldehyde), apakah aman?

- a. Benar, pada Boostrix terdapat kandungan formaldehid dalam jumlah yang terkontrol (sudah diteliti) dan kadar sangat rendah sehingga aman untuk digunakan.
- b. Fungsi formaldehyde di vaksin antara lain:

- c. Menonaktifkan strain virus yang ada di dalam vaksin tersebut, sehingga kemungkinan pasien sakit setelah divaksin menjadi kecil.
- d. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme lain yang bisa menurunkan fungsi dan keamanan vaksin.

17. Durasi kekebalan?

- a. Vaksin Typhim Vi memberikan perlindungan terhadap demam tifoid selama 3 tahun. Untuk perlindungan optimal, ulangi dosis sesuai dengan anjuran.

Vaksin Hepatitis A (Havrix 720 Junior)

- 1. Apa itu Havrix Junior, dan apa tujuannya utama?**
 - a. Havrix Junior adalah vaksin yang melindungi dari Hepatitis A, yaitu virus yang menyerang hati dan dapat menyebabkan gangguan fungsi hati hingga gagal hati.
- 2. Apa itu Hepatitis A dan bagaimana penularannya?**
 - a. Hepatitis A adalah penyakit akut yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Gejala hepatitis A di antaranya demam, sakit kepala, kelesuan, anoreksia, mual, muntah, diare, nyeri perut, dan urine yang berwarna gelap.
 - b. Virus hepatitis A ditularkan melalui rute feses-oral. Ini dapat terjadi melalui:
 - i. Kontak dekat dari orang ke orang dengan seseorang yang terinfeksi.
 - ii. Kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi.
 - iii. Konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi.
- 3. Siapa yang berisiko tinggi terinfeksi virus hepatitis A (HAV)?**
 - a. Wisatawan internasional
 - b. Pria yang berhubungan seks dengan pria
 - c. Orang yang menggunakan obat suntik atau non-suntik ilegal.
 - d. Orang dengan risiko pekerjaan terpapar (seperti petugas day care, tenaga medis, pekerja sanitasi, dan penanganan makanan).
 - e. Orang yang kontak personal dekat dengan penderita hepatitis A.
 - f. Tuna wisma
 - g. Orang yang berisiko tinggi untuk mengalami sakit parah akibat infeksi HAV:
 - i. Orang dengan penyakit hati kronis (carrier hepatitis B atau C)
 - ii. Orang dengan infeksi virus immunodeficiency manusia (HIV)
- 4. Kelompok usia berapa yang direkomendasikan untuk Havrix Junior?**
 - a. Vaksin Havrix Junior bisa diberikan untuk anak-anak dan remaja usia 1 hingga 18 tahun. Namun dosis pertama disarankan diberikan di usia 1 tahun.
- 5. Bagaimana jadwal vaksinasi untuk Havrix Junior?**
 - a. Dosis vaksin primer: 1 dosis pada usia 1 tahun.
 - b. Dosis booster: 6 - 12 bulan setelah dosis primer untuk memastikan perlindungan jangka panjang.
- 6. Bagaimana Havrix Junior diberikan?**
 - a. Vaksin Havrix Junior 720 diberikan melalui suntikan intramuskular (ke dalam otot). Untuk orang dewasa dan anak-anak, disuntikkan ke daerah deltoid (otot lengan atas), sedangkan untuk bayi dan anak-anak yang lebih kecil, diberikan di bagian anterolateral (depan) paha.
- 7. Apakah Havrix Junior dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?**
 - a. Ya, Vaksin Havrix Junior dapat diberikan bersamaan dengan vaksin seperti tifoid, demam kuning, kolera, tetanus, dan vaksin kombinasi yang

mengandung campak, gondongan, rubela, dan cacar air, serta immunoglobulin menggunakan jarum dan suntik yang berbeda.

8. Apakah ada kontraindikasi khusus untuk Havrix Junior ?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi Havrix Junior:

- a. Vaksin Havrix tidak boleh diberikan kepada pasien dengan hipersensitivitas berat terhadap komponennya dan antibiotik neomisin.
- b. Vaksin Havrix tidak direkomendasikan untuk pasien yang mengalami infeksi akut berat dan demam tinggi.
- c. Tutup ujung pada jarum suntik mengandung lateks karet alami yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada pasien yang sensitif terhadap lateks.

9. Apakah Havrix Junior aman untuk ibu hamil dan menyusui?

- a. Vaksin Havrix Junior sebaiknya diberikan pada ibu hamil atau menyusui hanya jika memang diperlukan. Silakan konsultasi dengan spesialis kandungan sebelum melakukan vaksinasi.

10. Apakah isi dari vaksin Havrix Junior dan apakah mengandung babi?

- a. Tidak terdapat jaringan dari babi di dalam komponen vaksin Havrix Junior. Berikut komponennya:
- b. Satu dosis (0,5 mL) Havrix 720 Junior mengandung: Virus Hepatitis A (dinonaktifkan) 1,2 720 Unit ELISA.
Diproduksi pada sel diploid manusia (MRC-5).
Diadsorpsi pada hidroksida aluminium, hidrasi 0,25 miligram Al₃+.
Eksipien/Bahan Tidak Aktif: Asam amino untuk injeksi, natrium fosfat dihidrat, kalium fosfat monobasi, polisorbitat 20, kalium klorida, natrium klorida, air untuk injeksi. Sulfat neomisin hadir sebagai sisa dari proses manufaktur.
- c. Vaksin Havrix Junior mengandung antibiotik neomisin sulfat.

11. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

12. Kapan saya harus vaksin sebelum rencana bepergian/terpapar HAV?

- a. Pada umumnya, kekebalan akan didapatkan 2 minggu setelah vaksinasi.

13. Durasi kekebalan?

- a. Setelah mendapatkan vaksin booster, vaksin Havrix Junior diperkirakan akan memberikan perlindungan terhadap hepatitis A selama kurang lebih 5 tahun. Namun, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai durasi perlindungan.

14. Apakah vaksin hepatitis A dapat diberikan kepada orang yang memiliki gangguan kekebalan (misalnya, orang yang menjalani hemodialisis atau orang dengan HIV)?

- a. Ya. Vaksin hepatitis A bersifat inaktif, sehingga tidak menimbulkan kontraindikasi vaksin bagi pasien dengan gangguan sistem imun. Namun efek perlindungannya mungkin tidak optimal, sehingga orang yang memiliki gangguan sistem imun mungkin memerlukan dosis vaksin yang lebih banyak. Silakan konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi.

15. Apa yang harus dilakukan jika dosis kedua (terakhir) vaksin hepatitis A terlambat?

- a. Jika Anda/pasien sudah melewati jadwal dosis kedua untuk vaksin Hepatitis A, sebaiknya segera lakukan vaksinasi dosis kedua. Meskipun dosis kedua terlambat, dosis pertama tidak perlu diulang.

16. Efek samping vaksin ini?

- a. Peristiwa yang paling sering dilaporkan terkait dengan vaksinasi hepatitis A tunggal adalah demam, reaksi di tempat suntikan, dan ruam.

17. Apakah saya harus cek antibodi hepatitis A sebelum dan sesudah vaksinasi ini?

- a. Tidak harus, tapi diperbolehkan, ya.

18. Saya memiliki riwayat alergi terhadap lateks, apakah bisa mendapatkan vaksin Havrix Junior?

- a. Jika pasien memiliki alergi terhadap lateks, konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi, atau lakukan vaksinasi di rumah sakit.

Vaksin Hepatitis B (Engerix B 20)

1. Apa itu vaksin Engerix B 20?

- a. Vaksin ENGERIX-B digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B.

2. Apa itu Hepatitis B?

- a. Hepatitis B merupakan penyakit hati kronik menular yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV) yang bisa menular melalui kontak dengan cairan tubuh pasien, transplantasi organ, persalinan, dan sebagainya.

3. Mengapa Engerix B 20 direkomendasikan?

- a. Vaksin Engerix B 20 direkomendasikan untuk pasien dewasa, terutama pada kelompok yang beresiko seperti: tenaga kesehatan, pasien dengan pasangan seksual lebih dari satu, pasien dengan kondisi imunokompromais, pasien dengan gangguan hati kronik dan pasien dengan gangguan ginjal kronik termasuk yang sedang hemodialisis, dan pengguna narkoba.

4. Kapan Engerix B 20 harus diberikan?

- a. Untuk pasien berusia 20 tahun ke atas: 3 dosis, masing-masing 1mL (20mcg). Dosis kedua diberikan 1 bulan setelah dosis pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama (interval 0, 1, 6 bulan).

Untuk pasien dengan kondisi tertentu (misalnya imunokompromais atau pasien hemodialisis): Total 8 dosis, yang meliputi 2 dosis (2 x 20mcg) yang diberikan pada setiap kali penyuntikan dengan interval 0, 1, 2 dan 6 bulan.

5. Bagaimana Engerix B 20 diberikan?

- a. Vaksin Engerix B 20 diberikan melalui suntikan intramuskular di otot lengan atas.

6. Siapa yang tidak boleh menerima Engerix B 20?

- a. Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi Engerix B 20:
 1. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang sedang mengalami demam atau infeksi akut yang parah.
 2. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan riwayat reaksi alergi berat yang diketahui (misalnya, anafilaksis) terhadap komponen Engerix B atau dari vaksin yang mengandung sel ragi.
 3. Hepatitis B memiliki periode inkubasi yang panjang. Engerix B 20 mungkin tidak mencegah infeksi hepatitis B pada pasien yang sudah mengalami infeksi hepatitis B yang tidak terdeteksi. Selain itu, vaksin ini mungkin tidak mencegah infeksi pada pasien yang tidak memiliki kadar antibodi pelindung yang cukup.

4. Bagi pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah seperti hemofilia atau trombositopenia, atau mengonsumsi obat antikoagulan seperti warfarin, disarankan untuk berkonsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi karena terdapat risiko pendarahan jika menerima suntikan ke dalam otot.
5. Apabila diperbolehkan oleh spesialis, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

7. Apakah Engerix B 20 mg dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Vaksin ENGERIX-B dapat diberikan secara bersamaan dengan vaksin immunoglobulin dengan suntikan dan situs injeksi yang berbeda.

8. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?

- a. Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter yang teregistrasi. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi.
- b. Konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.

9. Apakah Engerix B 20 aman untuk ibu hamil?

- a. Vaksin Engerix B 20 belum disarankan untuk ibu hamil dan menyusui, karena belum ada data penelitian yang cukup. Silakan konsultasi dengan spesialis kandungan sebelum melakukan vaksinasi, dan apabila diperbolehkan, harap melakukan vaksinasi di rumah sakit.

10. Apa efek samping umum dari Engerix B 20?

- a. Efek samping umum dapat meliputi: lemas, pusing, sakit kepala, demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$), kemerahan pada lokasi injeksi, pembengkakan pada lokasi injeksi. Efek samping serius seperti gangguan neurologis dan pencernaan sangat jarang terjadi.

11. Apakah orang dengan gangguan sistem imun seperti HIV boleh menerima vaksin ini?

- a. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) tidak dianggap sebagai kontraindikasi untuk vaksinasi hepatitis B, namun respon sistem imun yang diharapkan mungkin tidak optimal. Konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

12. Apakah diperlukan pemeriksaan khusus sebelum mendapatkan Vaksin Engerix B 20 mg?

- a. Pasien dewasa disarankan untuk melakukan pemeriksaan HBsAg terlebih dahulu.

1. Jika hasil negatif → boleh melakukan vaksinasi Engerix B jika lolos screening pra-vaksinasi.
2. Jika hasil reaktif/positif → Konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi.

13. Apakah boleh untuk vaksin tanpa melakukan pemeriksaan HBsAg terlebih dahulu?

- a. Vaksin Engerix B 20 tetap boleh diberikan jika pasien tidak mengetahui status infeksi Hepatitis B-nya. Seandainya pasien ternyata sudah terinfeksi Hepatitis B, Vaksin Engerix B 20 tidak akan membahayakan kondisi pasien, namun manfaat perlindungannya terhadap Hepatitis B akan berkurang.

14. Seberapa efektif vaksin Engerix B 20?

- a. Pada penelitian terhadap orang sehat yang mendapatkan vaksin Engerix B 20 mg, disebutkan bahwa 79% pasien akan mendapatkan kekebalan 5 bulan setelah dosis kedua, dan 96% 1 bulan setelah pemberian dosis terakhir Engerix B.
- b. Hepatitis B memiliki periode inkubasi yang panjang. Vaksin ENGERIX-B mungkin tidak mencegah infeksi hepatitis B pada pasien yang sudah mengalami infeksi hepatitis B yang tidak terdeteksi. Selain itu, vaksin ini mungkin tidak mencegah infeksi pada pasien yang tidak memiliki kadar antibodi pelindung yang cukup (contoh: pada pasien imunokompromais).

15. Apakah Vaksin Engerix B 20 Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?

- a. Pasien dengan status imunitas yang normal (bukan imunokompromais) tidak memerlukan booster tambahan setelah rangkaian vaksin hepatitis b selesai.

16. Apakah isi dari vaksin Engerix B 20 dan apakah mengandung babi?

- a. Tidak terdapat jaringan dari babi di dalam komponen vaksin Engerix B 20mg. Berikut kandungannya:
- b. Vaksin ENGERIX-B adalah suspensi steril dari HBsAg non infeksius untuk administrasi intramuskular. Ini mengandung antigen permukaan virus yang dimurnikan diperoleh dengan mengkultur sel *Saccharomyces cerevisiae* yang telah dimodifikasi secara genetik, yang membawa gen antigen permukaan virus hepatitis B. HBsAg yang diekspresikan dalam sel dimurnikan dan diformulasikan sebagai suspensi antigen yang diserap pada hidroksida aluminium. Prosedur yang digunakan untuk memproduksi ENGERIX-B menghasilkan produk yang mengandung tidak lebih dari 5% protein rasi.
- c. Setiap dosis mengandung HBsAg yang diserap pada sebagai hidroksida aluminium.
- d. Bahan tambahan/inaktif: Natrium klorida (8 mg/mL) dan penyangga fosfat (disodium phosphate dihydrate, 0,9 mg/mL; sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 0,7 mg/mL).

17. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

18. Saya memiliki riwayat alergi terhadap lateks, apakah bisa mendapatkan vaksin Engerix B?

- a. Jika Anda/pasien memiliki alergi terhadap lateks, disarankan untuk konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi, atau lakukan vaksinasi di rumah sakit.

19. Apakah Engerix B tersedia untuk anak?

- a. Saat ini, Halodoc hanya menyediakan Vaksin Engerix B 20 yang ditujukan untuk dewasa. Vaksin Engerix B untuk anak (10mcg) belum tersedia di Halodoc.

Vaksin Varicella (Varivax)

1. Apa itu vaksin Varivax?

- a. Varivax adalah vaksin yang melindungi dari virus varicella/cacar air.

2. Apa itu Varicella?

- a. Cacar Air atau *Varisela (Chickenpox)* merupakan infeksi primer dari virus *Varicella Zoster (VZV)*. Cacar air merupakan penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama yang belum mendapat imunisasi. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Cara penularan penyakit ini meliputi kontak langsung dengan penderita cacar air, paparan cairan dari penderita cacar air (keringat, bersin dan batuk), memegang atau menyentuh secara langsung atau tidak langsung barang-barang yang sebelumnya digunakan oleh penderita cacar air.
- b.

3. Mengapa Vaksin Varivax direkomendasikan?

- a. Vaksin Varicella (Varivax) memberikan perlindungan aktif terhadap virus varisela zoster untuk mencegah terjadinya cacar air/chicken pox yang dapat ditularkan melalui: kontak langsung dengan penderita cacar air, paparan cairan dari penderita cacar air (keringat, bersin dan batuk), memegang atau menyentuh secara langsung atau tidak langsung barang-barang yang sebelumnya digunakan oleh penderita cacar air.

4. Kapan Vaksin Varivax harus diberikan?

- a. Vaksin varisela (Varivax) dapat diberikan mulai usia 12 – 18 bulan.
- b. Untuk anak berusia 1 – 12 tahun: 2 dosis diberikan dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan antar dosis.
- c. Untuk anak berusia 13 tahun atau lebih: 2 dosis diberikan dengan interval 4 sampai 6 minggu antar dosis.
- d. Untuk pasien dewasa: 2 dosis diberikan dengan interval 4 minggu antar dosis, sesuai jadwal rekomendasi PAPDI.

5. Bagaimana Vaksin Varivax diberikan?

- a. Vaksin Varivax diberikan melalui suntikan subkutan di otot lengan atas atau paha.

6. Siapa yang tidak boleh menerima Vaksin Varivax?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi Varivax:

- a. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap setiap unsur dari produk ini, neomisin, dangelatin.
- b. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang sedang mengalami demam tinggi hamil atau infeksi akut berat.

- c. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kelainan darah atau jenis kanker ganas apapun termasuk leukimia dan limfoma yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh.
- d. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan terapi immunosupresif dosis tinggi kortikosteroid, gangguan kekebalan tubuh seperti HIV dan AIDS atau riwayat imunodefisiensi.
- e. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan tuberkulosis aktif yang tidak diobati.
- f. Tidak boleh diberikan belum sesuai dengan jadwal rekomendasi interval vaksin Varicella.
- g. Tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil. Vaksinasi sebaiknya dilakukan 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan.

7. Apakah Vaksin Varivax dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Ya, vaksin Varivax dapat diberikan bersamaan dengan vaksin virus hidup lainnya. Jika tidak diberikan bersamaan, harus ada interval minimal 1 bulan antara satu dosis vaksin virus campak yang dilemahkan secara hidup dan dosis vaksin Varivax.
- b. Untuk anak-anak hingga usia 12 tahun, harus ada interval minimal 3 bulan antara 2 dosis vaksin virus varisela yang dilemahkan secara hidup. Untuk pasien remaja dan dewasa, 2 dosis Varivax dapat diberikan dengan interval 1 bulan. Vaksin Varivax dapat diberikan bersamaan dengan M-M-R II, konjugat *Haemophilus influenzae* tipe b (konjugat protein meningokokus), dan hepatitis B (rekombinan). Selain itu, vaksin Varivax dapat diberikan bersamaan dengan vaksin difteri-tetanus yang diinaktivasi dan vaksin pertusis seluler.

8. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?

- a. Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter yang teregistrasi. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi.
- b. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.

9. Apakah Vaksin Varivax aman selama kehamilan?

- a. Vaksin Varivax tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil.
- b. Vaksinasi sebaiknya dilakukan 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan.

10. Apakah Vaksin Varivax aman selama menyusui?

Vaksin Varivax hanya boleh diberikan pada ibu menyusui jika hanya diperlukan. Konsultasi dengan spesialis kandungan sebelum melakukan

vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

11. Apa efek samping umum dari Vaksin Varivax?

- a. Efek samping sangat umum: demam, nyeri di tempat suntikan, kemerahan dan bengkak.
- b. Efek samping cukup umum: infeksi saluran napas atas, iritabilitas, ruam seperti varicella, gatal di lokasi suntikan.

12. Apakah orang dengan gangguan sistem imun seperti HIV boleh menerima vaksin ini?

- a. Bagi pasien dengan gangguan imun (seperti HIV, sedang mendapat terapi penekan imun, dsb) konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

13. Berapa lama kekebalan berlangsung setelah mendapatkan vaksin Vaksin Varivax?

- a. Pada umumnya, perlindungan akan didapatkan 6 minggu setelah vaksinasi dosis pertama.

14. Apakah Vaksin Varivax Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?

- a. Kekebalan dapat bertahan lama dan mungkin permanen pada sebagian besar penerima vaksin. Durasi kekebalan dapat bervariasi tergantung pasien dan jumlah vaksin yang sudah diterima. Infeksi cacar air dan lesi pada pasien yang sudah divaksinasi umumnya lebih ringan daripada infeksi pada orang yang tidak divaksinasi.

15. Apakah isi dari Vaksin Varivax dan apakah mengandung babi?

- a. Vaksin Varivax belum mencantumkan logo Halal pada kemasannya. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (halal.go.id).
- b. Berikut kandungan vaksin Varivax:
- c. Vaksin Varivax adalah virus varisela yang hidup dan dilemahkan, yaitu strain Oka/Merck. Virus ini awalnya diperoleh dari seorang anak yang mengalami varisela tipe liar, kemudian dimasukkan ke dalam kultur sel embrio paru-paru manusia, diadaptasi dan diperbanyak dalam kultur sel embrio guinea pig, dan akhirnya diperbanyak dalam kultur sel diploid manusia (WI-38). Vaksin varisela hidup dan dilemahkan ini merupakan persiapan liofilisasi yang mengandung sukrosa, fosfat, glutamat, dan gelatin yang diolah sebagai penstabil. Setiap dosis sekitar 0,5 mL mengandung setidaknya 1350 unit pembentuk plak (PFU) dari virus varisela Oka/Merck ketika direkonstitusi dan disimpan pada suhu ruangan selama maksimal 30 menit. Setiap dosis sekitar 0,5 mL juga mengandung sekitar 24 mg sukrosa, 12,0 mg gelatin yang dihidrolisis, 3,1 mg natrium klorida, 0,5 mg monosodium L-glutamat, 0,44

mg natrium fosfat dibasik, 0,08 mg kalium fosfat monobasik, dan 0,08 mg kalium klorida. Produk ini juga mengandung komponen residu sel MRC-5, termasuk DNA dan protein, serta jumlah jejak natrium fosfat monobasik, EDTA, neomisin, dan serum janin bovine. Produk ini tidak mengandung pengawet.

d.

16. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

b.

17. Apakah Vaksin Varivax tersedia untuk anak & dewasa?

- a. Vaksin varisela (Varivax) dapat diberikan mulai usia 12 – 18 bulan.
- b. Untuk pasien berusia 1 – 12 tahun: 2 dosis diberikan dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan antar dosis.
- c. Untuk pasien berusia 13 tahun atau lebih: 2 dosis diberikan dengan interval 4 sampai 6 minggu antar dosis.
- d. Untuk pasien dewasa: 2 dosis diberikan dengan interval 4 minggu, sesuai jadwal rekomendasi PAPDI.

Vaksin DTap - Hib - HB - Polio IPV (Hexaxim)

1. Apa itu vaksin Hexaxim?

- Hexaxim adalah vaksin DTP kombinasi DTaP-IPV-HB-Hib yang melindungi dari penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, poliomyelitis dan penyakit-penyakit serius yang disebabkan oleh Haemophilus influenzae tipe B.

2. Apa itu Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B, Poliomieltitis, dan Haemophilus Influenzae tipe B?

- Difteri adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae yang mempengaruhi pernapasan. Gejala awal termasuk sakit tenggorokan, demam ringan, dan pembengkakan kelenjar. Saat penyakit berkembang, membran abu-abu dapat terbentuk di tenggorokan, menyebabkan kesulitan bernapas dan bisa berkomplikasi melibatkan masalah jantung, saraf, hingga kematian.
- Tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, yang bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka atau sayatan. Gejala termasuk kekakuan otot, kram rahang (lockjaw), kesulitan menelan, dan demam. Komplikasi parah dapat mencakup patah tulang, kesulitan bernapas, hingga kematian.
- Pertusis (Batuk Rejan/batuk 100 hari) adalah penyakit pernapasan yang sangat menular yang disebabkan oleh Bordetella pertussis. Gejala awal menyerupai pilek biasa, tetapi berkembang menjadi serangan batuk yang parah, sering terdengar suara "bersiul" (whooping) saat batuk. Komplikasi mencakup pneumonia, kejang, penurunan berat badan, hingga kematian.
- Hepatitis B merupakan penyakit hati kronik menular yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV) yang bisa menular melalui kontak dengan cairan tubuh pasien, transplantasi organ, persalinan, dan sebagainya.
- Haemophilus Influenza Tipe B adalah infeksi bakteri serius yang dapat menyebabkan meningitis (peradangan pada lapisan luar otak), yaitu penyakit yang dapat mengakibatkan kerusakan otak, tuli, epilepsi, atau kebutaan sebagian. Infeksi ini juga dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan tenggorokan, yang dapat menyulitkan dalam menelan dan bernapas, serta dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh seperti darah, paru-paru, kulit, tulang, dan sendi.

3. Apakah Vaksin Hib sama dengan Vaksin Influenza?

- Tidak. Vaksin Hib ditujukan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh kuman Hib, yang dapat menyebabkan radang otak (meningitis), radang paru (pneumonia), infeksi telinga (otitis media) dan lain lain.

4. Setelah divaksinasi Hib yang dapat mencegah meningitis dan pneumonia, apakah tidak perlu divaksin pneumokokus ?

- Pasien sebaiknya mendapatkan vaksin Hib dan Pneumokokus sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan. Vaksin Hib hanya dapat mencegah meningitis (radang otak) dan pneumonia (radang paru) yang disebabkan oleh kuman Hib. Sedangkan meningitis dan pneumonia yang disebabkan oleh kuman Pneumokokus yang hanya dapat dicegah oleh vaksin Pneumokokus.

5. Mengapa Vaksin Hexaxim direkomendasikan?

- Hexaxim (Vaksin Combo) direkomendasikan sebagai perlindungan dari penyakit difteri, tetanus, dan pertusis, serta untuk mencegah penyakit ini terjadi kembali terutama bagi remaja dan orang dewasa yang sudah lebih mendapatkan vaksin DTP lebih dari 5 tahun yang lalu.
- Vaksin DTP Combo terdiri dari Vaksin DTP, Polio IPV, Hib, dan Hepatitis B. Vaksin DTP mencegah Difteri, Tetanus, dan Pertusis. Difteri, (*Corynebacterium diphtheriae*) dapat mempengaruhi pernapasan dengan membentuk selaput yang menutup jalan napas dan menyebarkan toksin sehingga menyebabkan kematian. Tetanus, (bakteri *Clostridium tetani*), yang bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka atau sayatan dapat menyebabkan kesulitan menelan, dan demam, kejang dan kekakuan seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Pertusis yang disebabkan oleh *Bordetella pertussis* memiliki gejala batuk rejan (whooping) yang terus-menerus dan tidak kunjung sembuh. Vaksin Hib mencegah infeksi *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib), salah satu bakteri penyebab radang selaput otak (meningitis), radang paru (pneumonia), dan infeksi telinga (otitis media) pada bayi dan anak. Hepatitis B merupakan penyakit hati kronik menular yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV).

6. Kapan waktu yang disarankan untuk pemberian vaksin hexaxim?

- Vaksinasi primer Hexaxim
 - i. Untuk pasien anak: 3 dosis yang diberikan pada usia 2, 3, 4 bulan atau usia 2, 4, 6 bulan, sesuai rekomendasi IDAI



Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 Tahun

Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2023

Vaksin	Umur																											
	Bulan												Tahun															
	Lahir	1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hepatitis B	0		1	2	3						4																	
Polio	0	1	2	3							4																	
BCG	1																											
DTP			1	2	3						4					5					td / Tdap							
Hib			1	2	3						4										td / Tdap							

- Suntikan tambahan (booster)
 - i. 1 dosis 0,5ml Booster pertama di usia 18 bulan dan booster berikutnya diberikan pada usia 5 – 7 tahun.

7. Bagaimana jika ada dosis yang terlewat sebelumnya?

- Bisa dilakukan catch up imunisasi (tanyakan terakhir dosis ke berapa, saat pemberian itu usia pasien berapa, dan saat ini usia pasiennya berapa. Lalu konsulkan ke dokter)

8. Bagaimana Vaksin Hexaxim diberikan?

- Vaksin Hexaxim diberikan melalui suntikan intramuskular di otot lengan atas atau paha.

9. Siapa yang tidak boleh menerima Vaksin Hexaxim?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi Hexaxim:

- Tidak boleh diberikan kepada pasien yang pernah mengalami reaksi hipersensitivitas (termasuk anafilaksis) setelah pemberian vaksin Hexaxim, baik terhadap bahan aktif maupun inaktifnya seperti: Glutaraldehyde, formaldehyde, neomycin, streptomycin, atau polymyxin B
- Tidak boleh diberikan kepada pasien yang sudah mendapatkan vaksin Hexaxim primer atau vaksin lain yang mengandung difteri, tetanus, pertussis, polio, hepatitis B, atau Hib.
- Tidak boleh diberikan kepada pasien yang mengalami reaksi parah yang mempengaruhi otak (ensefalopati) 7 hari setelah dosis vaksin pertusis (baik pertusis seluler maupun pertusis aseluler).
- Tidak boleh diberikan kepada pasien yang mengalami kondisi tidak terkontrol atau penyakit parah yang mempengaruhi otak dan sistem saraf atau epilepsi yang tidak terkontrol.
- Vaksin Hexaxim mengandung 85 mikrogram fenilalanin dalam setiap dosis 0,5 mL. Fenilalanin dapat berbahaya jika pasien memiliki fenilketonuria (PKU).
- Meski jarang terjadi, pastikan memiliki akses yang mudah ke perawatan medis untuk berjaga-jaga dari reaksi anafilaktik.
- Tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat sindrom Guillain-Barré atau neuritis brakialis setelah mendapatkan vaksin yang mengandung toksoid tetanus. Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
- Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan sistem imun, baik sedang menjalani pengobatan yang menekan sistem kekebalan tubuh atau memiliki kondisi imunodefisiensi, dapat menyebabkan respons imun berkurang (termasuk HIV/AIDS). Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
- Tidak boleh diberikan kepada pasien gagal ginjal kronis atau kegagalan ginjal, pasien yang memiliki riwayat penyakit otak atau epilepsi yang belum terdiagnosis atau tidak terkontrol, memiliki kelainan darah yang menyebabkan mudah memar atau berdarah lama setelah luka kecil.

Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

10. Apakah Vaksin Hexaxim dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- Ya, vaksin Hexaxim dapat diberikan bersamaan dengan vaksin pneumokokal, MMR, Meningococcal, dan rotavirus dengan lokasi injeksi yang berbeda

11. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?

- Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter yang teregistrasi. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi.
- Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk pasien dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.

12. Apakah Vaksin Hexaxim aman selama kehamilan & menyusui?

- Vaksin Hexaxim tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau menyusui.

13. Apa efek samping umum dari Vaksin Hexaxim?

- Efek samping yang sangat umum: nafsu makan menurun, iritabilitas, lemas, mengantuk, muntah, nyeri, kemerahan, atau pembengkakan di tempat suntikan, demam (suhu 38°C - 39,5°C)
- Efek samping cukup umum: Diare dan pembengkakan pada lokasi suntikan.

14. Apakah orang dengan gangguan sistem imun seperti HIV boleh menerima vaksin ini?

- Pasien dengan gangguan sistem imun (seperti HIV/AIDS), baik yang sedang menjalani pengobatan yang menekan sistem kekebalan tubuh atau memiliki kondisi imunodefisiensi, mungkin tidak mendapatkan reaksi sistem imun yang diharapkan secara optimal. Konsultasi dengan spesialis penyakit dalam sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.

15. Apakah Vaksin Hexaxim Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?

- Durasi kekebalan dapat bervariasi tergantung pasien dan jumlah vaksin yang sudah diterima.

16. Apakah isi dari Vaksin Hexaxim dan apakah mengandung babi?

- Vaksin Hexaxim belum mencantumkan logo Halal pada kemasannya. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (halal.go.id).
- Berikut kandungan vaksin Hexaxim:
- Tiap dosis 0.5 mL mengandung:
 - i. Toksin inaktif Difteri
 - ii. Toksin inaktif Tetanus

- iii. Antigen Bordetella pertusis (Toksoid Pertusis, Hemagglutinin filamen)
- iv. Virus polio inaktif (dilemahkan) Tipe 1, 2, 3
- v. Antigen permukaan hepatitis B
- vi. Polisakarida Haemophilus influenza tipe B
- vii. Protein Tetanus terkonjugasi
- viii. Mungkin komponen berikut : Glutaraldehida, formaldehida, streptomisin, neomisin, polimiksin B, disodium hydrogen fosfat, potassium dihidrogen fosfat, trometamol, sukrosa, L-fenilalanin

○

17. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu, untuk mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, maka sulit untuk mengkonfirmasi adanya alergi potensial. Dokter kami akan tetap berada selama sesi pasca vaksinasi untuk menangani reaksi alergi bila ada. Belum ada tes alergi vaksin di Halodoc.

18. Apakah Vaksin Hexaxim tersedia untuk dewasa?

- Saat ini, vaksin Hexaxim diprioritaskan untuk bayi dan anak.

Vaksin MMR (M-M-R II)

1. Apa itu vaksin M-M-R II?

- a. Vaksin M-M-R II adalah vaksin yang mengandung gabungan dari tiga virus (Mumps/Gondongan, Measles/Campak, dan Rubella) yang sebelumnya sudah dilemahkan.

2. Apa itu Mumps, Measles, Rubella?

- a. Mumps/Gondongan adalah sebuah yang disebabkan oleh virus dan dapat menyebabkan radang pada kelenjar. Gejala utama dari gondongan adalah pembengkakan pada area pipi dan rahang yang terjadi karena adanya pembengkakan pada kelenjar air ludah atau kelenjar parotis yang berada di bawah telinga. Gejala lain adalah: demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, hingga kehilangan nafsu makan. Virus ini dapat beresiko menyebabkan kemandulan pada laki-laki.
- b. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular, ditandai dengan ruam kulit di seluruh tubuh dan gejala seperti flu. Penyakit ini menular dari percikan air liur. Gejala awal infeksi campak biasanya berupa batuk berdahak, pilek, demam tinggi dan mata merah, bintik-bintik koplik (bintik-bintik merah kecil dengan pusat biru-putih). Ruam kemunculan bercak ini dari belakang telinga, sekitar kepala, kemudian ke leher. Pada akhirnya, ruam akan menyebar ke seluruh tubuh.
- c. Rubella/campak jerman adalah penyakit menular yang terjadi akibat infeksi virus. Gejala umum pada rubella adalah sakit kepala, iritasi ringan pada mata, demam, hidung tersumbat, ruam berbentuk bintik-bintik kemerahan muncul di sekitar kulit wajah, kemudian menyebar ke badan, tangan dan kaki, dan rasa nyeri pada sendi. Wanita hamil dengan usia kehamilan di bawah 5 bulan harus lebih waspada terhadap penyakit ini karena dapat menimbulkan sindrom rubella kongenital yang bisa berdampak pada bayi setelah kelahiran.

3. Mengapa Vaksin M-M-R II direkomendasikan?

- a. Vaksin M-M-R II direkomendasikan karena membantu merangsang sistem imunitas tubuh yang diharapkan dapat melindungi Anda dan anak dengan membuat antibodi yang efektif untuk melawan penyakit campak, rubella, dan gondongan.

4. Kapan waktu yang disarankan untuk pemberian Vaksin M-M-R II?

- a. Untuk pasien anak: 2 dosis, diberikan pada usia 15-18 bulan dan 5-7 tahun. Jika hingga 12 bulan belum menerima vaksin MR dapat diberikan mulai 12-15 bulan dan 5-7 tahun.

- b. Dewasa: 1 dosis, atau 2 dosis dengan interval 28 hari. Jika di masa kanak-kanak sudah mendapatkan vaksin ini, diberikan 1 dosis. Jika belum pernah mendapatkan vaksin ini, diberikan 2 dosis.

5. Bagaimana Vaksin M-M-R II diberikan?

- a. Vaksin M-M-R II diberikan melalui suntikan intramuskular/subkutan di otot/lemak lengan atas atau paha.

6. Siapa yang tidak boleh menerima Vaksin M-M-R II?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi M-M-R II:

- a. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap komponen aktif atau pada salah satu komponen tambahan pada vaksin, termasuk neomisin.
- b. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif setelah menerima vaksin MR/MMR sebelumnya.
- c. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan imunodefisiensi atau immunosupresi akibat penyakit atau terapi medis.
- d. Tidak boleh diberikan kepada pengidap penyakit Tuberkulosis tidak terkontrol.
- e. Tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau wanita yang merencanakan kehamilan 1 bulan setelah vaksin.
- f. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang sedang mengalami demam atau infeksi yang parah.
- g. Tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang pernah mengalami kejang demam sebelumnya dan anak-anak yang memiliki riwayat kejang demam dalam keluarga. Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
- h. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan riwayat reaksi anafilaktik setelah konsumsi telur. Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
- i. Tidak boleh diberikan kepada anak dengan trombositopenia atau pada anak yang mengalami trombositopenia setelah vaksinasi dengan dosis vaksin M-M-R II sebelumnya. Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, lakukan vaksinasi di rumah.
- j. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan riwayat keluarga dengan defisiensi imun bawaan atau keturunan. Konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, lakukan vaksinasi di rumah.
- k. Immunoglobulin (IG) dan produk darah lainnya tidak boleh diberikan bersamaan dengan vaksin MMR II.

7. Apakah Vaksin M-M-R II dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Vaksin M-M-R II dapat diberikan bersamaan dengan vaksin virus hidup lainnya. Jika tidak diberikan bersamaan, vaksin M-M-R II sebaiknya diberikan satu bulan sebelum atau satu bulan setelah pemberian vaksin virus hidup lainnya.
- 8. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?**
 - a. Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter yang teregistrasi. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi.
 - b. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.
- 9. Apakah Vaksin M-M-R II aman selama kehamilan?**
 - a. Vaksin M-M-R II tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil.
 - b. Tidak boleh diberikan kepada wanita yang merencanakan kehamilan 1 bulan setelah vaksinasi.
- 10. Apakah Vaksin M-M-R II aman selama menyusui?**
 - a. Vaksin M-M-R II tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau menyusui.
- 11. Apa efek samping umum dari Vaksin M-M-R II?**
 - a. Efek samping sangat umum: demam, kemerahan, nyeri, pembengkakan di lokasi injeksi
 - b. Efek samping cukup umum: pendarahan, gatal di lokasi injeksi
- 12. Apakah orang dengan gangguan sistem imun seperti HIV boleh menerima vaksin ini?**
 - a. Bagi pasien dengan imunodefisiensi atau imunosupresi akibat penyakit atau terapi medis, atau riwayat keluarga dengan defisiensi imun bawaan atau keturunan, konsultasi dengan spesialis anak sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
- 13. Berapa lama kekebalan berlangsung setelah mendapatkan vaksin Vaksin M-M-R II?**
 - a. Pada umumnya, kekebalan akan didapatkan 6 minggu setelah vaksinasi.
- 14. Apakah Vaksin M-M-R II Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?**
 - a. Vaksin MMR sangat efektif (94-98%) melindungi seseorang dari penyakit campak, gondongan, dan rubella, serta mencegah komplikasi yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Orang yang menerima vaksinasi MMR sesuai jadwal vaksinasi yang ditetapkan biasanya dianggap terlindungi seumur hidup dari campak dan rubella.
- 15. Apakah isi dari Vaksin M-M-R II dan apakah mengandung babi?**

- a. Vaksin M-M-R II belum mencantumkan logo Halal pada kemasannya. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (halal.go.id).
- b. Berikut komponen yang terkandung di dalam vaksin M-M-R II:
- c. Mengandung 3,0 log₁₀ TCID₅₀ virus campak; 4.1 log₁₀ TCID₅₀ virus *mumps*; dan 3,0 log₁₀ TCID₅₀ virus rubella. (14,5 mg), sukrosa (1,9 mg), *porcine hydrolyzed gelatin* (14,5 mg), albumin manusia rekombinan ($\leq 0,3$ mg), serum janin sapi (<1 ppm), sekitar 25 mcg neomisin,
- d. Vaksin mengandung materi yang terkait dengan *porcine hydrolyzed gelatin* adalah polipeptida yang diperoleh dengan cara hidrolisis parsial kolagen yang berasal dari kulit dan tulang babi. Gelatin merupakan komponen penting untuk pembuatan vaksin. Tidak ada bukti bahwa keberadaan *porcine hydrolyzed gelatin* menimbulkan risiko keamanan.

16. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

17. Apakah Vaksin M-M-R II tersedia untuk anak & dewasa?

- a. Vaksin M-M-R II diberikan dalam 2 dosis pada usia 15-18 bulan dan 5-7 tahun. Jika hingga 12 bulan belum menerima vaksin MR, dapat diberikan pada usia 12-15 bulan dan 5-7 tahun.
- b. Untuk pasien dewasa yang belum pernah mendapatkan vaksin M-M-R II: 2 dosis diberikan dengan dengan interval 28 hari.
- c. Untuk pasien dewasa yang sudah mendapatkan vaksin MR/MMR sebelumnya: 1 dosis.

Vaksin Dengue (QDenga)

1. Apa itu vaksin QDenga?

- a. QDENGGA merupakan jenis vaksin dengue tetravalen yang terdiri atas 4 strain Virus Dengue rekombinan yang dilemahkan yang dapat melindungi tubuh dari infeksi demam dengue/demam berdarah dengue.

2. Apa itu Demam Dengue/Demam Berdarah Dengue?

- a. Virus Dengue ditularkan oleh nyamuk dengan gejala sakit kepala, nyeri otot, tulang, atau sendi, mual, muntah, ruam perdarahan, syok/renjatan akibat rembesan cairan dalam tubuh hingga kematian. Perjalanan gejala penyakit ini menyerupai pelana kuda yang mana hal tersebut merupakan sebutan bagi tiga fase demam yang bergerak naik turun pada pasien dengue. Siklus ini terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase demam tinggi, fase kritis, dan fase penyembuhan. Diketahui terdapat 4 strain virus dengue yang dapat menyebabkan penyakit tersebut.

3. Mengapa Vaksin QDenga direkomendasikan?

- a. Indonesia termasuk negara hiperendemis untuk dengue dan dapat menyerang siapa saja. Vaksin Dengue (QDenga) dapat melindungi tubuh dari 4 strain virus dengue yang dapat menyebabkan demam, perdarahan, syok/renjatan akibat rembesan cairan dalam tubuh hingga kematian.

4. Kapan sebaiknya vaksin QDenga diberikan?

- a. Untuk pasien anak berusia 6 - 18 tahun: 2 dosis diberikan dengan interval 3 bulan.
- b. Untuk pasien dewasa berusia 18 - 45 tahun: 2 dosis diberikan dengan interval 3 bulan.

5. Bagaimana Vaksin QDenga diberikan?

- a. Vaksin Qdenga diberikan melalui suntikan subkutan di otot lengan atas.

6. Siapa yang tidak boleh menerima QDenga?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi QDenga:

- a. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap komponen aktif atau pada salah satu komponen tambahan pada vaksin (alfa-alfa Trehalose dihydrate, Poloxamer 407, Human serum albumin, Potassium dihydrogen phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Potassium chloride, Sodium chloride).
- b. Dosis lanjutan vaksin QDenga tidak boleh diberikan jika pasien hipersensitif terhadap dosis pertama..
- c. Tidak boleh diberikan kepada pasien yang sedang mengalami demam tinggi atau infeksi akut berat.
- d. Tidak boleh diberikan kepada pasien berusia usia dibawah 6 tahun dan diatas 45 tahun.

- e. Tidak boleh diberikan kepada pasien HIV simptomatik dan asimtomatik.
- f. Tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau menyusui.
- g. Tidak boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan defisiensi imun bawaan, gangguan imunologi termasuk pengobatan kemoterapi dan pengobatan immunosupresan (seperti kortikosteroid dosis tinggi selama 14 hari atau lebih).
- h. Peraturan pemberian vaksin QDenga terhadap pasien dengan gangguan ginjal dan hati belum diketahui. Konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi. Jika diperbolehkan, disarankan untuk melakukan vaksinasi di rumah sakit.
- i. Reaksi yang berhubungan dengan kecemasan, termasuk reaksi vasovagal (sinkop), hiperventilasi atau reaksi yang berhubungan dengan stres dapat terjadi sehubungan dengan vaksinasi sebagai respons psikogenik terhadap suntikan jarum. Penting untuk melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari cedera pingsan. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang merawat (Sp.PD/Sp.A), jika diperbolehkan, silahkan melakukan vaksinasi di rumah sakit.

7. Apakah Vaksin QDenga dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Qdenga® dapat diberikan pada saat yang sama dengan vaksin injeksi lain, vaksin harus selalu diberikan di lokasi suntikan yang berbeda.
- b. Qdenga® dapat diberikan secara bersamaan dengan vaksin hepatitis A pada orang dewasa.
- c. Qdenga® dapat diberikan secara bersamaan dengan vaksin demam kuning pada orang dewasa. Namun, respon antibodi dengue menurun setelah pemberian bersama Qdenga® dan vaksin demam kuning 17D. Signifikansi klinis temuan ini tidak diketahui.

8. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?

- a. Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter yang teregistrasi. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi.
- b. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.

9. Apakah Vaksin QDenga aman selama kehamilan?

- a. Vaksin QDenga tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau wanita yang merencanakan kehamilan 1 bulan setelah divaksinasi.

10. Apakah Vaksin QDenga aman selama menyusui?

- a. Vaksin QDenga tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau menyusui.

11. Apa efek samping umum dari Vaksin QDenga?

- a. Efek samping sangat umum: ISPA, nyeri kepala, nyeri otot, demam, kemerahan, nyeri, pembengkakan di lokasi injeksi.
- b. Efek samping cukup umum: Nasofaringitis, nyeri sendi, bengkak di lokasi suntikan, memar di lokasi suntikan, gatal di lokasi suntikan, gejala flu.

12. Apakah pasien dengan kondisi khusus seperti HIV, kanker, trombositopenia, transplant organ, penyakit ginjal berat, gangguan imun lainnya (cacat genetik, disfungsi limpa kongenital/acquired), sindroma nefrotik, lainnya) dan pasien dengan kondisi kronis lainnya boleh menerima vaksin ini?

- a. Pasien dengan kondisi khusus seperti ini terutama yang berat mungkin dapat mengalami penurunan respons antibodi terhadap imunisasi aktif. Vaksinasi sebaiknya dipertimbangkan secara individual, tergantung pada kondisi saat ini dan faktor-faktor lainnya. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.
- b. Pasien yang sedang menerima pengobatan dengan imunoglobulin atau produk darah yang mengandung imunoglobulin, seperti darah atau plasma, disarankan untuk menunggu setidaknya 6 minggu, atau lebih baik 3 bulan, setelah berakhirnya pengobatan sebelum mendapatkan vaksin Qdenga®, untuk menghindari netralisasi virus yang dilemahkan yang terkandung dalam vaksin.
- c. Qdenga® tidak boleh diberikan kepada pasien yang menerima terapi immunosupresif seperti kemoterapi atau dosis tinggi kortikosteroid sistemik dalam 4 minggu sebelum vaksinasi.

13. Berapa lama kekebalan berlangsung setelah mendapatkan vaksin Vaksin QDenga?

- a. Berdasarkan hasil studi, vaksin QDenga dapat menurunkan angka kesakitan terhadap virus dengue dalam waktu 30 hari setelah vaksinasi dosis kedua.

14. Apakah Vaksin QDenga Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?

- a. Berdasarkan studi saat ini, Qdenga efektif memberikan perlindungan hingga 3 tahun setelah vaksinasi dosis kedua. Namun, saat ini belum ada rekomendasi untuk booster/pengulangan dosis jika vaksinasi dengue sudah lengkap.

15. Jika saya sudah pernah sakit demam berdarah, apakah masih memerlukan vaksin QDenga?

- a. Jika Anda sudah pernah terjangkit penyakit demam dengue, kemungkinan Anda hanya terinfeksi 1 jenis virus saja. Vaksinasi QDenga tetap diperlukan untuk mendapatkan perlindungan dari 3 jenis virus dengue lainnya.

16. Apakah isi dari Vaksin QDenga dan apakah mengandung babi?

- a. Qdenga® belum mencantumkan logo Halal padaemasannya. Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (halal.go.id).
- b. Berikut komponen yang terkandung di dalam vaksin QDenga:
- c. Bahan Aktif:
 - i. Virus dengue tipe 1, 2, 3, dan 4 yang dilemahkan
- d. Bahan Inaktif:
 - i. α,α -Trehalose dihydrate
 - ii. Poloxamer 407
 - iii. Human serum albumin
 - iv. Potassium dihydrogen phosphate
 - v. Disodium hydrogen phosphate
 - vi. Potassium chloride
 - vii. Sodium chloride
 - viii. Pelarut (Pelarut):
 - ix. Sodium chloride
 - x. Water for injections (Air untuk injeksi)
- e.

17. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

18. Apakah Vaksin QDenga tersedia untuk anak & dewasa?

- a. Untuk pasien anak berusia 6 - 18 tahun: 2 dosis diberikan dengan interval 3 bulan.
- b. Untuk pasien dewasa berusia 18 - 45 tahun: 2 dosis diberikan dengan interval 3 bulan.

Vaksin Meningokokus (Menivax)

1. Apa itu vaksin Menivax ACYW?

- a. Menivax ACYW merupakan jenis vaksin Meningokokus Polisakarida yang mengandung antigen kapsular polisakarida yang dimurnikan dengan ekstrak dari kultur *Neisseria Meningitidis* grup A, grup C, grup W-135, dan grup Y yang bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terjadi akibat *Neisseria Meningitidis* grup A, C W, Y seperti meningitis.

2. Apa itu Meningitis?

- a. Meningitis adalah penyakit yang terjadi karena ada peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama meningen. Selaput ini merupakan lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang yang ditandai dengan adanya demam, nyeri kepala hebat, kaku leher, mual, muntah, sensitif terhadap sinar (fotofobia) dan penurunan kesadaran hingga dapat menyebabkan kematian.

3. Mengapa Vaksin Menivax direkomendasikan?

- a. Meningokok merupakan penyebab meningitis tersering terbanyak pada anak dan penyebab kedua tersering terbanyak pada dewasa.
- b. Insiden penyakit meningokok bervariasi di berbagai wilayah dunia, wilayah Sub-Sahara Afrika yang dikenal dengan sebutan “Meningitis Belt” yang terdiri dari 26 negara adalah wilayah dimana epidemi terjadi secara periodik setiap 8-10 tahun.
- c. Vaksin ini dapat diberikan pada orang yang mempunyai resiko tinggi seperti:
 - i. Orang yang tinggal di asrama
 - ii. Tentara yang bertugas di daerah endemis
 - iii. Wisatawan yang bepergian ke daerah hiperendemik dan epidemi seperti Afrika
 - iv. Orang yang pergi ke Mekah, Arab Saudi untuk ibadah haji, umrah, dan tenaga kerja
 - v. Orang dengan defisiensi komponen komplemen, asplenia fungsional atau anatomik, orang dengan gangguan sistem imun
 - vi. Ahli mikrobiologi yang secara rutin terpapar isolat *N. Meningitidis*

4. Kapan sebaiknya vaksin Menivax diberikan?

- a. Dapat diberikan untuk anak usia > 2 tahun hingga dewasa
- b. Vaksinasi ulang dibutuhkan untuk individu yang beresiko tinggi terkena infeksi
- c. Dapat diulang setelah 2 tahun dari vaksin sebelumnya

5. Bagaimana Vaksin Menivax diberikan?

- a. Vaksin Menivax ACYW diberikan secara injeksi subkutan tunggal 0,5 mL pada bagian lengan atas

6. Siapa yang tidak boleh menerima Menivax?

Berikut yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi Menivax ACYW:

- a. Tidak boleh diberikan pada orang dengan:
 - i. Hipersensitif terhadap komponen aktif atau pada salah satu komponen tambahan pada vaksin termasuk neomisin.
 - ii. Orang dengan hipersensitif dan/atau reaksi anafilaksis setelah menerima vaksin MENIVAX ACYW sebelumnya.
 - iii. Orang dengan pernah mengidap epilepsi, penyakit otak sebelumnya.
 - iv. Orang dengan pernah atau sedang mengidap penyakit ginjal, TBC aktif, dan infeksi HIV.
 - v. Ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan dalam waktu 3 bulan setelah vaksin.
 - vi. Pemberian vaksin MENIVAX ACYW seharusnya ditunda pada individu yang menderita demam atau infeksi yang parah.
- b. Reaksi yang berhubungan dengan kecemasan, termasuk reaksi vasovagal (sinkop), hiperventilasi atau reaksi yang berhubungan dengan stres dapat terjadi sehubungan dengan vaksinasi sebagai respons psikogenik terhadap suntikan jarum. Penting untuk melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari cedera pingsan. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang merawat (Sp.PD/Sp.A), jika diperbolehkan, silahkan melakukan vaksinasi di rumah sakit.

7. Apakah Vaksin Menivax dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lain?

- a. Vaksin MENIVAX ACYW tidak boleh diberikan bersamaan dengan vaksin whole cell pertusis atau whole cell typhoid dikarenakan kombinasi kandungan endotoxin.

8. Bagaimana penentuan kelayakan vaksinasi dilakukan? Apa saya bisa menerima vaksin ini?

- a. Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter yang teregistrasi. Pasien akan menjalani skrining oleh admin via WhatsApp dan oleh staf medis di lokasi pasien sebelum tindakan vaksinasi.
- b. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk anak) sebelum melakukan vaksinasi.

9. Apakah Vaksin Menivax aman selama kehamilan?

- a. Vaksin Menivax ACYW tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang hamil atau wanita yang merencanakan kehamilan 3 bulan setelah divaksinasi.

10. Apakah Vaksin Menivax aman selama menyusui?

- a. Vaksin Menivax ACWY pada ibu menyusui harus diperhatikan karena tidak diketahui apakah vaksin ini diekskresi melalui Air Susu Ibu (ASI) Silahkan

konsultasikan kepada Sp.A, atau dokter spesialis yang merawat pasien. Jika diperbolehkan, silahkan lakukan vaksinasi di rumah sakit.

11. Apa efek samping umum dari Vaksin Menivax?

- a. Efek samping yang sering muncul berupa nyeri pada lokasi suntikan, kemerahan, bengkak, demam yang dapat berkurang secara spontan
- b. Efek samping lain yang mungkin dapat timbul: skleroma, gatal, bintik merah pada kulit, alergi, Sindrom Stevens-Johnson.

12. Apakah pasien dengan kondisi khusus seperti HIV, kanker, trombositopenia, transplant organ, penyakit ginjal berat, gangguan imun lainnya (cacat genetik, disfungsi limpa kongenital/acquired), sindroma nefrotik, lainnya) dan pasien dengan kondisi kronis lainnya boleh menerima vaksin ini?

- a. Pasien dengan kondisi khusus seperti ini terutama yang berat mungkin dapat mengalami penurunan respons antibodi terhadap imunisasi aktif. Vaksinasi sebaiknya dipertimbangkan secara individual, tergantung pada kondisi saat ini dan faktor-faktor lainnya. Bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, konsultasi dengan spesialis penyakit dalam (untuk dewasa) atau spesialis anak (untuk bayi dan anak) sebelum melakukan vaksinasi.

13. Berapa lama kekebalan berlangsung setelah mendapatkan vaksin Vaksin Menivax?

- a. Disarankan untuk melakukan vaksinasi 14 hari sebelum bepergian

14. Apakah Vaksin Menivax Memberikan Perlindungan Seumur Hidup?

- a. Berdasarkan rekomendasi saat ini, pemberian vaksin Menivax ACYW dapat diulang setelah 2 tahun dari vaksin sebelumnya.

15. Apakah isi dari Vaksin Menivax dan apakah mengandung babi?

- a. Vaksin Menivax ACYW telah memiliki label halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan sudah pula memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Source: <https://www.biofarma.co.id/en/latest-news/detail/produk-rintisan-vaksin-meningitis-bio-farma-siap-dipakai-jemaah-haji>

16. Bagaimana cara saya mengetahui apakah saya alergi terhadap komponen tersebut? Apakah ada tes nya di Halodoc?

- a. Dokter akan melakukan skrining kesehatan untuk menilai paparan vaksin masa lalu dan mengidentifikasi alergi. Namun, jika Anda belum pernah mengalami alergi atau belum pernah menerima vaksinasi tersebut, dokter yang melakukan vaksinasi dapat menetap selama beberapa waktu untuk berjaga-jaga dan menangani apabila Anda mengalami reaksi alergi. Halodoc belum menyediakan tes alergi vaksin.

17. Saat ini saya berencana menunaikan ibadah umrah/haji, apakah saya bisa mendapatkan kartu vaksin internasional/kartu kuning?

- a. Saat ini untuk penerbitan kartu vaksin internasional/kartu kuning masih dalam proses. Harapannya dalam waktu dekat kami akan bisa mengeluarkan kartu vaksin internasional/kartu kuning untuk keperluan haji/umrah

Vaksin Herpes Zoster (Shingrix)

1. Apa itu Shingrix dan apa fungsinya?

- a. Shingrix adalah vaksin yang dirancang untuk melindungi orang dewasa dari herpes zoster (cacar ular/cacar api/penyakit dompo), penyakit yang menyebabkan ruam (bintil air) di kulit dan nyeri.
- b. Selain itu, Shingrix juga mencegah Post-Herpetic Neuralgia (PHN), yaitu nyeri saraf jangka panjang yang sering terjadi setelah herpes zoster.

2. Siapa yang perlu mendapatkan vaksin Shingrix?

Vaksin Shingrix direkomendasikan untuk **orang dewasa 18 tahun ke atas**, terutama:

- a. Berisiko terkena herpes zoster (orang yang sudah pernah terkena cacar air).
- b. Berisiko lebih tinggi terkena herpes zoster (orang dengan kekebalan tubuh rendah).
- c. Berusia 50 tahun ke atas.

3. Apakah Shingrix bisa digunakan untuk mencegah cacar air?

Tidak, Shingrix tidak digunakan untuk mencegah cacar air (varicella). Vaksin ini hanya efektif untuk mencegah herpes zoster, yang berbeda dari cacar air.

4. Apa itu herpes zoster?

Herpes zoster adalah ruam kulit yang menyakitkan, sering kali disertai lepuh. Ruam ini biasanya muncul di satu sisi tubuh dan dapat berlangsung selama beberapa minggu.

5. Apa yang menyebabkan herpes zoster?

- a. Herpes zoster disebabkan oleh virus *Varicella zoster*, virus yang sama yang menyebabkan cacar air. Setelah seseorang terkena cacar air, virus tetap berada di dalam tubuh, terutama di sel saraf.
- b. Setelah bertahun-tahun, jika sistem kekebalan tubuh Anda melemah karena usia, penyakit, atau obat-obatan tertentu, virus ini bisa aktif kembali dan menyebabkan herpes zoster.

6. Apa komplikasi herpes zoster yang paling umum?

- a. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah nyeri saraf jangka panjang, yang dikenal sebagai Post-Herpetic Neuralgia (PHN). Setelah ruam herpes zoster sembuh, Anda mungkin masih merasakan nyeri yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan rasa sakitnya bisa sangat parah.
- b. Komplikasi lain termasuk bekas luka di area lepuh, infeksi kulit, kelemahan, kelumpuhan otot, serta kehilangan pendengaran atau penglihatan, meskipun komplikasi ini jarang terjadi.

7. Bagaimana cara kerja Shingrix?

Shingrix membantu tubuh Anda mengenali virus yang menyebabkan herpes zoster. Vaksin ini melatih sistem kekebalan tubuh Anda agar siap melawan virus tersebut, sehingga Anda terlindungi dari herpes zoster dan komplikasinya.

8. Kapan Shingrix tidak boleh diberikan?

Shingrix tidak boleh diberikan jika Anda pernah mengalami reaksi alergi setelah suntik vaksin herpes zoster atau reaksi alergi terhadap bahan vaksin di bawah ini:

- a. Varicella Zoster Virus glycoprotein E antigen
- b. Plant extract Quillaja saponaria Molina, fraction 21
- c. 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) from Salmonella minnesota
- d. Sucrose
- e. Polysorbate 80
- f. Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
- g. Dipotassium phosphate
- h. Dioleoyl phosphatidylcholine
- i. Cholesterol
- j. Disodium phosphate anhydrous
- k. Potassium dihydrogen phosphate

Tanda-tanda alergi bisa berupa ruam kulit dengan rasa gatal, sesak napas, atau pembengkakan di wajah atau lidah. Jika Anda tidak yakin apakah Anda boleh menerima Shingrix, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.

9. Apa yang perlu saya perhatikan sebelum mendapatkan Shingrix?

- a. Jika Anda mengalami infeksi berat dengan demam tinggi, vaksinasi perlu ditunda sampai Anda merasa lebih baik. Namun, jika Anda hanya mengalami infeksi ringan seperti batuk pilek, vaksinasi boleh dilanjutkan.
- b. Jika Anda memiliki masalah pendarahan atau mudah memar, pastikan untuk memberi tahu dokter yang akan memberikan vaksin sebelum tindakan.
- c. Pingsan bisa terjadi sebelum atau setelah suntikan. Jika Anda pernah pingsan saat menerima suntikan sebelumnya, beritahukan kepada dokter yang akan memberikan vaksin sebelum tindakan.

10. Apakah Shingrix bisa digunakan jika saya sudah terkena herpes zoster?

Shingrix tidak bisa digunakan untuk mengobati herpes zoster atau komplikasi yang sudah terjadi. Vaksin ini hanya untuk pencegahan, bukan pengobatan. Jika Anda sedang mengalami herpes zoster, segera dapatkan perawatan medis

11. Apakah Shingrix melindungi semua orang?

Shingrix memberikan perlindungan lebih dari 90% setelah suntik.

12. Bisakah Shingrix diberikan jika saya sedang minum obat atau suplemen lain?

Shingrix bisa diberikan bersama obat lain, termasuk obat atau suplemen yang didapat tanpa resep. Harap beritahukan dokter yang akan memberikan vaksin jika Anda sedang menggunakan atau baru saja menggunakan obat.

13. Bisakah Shingrix diberikan bersama vaksin lain?

- a. Shingrix bisa diberikan bersama vaksin lain, tetapi disarankan untuk disuntikkan di tempat suntikan yang berbeda.
- b. Jika Shingrix diberikan bersamaan dengan vaksin pneumokokus polisakarida 23-valent, Anda mungkin mengalami demam atau menggigil.

14. Apa yang perlu diperhatikan jika saya hamil atau menyusui?

Jika Anda sedang hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil, pastikan mendapat rujukan dari dokter kandungan atau dokter anak sebelum mendapatkan vaksin ini.

15. Apakah saya boleh menyetir atau mengoperasikan alat berat sehabis vaksin Shingrix?

Beberapa efek samping dari Shingrix mungkin mempengaruhi kemampuan Anda untuk mengemudi atau menggunakan alat berat. Jika Anda merasa kurang sehat setelah vaksinasi, sebaiknya jangan mengemudi atau menggunakan mesin.

16. Apakah Shingrix mengandung sodium atau potassium?

Shingrix mengandung kurang dari 1 mmol sodium (23 mg) per dosis, sehingga dapat dianggap 'bebas sodium'. Shingrix juga mengandung potassium dalam jumlah kurang dari 1 mmol (39 mg) per dosis, yang berarti hampir 'bebas potassium'.

17. Bagaimana cara pemberian Shingrix?

Shingrix diberikan melalui suntikan ke dalam otot, biasanya di lengan atas.

18. Berapa kali saya perlu mendapatkan suntikan Shingrix?

- a. Shingrix terdiri dari 2 dosis.
- b. Dosis kedua akan diberikan paling cepat 2 bulan, atau paling lambat 6 bulan setelah dosis pertama. Jika jangka waktu tersebut lewat, segera jadwalkan dosis kedua Shingrix. Anda tidak perlu memulai ulang dari awal.
- c. Dalam beberapa kasus, dokter Anda mungkin menyarankan untuk mendapatkan dosis kedua setelah 1 bulan dari dosis pertama.

19. Apa yang harus saya lakukan setelah mendapatkan suntikan pertama?

Dokter akan memberi tahu jadwal dosis kedua Anda. Admin Home Lab juga akan mengirimkan Anda reminder jika jadwal dosis kedua Anda sudah dekat. Pastikan untuk menyelesaikan vaksinasi lengkap agar perlindungan Shingrix maksimal.

20. Bisakah Shingrix diberikan jika saya sudah divaksinasi dengan vaksin herpes zoster lain?

Shingrix dapat diberikan bahkan jika Anda telah menerima vaksin herpes zoster merk lain. Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter Anda, ya.

21. Apa efek samping yang dapat terjadi?

Seperti vaksin atau obat lainnya, Shingrix bisa menyebabkan efek samping, meskipun tidak semua orang akan mengalaminya. Sebagian besar efek samping ini ringan hingga sedang dan tidak bertahan lama.

Menurut uji klinis, hanya 1 dari 10 orang yang mengalami efek samping, meliputi:

- a. Sakit kepala.
- b. Masalah pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau sakit perut.

- c. Nyeri otot.
- d. Nyeri, kemerahan, dan bengkak di tempat suntikan.
- e. Kelelahan.
- f. Menggigil.
- g. Demam.

Efek samping yang lebih jarang, kurang dari 1 persen, meliputi:

- a. Gatal di tempat suntikan.
- b. Pembengkakan kelenjar di leher, ketiak, atau selangkangan.
- c. Nyeri sendi.
- d. Reaksi alergi seperti ruam, gatal-gatal, atau pembengkakan di wajah, lidah, atau tenggorokan yang dapat menyebabkan kesulitan menelan atau bernapas.

22. Apakah vaksin Shingrix dapat mengakibatkan kelumpuhan?

Meski jarang, sedikit peningkatan risiko sindrom Guillain-Barré (peradangan saraf yang menyebabkan nyeri, kelemahan, atau kelumpuhan) dilaporkan pada orang berusia 65 tahun ke atas setelah menerima vaksin ini.

23. Apa yang harus saya lakukan jika mengalami efek samping?

Jika Anda mengalami efek samping, segera konsultasikan dengan dokter.

24. Bagaimana bentuk Shingrix dan apa isi kemasannya?

Shingrix adalah vaksin dalam bentuk suspensi injeksi. Setiap kotak berisi:

- a. Serbuk putih: Mengandung antigen virus varicella zoster sebanyak 50 mcg, dikemas dalam vial.
- b. Suspensi pelarut: Cairan tidak berwarna hingga coklat pucat yang mengandung adjuvan, juga dikemas dalam vial.

25. Apakah saya tetap memerlukan vaksin Shingrix jika saya pernah vaksin Varicella (cacar air)?

Jika Anda sudah mendapat vaksin cacar air dan tidak pernah terkena cacar air, Anda mungkin tidak perlu vaksin herpes zoster. Namun, jika Anda tidak tahu riwayat terkait infeksi cacar air, Vaksin Shingrix aman dan tetap direkomendasikan walaupun Anda sudah pernah mendapatkan vaksin cacar air.

26. Apakah boleh vaksin varicella dan vaksin Shingrix diberikan dalam waktu bersamaan?

Jika baru saja menerima vaksin cacar air, tunggu setidaknya 8 minggu sebelum menerima vaksin Shingrix.

27. Jika saya sudah terkena cacar air, kapan sebaiknya saya vaksin Shingrix? Apakah ada jeda waktu tertentu setelah kesembuhan saya?

- a. Jika Anda sudah pernah terkena cacar air, tidak ada waktu tertentu yang direkomendasikan sebelum Anda bisa mendapatkan vaksin Shingrix.
- b. Vaksin ini tetap aman dan direkomendasikan sesuai jadwal rutin, tanpa memperhatikan kapan Anda terkena cacar air.

- c. Vaksin herpes zoster direkomendasikan untuk semua orang dewasa usia 18 tahun ke atas, terutama bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang menurun.

Vaksin Flu Singapura (Inlive)

1. Apa itu Vaksin Inlive®?

Inlive® adalah vaksin untuk mencegah flu Singapura atau Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) yang disebabkan oleh virus Enterovirus 71 (EV71), salah satu penyebab HFMD yang bisa menyebabkan infeksi parah.

2. Mengapa Vaksinasi Penting untuk Flu Singapura (HFMD)?

- HFMD biasanya merupakan penyakit ringan, tetapi HFMD akibat infeksi EV71 bisa menimbulkan gejala berat, seperti gangguan saraf atau kelumpuhan.
- Vaksin Inlive® membantu memberikan kekebalan jangka panjang terhadap HFMD akibat virus EV71. Dengan vaksinasi, anak lebih terlindungi dari infeksi serius, rawat inap, dan risiko komplikasi.

3. Bagaimana efektivitas Vaksin Inlive®?

- 94% efektif mencegah infeksi HFMD akibat virus EV71.
- 100% efektif mencegah rawat inap dan komplikasi.
- Memberikan kekebalan yang bisa bertahan hingga 5 tahun setelah vaksinasi.

4. Apa Itu Flu Singapura (HFMD)?

HFMD adalah penyakit yang ditandai dengan gejala khas ruam pada tangan, kaki dan mulut. Merupakan infeksi virus yang dapat menular melalui kontak kulit, udara pernapasan (batuk, bersin) dan air liur, menyerang terutama pada anak-anak di bawah 6 tahun. Salah satu virus yang bisa menyebabkan HFMD adalah Enterovirus 71 (EV71), yang dapat menyebabkan gejala serius dan komplikasi.

5. Apa Gejala Flu Singapura (HFMD)?

- Demam
- Sakit tenggorokan
- Bintik merah atau ruam di tangan, kaki, dan sekitar mulut
- Luka di dalam mulut

6. Bagaimana HFMD Menular?

HFMD bisa menyebar melalui:

- Kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi
- Tangan yang tidak bersih
- Batuk atau bersin
- Benda atau permukaan yang terkontaminasi virus

7. Bagaimana Pemberian Vaksin Inlive®?

Vaksin Inlive® diberikan dalam 2 suntikan pada otot lengan atas dengan jeda 1 bulan, masing-masing dengan dosis 0,5 mL.

8. Apakah Vaksin Inlive® Bisa Diberikan Bersama dengan Vaksin Lain di hari yang sama?

Ya, Vaksin Inlive® aman diberikan bersama dengan vaksin lain pada hari yang sama. Namun, setiap vaksin harus disuntikkan di area tubuh yang berbeda.

9. Siapa yang Dianjurkan Mendapatkan Vaksin Inlive®?

Vaksin ini direkomendasikan untuk anak usia 6 bulan hingga 3 tahun.

10. Apa Manfaat Utama Vaksin Inlive®?

- Mencegah HFMD dengan memberikan kekebalan jangka panjang hingga lebih dari 5 tahun.
- Mengurangi risiko komplikasi dan rawat inap.

11. Apa efek samping vaksin yang bisa timbul setelah vaksinasi?

Beberapa anak mungkin mengalami:

- Nyeri atau kemerahan di area suntikan
- Demam ringan atau merasa lelah

Efek ini biasanya hilang dalam beberapa hari.

12. Apakah Vaksin Inlive® Juga Bisa Diberikan untuk Orang Dewasa?

Vaksin Inlive® khusus untuk anak-anak, karena risiko HFMD lebih tinggi pada anak-anak.

13. Apakah Ada Kondisi yang Membuat Vaksin Inlive® Tidak Disarankan?

- Anak berusia di bawah 6 bulan.
- Anak berusia di atas 3 tahun atau orang dewasa.
- Anak dengan alergi terhadap bahan vaksin.
- Anak dengan alergi antibiotik gentamycin sulfate.
- Anak yang sedang infeksi akut, demam, atau memiliki penyakit kronis yang sedang aktif.
- Anak dengan riwayat alergi berat.

14. Mengapa Vaksin Inlive® tidak ada di jadwal IDAI?

- Belum ada pernyataan resmi dari IDAI mengenai hal ini. Biasanya, IDAI menyesuaikan jadwal imunisasi dengan program nasional, dengan mempertimbangkan prioritas dan beban negara.

- Jadwal imunisasi juga diperbarui secara berkala. Jika ada vaksin yang belum masuk jadwal, kemungkinan masih dalam tahap evaluasi untuk direkomendasikan di masa depan.

Vaksinasi AREXVY

1. Apa itu vaksin AREXVY?

AREXVY adalah vaksin pertama yang dikembangkan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan bawah akibat Respiratory Syncytial Virus (RSV) pada orang dewasa usia 60 tahun ke atas.

2. Bagaimana cara kerja vaksin ini?

AREXVY mengandung antigen RSVPreF3, yang membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap RSV. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup, sehingga tidak dapat menyebabkan infeksi RSV.

3. Mengapa RSV berbahaya bagi lansia?

Infeksi RSV bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti pneumonia, gagal napas, atau memperburuk penyakit paru kronis (COPD, asma). Lansia dengan komorbiditas seperti diabetes dan penyakit jantung juga lebih rentan mengalami perburukan kondisi akibat RSV.

4. Seberapa efektif vaksin AREXVY?

Studi klinis menunjukkan bahwa vaksin ini memiliki efektivitas tinggi:

- 82,6% mencegah infeksi saluran pernapasan bawah akibat RSV.
- 94,6% melindungi pasien dengan komorbiditas seperti penyakit jantung atau paru-paru.

5. Siapa yang boleh mendapatkan vaksin AREXVY?

Vaksin AREXVY direkomendasikan untuk dewasa usia 60 tahun ke atas, terutama yang memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi pernapasan berat.

6. Siapa yang tidak boleh menerima vaksin AREXVY?

Vaksin ini tidak boleh diberikan jika Anda:

- Memiliki alergi parah terhadap komponen vaksin.
- Sedang mengalami demam tinggi ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), infeksi akut, atau kejang.
- Memiliki gangguan pembekuan darah atau mudah memar.
- Sedang hamil atau menyusui, karena belum ada data cukup tentang keamanannya.

7. Apakah vaksin ini bisa diberikan bersama vaksin lain?

Ya, AREXVY bisa diberikan bersamaan dengan vaksin lain. Namun, harus disuntikkan di lengan yang berbeda.

8. Bagaimana cara pemberian vaksin ini?

- Dosis: 0,5 mL dalam satu kali suntikan.
- Cara pemberian: Suntikan intramuskular (di lengan atas).

9. Apakah vaksin ini perlu diulang setiap tahun?

Saat ini, belum ada rekomendasi dosis booster. Studi masih berlangsung untuk menentukan apakah vaksin perlu diberikan ulang.

10. Apa saja efek samping yang mungkin terjadi setelah vaksinasi?

Efek samping biasanya ringan dan bersifat sementara, seperti:

- Sangat umum (>1 dari 10 orang): Nyeri di tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi.
- Umum (≤ 1 dari 10 orang): Kemerahan dan bengkak di tempat suntikan, demam, menggigil.
- Tidak umum (≤ 1 dari 100 orang): Gatal di tempat suntikan, pembesaran kelenjar getah bening, mual, muntah, sakit perut, atau ruam ringan.

11. Apa perbedaan RSV dengan flu dan COVID-19?

RSV, flu, dan COVID-19 memiliki gejala mirip, tetapi RSV lebih sering menyebabkan infeksi saluran pernapasan bawah yang bisa memicu pneumonia.

12. Mengapa lansia lebih rentan terkena RSV?


Seiring bertambahnya usia, sistem imun menurun (immunosenescence) sehingga lansia lebih rentan mengalami komplikasi akibat RSV.

13. Mengapa saya harus mendapatkan vaksin ini?


Karena RSV bisa menyebabkan penyakit serius, terutama pada lansia dengan penyakit kronis. Vaksin AREXVY membantu mengurangi risiko rawat inap dan komplikasi akibat RSV.

JADWAL IMUNISASI ANAK & DEWASA

Jadwal Imunisasi Anak (IDAI) 2023



Jadwal Imunisasi Anak IDAI 2024



Jadwal Imunisasi Dewasa (PAPDI) 2023

 JADWAL IMUNISASI DEWASA REKOMENDASI SATGAS IMUNISASI DEWASA PAPDI TAHUN 2023						
WAKSIN	KELOMPOK USIA	19-21 tahun	22-26 tahun	27-45 tahun	46-49 tahun	50-59 tahun
Influenza (Flu) ¹		Quadrivalent/Trivalent 1 dosis setiap tahun				
Tetanus, difteria, pertusis (Td/Tdap) ²		1 dosis booster Td/Tdap diberikan setiap 10 tahun				
Varisela ³		2 dosis (bulan ke-0 & 4-8 minggu kemudian)				
Human Papilloma Virus (HPV) untuk perempuan ⁴		3 dosis HPV bivalent/quadrivalent/nonavalent (bulan ke-0, 1 atau 2 & 6)				
Human Papilloma Virus (HPV) untuk laki-laki ⁵		HPV quadrivalent/nonavalent 3 dosis (bulan ke-0, 2 & 6)				
Zoster ⁶		1 dosis				
Measles/Campak, Mumps/Gondongan, dan Rubella/Campak Jerman (MMR) ⁷		1 atau 2 dosis (jeda minimum 28 hari)				
Pneumokokal Konjugat 13-valent (PCV-13) ⁸		1 dosis				
Pneumokokal Polisakarida (PPSV23) ⁹		1 dosis				
Meningitis Meningokokal Polisakarida ¹⁰		Wajib untuk jemaah haji dan sangat dianjurkan untuk jemaah umrah				
Meningitis Meningokokal Konjugat ¹¹		Wajib untuk jemaah haji dan sangat dianjurkan untuk jemaah umrah				
Hepatitis A ¹²		2 dosis (bulan ke-0 dan 6-12)				
Hepatitis B ¹³		3 dosis (bulan ke-0, 1, dan 6)				
Hepatitis A dan Hepatitis B (kombinasi) ¹⁴		3 dosis (bulan ke-0, 1, dan 6)				
Hepatitis A dan Typhoid (kombinasi) ¹⁵		1 dosis pertama, selanjutnya mengikuti kombinasi masing-masing jadwal vaksinasi Hepatitis A dan Tifoid				
Typhoid Fever (Demam Tifoid) ¹⁶		1 dosis untuk 3 tahun				
Yellow Fever (Demam Kuning) ¹⁷		Wajib bila akan bepergian ke negara tertentu				
Japanese Encephalitis (JE) ¹⁸		1 atau 2 dosis				
Rabies ¹⁹		diberikan pasca gigitan hewan tersangka rabies 4 kali pemberian, hari ke-0 (2 dosis), hari ke-7 (1 dosis) & ke-21 (1 dosis)				
COVID-19 ²⁰		2 dosis kecuali J&J sebanyak 1 dosis + Booster				
Dengue ²¹		2 dosis (bulan ke-0 & ke-3)				
Polio (IPV) ²²		1 dosis wajib untuk jemaah haji dari wilayah tertentu				

☐ Jadwal Imunisasi Dewasa merupakan lanjutan dari Jadwal Imunisasi Anak. Informasi detail mengenai rekomendasi ini dapat dilihat pada catatan kaki.

● Diberikan kepada semua orang sesuai dengan kelompok usianya
● Diberikan hanya kepada orang yang memiliki risiko (misalnya : pekerjaan, gaya hidup, bepergian, dll.)
● Diberikan pada daerah endemis atau yang bepergian ke daerah tersebut
● Tidak ada rekomendasi

Hak Cipta oleh Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI

 JADWAL IMUNISASI DEWASA REKOMENDASI SATGAS IMUNISASI DEWASA PAPDI TAHUN 2024						
WAKSIN	KELOMPOK USIA	19-21 tahun	22-26 tahun	27-45 tahun	46-49 tahun	50-59 tahun
Influenza (Flu) ¹		Quadrivalent/Trivalent 1 dosis setiap tahun				
Tetanus, Difteri, Pertusis (Td/Tdap) ²		1 dosis booster Td/Tdap diberikan setiap 10 tahun				
Varicella ³		2 dosis (bulan ke-0 & 4-8 minggu kemudian)				
Human Papilloma Virus (HPV) untuk Perempuan ⁴		3 dosis HPV bivalent/quadrivalent/nonavalent (bulan ke-0, 1 atau 2 & 6)				
Human Papilloma Virus (HPV) untuk Laki-laki ⁵		HPV quadrivalent/nonavalent 3 dosis (bulan ke-0, 2 & 6)				
Herpes Zoster Rekombinan ⁶		2 dosis (bulan ke-0 & 2-6 bulan kemudian)				
Measles/Campak, Mumps/Gondongan, dan Rubella/Campak Jerman (MMR) ⁷		1 atau 2 dosis (jeda minimum 28 hari)				
Pneumokokal Konjugat (PCV13) ⁸		1 dosis				
Pneumokokal Konjugat (PCV15) ⁹		1 dosis				
Pneumokokal Polisakarida (PPSV23) ¹⁰		1 dosis				
Meningitis Meningokokal Polisakarida ¹¹		Wajib untuk jemaah haji dan sangat dianjurkan untuk jemaah umrah				
Meningitis Meningokokal Konjugat ¹²		Wajib untuk jemaah haji dan sangat dianjurkan untuk jemaah umrah				
Hepatitis A ¹³		2 dosis (bulan ke-0 dan 6-12)				
Hepatitis B ¹⁴		3 dosis (bulan ke-0, 1, dan 6)				
Hepatitis A dan Hepatitis B (kombinasi) ¹⁵		3 dosis (bulan ke-0, 1, dan 6)				
Hepatitis A dan Typhoid (kombinasi) ¹⁶		1 dosis pertama, selanjutnya mengikuti kombinasi masing-masing jadwal vaksinasi Hepatitis A dan Tifoid				
Typhoid Fever Polisakarida ¹⁷		1 dosis untuk 3 tahun				
Typhoid Fever Konjugat ¹⁸		1 dosis				
Yellow Fever (Demam Kuning) ¹⁹		Wajib bila akan bepergian ke negara tertentu				
Japanese Encephalitis (JE) ²⁰		1 atau 2 dosis				
Rabies ²¹		diberikan pasca gigitan hewan tersangka rabies 4 kali pemberian, hari ke-0 (2 dosis), hari ke-7 (1 dosis) & ke-21 (1 dosis)				
COVID-19 ²²		2 dosis kecuali J&J sebanyak 1 dosis + Booster				
Dengue ²³		2 dosis (bulan ke-0 & ke-3)				
Polio (IPV) ²⁴		1 dosis wajib untuk jemaah haji dari wilayah tertentu				

☐ Jadwal Imunisasi Dewasa merupakan lanjutan dari Jadwal Imunisasi Anak. Informasi detail mengenai rekomendasi ini dapat dilihat pada catatan kaki.

● Diberikan kepada semua orang sesuai dengan kelompok usianya
● Diberikan hanya kepada orang yang memiliki risiko (misalnya : pekerjaan, gaya hidup, bepergian, dll.)
● Diberikan pada daerah endemis atau yang bepergian ke daerah tersebut
● Tidak ada rekomendasi

Hak Cipta oleh Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI