

專業治療

- 1. 骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術
- 2. 微創腰椎手術 | 內視鏡/顯微減壓與固定融合
- 3. 微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合
- 4. 腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療
- 5. 神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制
- 6. 骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

微創腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療

透過微創切口，鬆開壓迫正中神經的橫腕韌帶，幫助改善夜間手麻、手指刺痛與手部無力。

您是否常在半夜或清晨，突然被手掌發麻、刺痛或灼熱感麻醒，必須起來甩甩手、搓一搓手掌，才覺得稍微舒服？

或是在白天騎機車、開車、拿手機、使用滑鼠、做家事時，大拇指、食指與中指開始發麻、脹痛，甚至拿杯子、碗盤或手機時不小心滑落？

許多人一出現手麻，就擔心是不是中風，或是不是頸椎嚴重壓迫。

但如果麻木感主要集中在大拇指、食指、中指，以及無名指靠近中指的一側，而小指通常不麻，就要小心可能是常見的手部周邊神經壓迫問題——腕隧道症候群。

治療重點在於：

精準判斷正中神經受壓程度，必要時鬆開壓迫神經的橫腕韌帶，避免神經長期受壓造成手部功能退化。

什麼是微創腕隧道神經鬆解術？

手腕掌側有一個由骨頭與韌帶圍成的狹窄通道，稱為腕隧道。

腕隧道裡面有控制手部感覺與部分精細動作的正中神經通過。

當手腕長期重複使用、姿勢不當、肌腱發炎水腫，或因糖尿病、甲狀腺疾病、懷孕水腫等因素，讓腕隧道內壓力升高時，正中神經就可能被擠壓。

微創腕隧道神經鬆解術的目的，就是幫被壓迫的正中神經減壓。

手術通常會在手腕掌側，透過約 1 至 1.5 公分左右的小傷口，鬆開壓迫正中神經的橫腕韌帶，降低腕隧道內壓力，讓神經重新有空間。

簡單來說：

不是把神經切掉，也不是破壞手部功能。

而是把壓迫神經的「緊繃通道」鬆開，讓神經不再被擠壓。

什麼情況需要考慮神經鬆解？

不是每一個手麻都需要手術。

如果症狀還不嚴重，沒有明顯肌肉萎縮或持續無力，可以先嘗試保守治療，例如夜間手腕副木、減少手腕過度使用、藥物、復健、局部注射或超音波導引介入治療。

但如果出現以下情況，就建議儘早評估是否需要微創神經鬆解手術：

- 半夜反覆手麻醒來，影響睡眠
- 保守治療後仍反覆手麻、刺痛
- 大拇指、食指、中指麻木越來越頻繁
- 拿筷子、扣鈕扣、轉瓶蓋變得不靈活
- 握力下降，拿杯子、碗盤或手機容易掉
- 大拇指根部肌肉變扁、凹陷或無力
- 神經傳導檢查顯示正中神經壓迫明顯

如果已經出現大魚際肌萎縮，也就是大拇指根部肌肉變扁、虎口附近凹陷，通常代表正中神經已經受到較長時間壓迫。

這種情況即使手術減壓，神經與肌肉恢復也可能需要更久時間，有些功能不一定能完全恢復。

因此，腕隧道症候群不是拖到手完全沒力才處理。

在肌肉尚未明顯萎縮前解除神經壓迫，通常更有利於保護手部功能。

微創腕隧道神經鬆解術的特色

對適合的患者來說，微創腕隧道神經鬆解術是一種相對成熟的小型神經減壓手術。

常見特色包括：

- 傷口小且隱蔽：通常順著手腕掌側皮紋，以小傷口進行
- 減壓精準：針對壓迫正中神經的橫腕韌帶進行鬆解
- 多數可局部麻醉：不一定需要全身麻醉，實際仍需依患者狀況評估
- 手術時間較短：多數情況下手術時間不長，身體負擔較低
- 通常不需住院：許多患者術後可返家休息
- 恢復較快：可在醫師指示下逐步恢復日常輕度活動

很多患者術後最先感受到改善的，是半夜麻醒與手部脹痛感減少。

但如果神經已經被壓迫很久，尤其已經出現肌肉萎縮或明顯無力，麻木感、手指靈活度與肌力恢復就可能需要較長時間。

手麻一定是腕隧道造成的嗎？

不一定。

手麻的原因很多，可能來自手腕，也可能來自頸椎、手肘，甚至和糖尿病、甲狀腺疾病或周邊神經病變有關。

有些患者甚至同時存在頸椎神經壓迫與腕隧道症候群，也就是所謂的「雙重壓迫」。

所以，在決定是否手術前，不能只看「有沒有手麻」。

真正重要的是透過症狀分布、理學檢查，必要時搭配神經傳導檢查，確認真正被壓迫的位置與嚴重程度。

文宏裕醫師的治療觀點

許多媽媽、手工作業者、長期使用電腦或手機的人，因為習慣忍耐手麻，一路拖到大拇指根部肌肉凹陷、握力下降，才來就醫。

腕隧道神經鬆解術不是什麼大手術，目的也不是為了開刀而開刀。

它的重點，是在正中神經已經明顯受壓時，及時把壓迫神經的「緊箍」鬆開，保護手部感覺與精細動作功能。

能保守治療的，我們先保守治療。

但如果神經已經受到明顯壓迫，該減壓時就要精準處理，避免手部功能繼續退化。

如果手麻、夜間麻醒或手部無力已經影響睡眠、工作與日常生活，就不要只是一直甩手撐過去。

讓專業醫師協助您判斷，找出真正的壓迫位置，選擇最適合的治療方式。

不該開的刀，我不開；該開的刀，我做到最好。

手術不是目的，重新回到生活才是目的。

把時間留給生活，不留給疼痛。