🕵️ 为什么不能取到 3？（带进去验算一下）

我们假设 $m = 3$ 成立，带回题目看看会发生什么：

1. 计算 B 集合：

   把 $m = 3$ 代入 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$

   $B = \{x \mid 3 + 1 \leq x \leq 6 - 1\} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5\}$

   也就是区间 $[4, 5]$。（注意：B 是闭区间，包含 5）

2. 看 A 集合：

   $A = \{x \mid -2 < x < 5\}$

   也就是区间 $(-2, 5)$。（注意：A 是开区间，不包含 5）

3. **判断包含关系**：

   - B 里面有个元素是 **5**。
   - 但是 A 里面**没有 5**（因为 $x < 5$）。
   - 所以，B 里的“小兵 5”跑到了 A 的地盘外面。
   - **结论：$B \not\subseteq A$。**

👉 **所以，临界点 $m = 3$ 是不能取的！**

🧠 记住这个“口诀”

处理 $B \subseteq A$ 时，看端点能不能取等号，就看这两句话：

> “子闭母开，不能重合”
>
> （子集是闭的[ ]，母集是开的( )，边界碰到一起就漏了）

在这道题里：

- B 的右端点是 $2m - 1$（实心，闭）。

- A 的右端点是 5（空心，开）。
- 为了把 B 完全包在 A 里面，B 的右墙壁必须严格在 A 的右墙壁**左边**。
- 即 $2m - 1 < 5$ （**不能加等号**）。