

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට
තිරසර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථික රටාවක්

කාබනික පොහොර සකසා ගනිමු



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

**දේශගුණික විපර්යාසයන්ට හිරිසර විසඳුම් සහිත
හරිත සමාජ ආර්ථික රටාවක්**

කාඩ්ගික පොහොර සකසා ගනිමු

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

2021



ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
අතිගරු ජනාධිපති

“නිරෝගී හා ඵලදායී පුරවැසියෙක් බිහි කිරීමට නම් රජය විසින් වසවිසෙන්
තොර ආහාර වේලක් සඳහා ජනතාවට අති අයිතිය සහතික කළ යුතුය.
ඒ සඳහා ඉදිරි දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය මුළුමනින්ම
කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු කළ යුතු අතර, ඒ සඳහා කාබනික
පොහොර නිෂ්පාදනය වේගවත් කළ යුතුය.”

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය
පිටු අංක 39



මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

හරිත රටක් - ව්‍යවික නැති හෙටක් හඳුන්වන පෙළ ගැසෙමු

ස්වයංපෝෂිත කෘෂි ආර්ථිකයකට උරුමකම් කියූ අතීත හෙළයන් සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන සිදු කළේ මල නොතලා රොන් ගන්නා බඹරැන් පරිද්දෙනි. ඔවුන් පරිසරයට කිසිදු පීඩාවක් නොකළ අතර, මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු කිසිවක් වගාවට මුසු කළේ නැත. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම එදා තිබුණේ පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තයකි.

කාලයත් සමඟ පරිභෝජන අවශ්‍යතාවය ඉහළ ගියේ ය. ඊට සාපේක්ෂව ආහාර නිෂ්පාදනය වර්ධනය කළ යුතු විය. වැඩි අස්වැන්නක් වෙනුවෙන් ගොවිතු රසායනික පොහොර භාවිතයට තුරු වූයේ ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙනි. එතැන් පටන් කෘෂිකර්මාන්තය සහ පරිසරය අතර වූ සමීප සම්බන්ධතාවය පළුදු විය. ගොවිතැනට යොදන රසායනික පොහොර මනුෂ්‍ය ශරීරයට අහිතකර වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විවිධ රෝගාබාධවලට මිනිසා ගොදුරු විය.

මෙවැනි පසුබිමක් තුළ සැමගේ අවධානය යොමු වූයේ වසවිසෙන් තොර පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තයක් වෙතය. රසායනික පොහොර භාවිතය අවම කර කාබනික වගාවට නැඹුරු විය යුතු බවට විවිධ මත ඉදිරිපත් විය. නමුත් ඒවා කටාවට සීමා වූවා මිස ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත.

රසායනික පොහොර ආනයනය වළක්වමින් කාබනික ගොවිතැන යළිත් රට තුළ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය යන අතින් නින්දාව අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම ජාතියේ භාග්‍යයකි. “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා එතුමා විසින් ගත් මෙම තීරණය වෙනුවෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය උපරිම දායකත්වය ලබා දෙන බව මෙහිදී සිහිපත් කළ යුතුය.

රසායනික පොහොර ආනයනය තහනම් කිරීම මේ වනවිට රටේ බොහෝ දෙනාගේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් බවට පත්වී හමාරය. විවිධ හැලහැප්පීම් මඟියේ වුවද කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුය. ඒ සඳහා පළමුව “රසායනික පොහොර නොමැතිව වගා කළ නොහැක” යන ආකල්පය දුරු කළ යුතුය. කාබනික ගොවිතැන යනු අපට නුහුරු දෙයක් නොවේ. අප කළ යුතුව ඇත්තේ රසායනික පොහොරවලට වූ ඇබ්බැහිය දුරු කිරීමයි.

කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු වීම රටේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ගත් තීරණයකි. නිරෝගිමත් ජාතියක් බිහි කරලීම උදෙසා තැබූ දැවැන්ත පියවරකි. කුමන දුෂ්කරතා මඟියේ වුවද ජය ගත යුතු ඉලක්කයකි. කාබනික පොහොරවලින් වගා කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතයට උර දීම ඔබෙන් මගේත් ජාතික වගකීමක් බව සිත තබාගත යුතුය. පරිසර හිතකාමී කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් ප්‍රායෝගික කාර්යක්ෂම වැඩපිළිවෙලක් දැනටමත් ආරම්භ කොට ඇත. එළඹෙන මහ කන්නය වෙනුවෙන් සියලු ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර කිසිදු හිඟයකින් තොරව සහනාධාරය ඵලෙසම ලබාදෙමින් බෙදාදීමට දිවයින පුරා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

පුරවැසියාත්, මව් පොළවත්, මිනිතලයත් වසවිස එක්කොට විනාශ කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ වන්නේ රජය කිසිවිටකත් සූදානම් නැත. එම නිසා කුමන අතියෝග පැමිණිය ද පරිසර හිතකාමී කාබනික කෘෂිකර්මය ගොඩනගමින් හෙට රට වෙනුවෙන්, මතු පරපුර වෙනුවෙන් පෙරට තැබූ පියවර ආපස්සට ගැනීමට අප සූදානම් නැත. ලෝකයේ බොහෝ රටවල් රජය ගත් තීන්දුවට ප්‍රසාදය පළ කරමින් කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය ගොඩ නැගීමට ප්‍රතිපාදන, තාක්ෂණික පුහුණුව, බීජ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සියල්ලට පූර්ණ සහාය දීමට එකඟත්වය පළ කර ඇත. අපේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමෙන් ලෝකයේ 100% කාබනික වගාවෙන් ස්වයංපෝෂිත ලෝකයේ පළමු රට බවට අපට පත්විය හැක. ඒ තුළින් මිනිකතට ණය නැති, මිනිකතට බරක් නැති අභිමානවත් මිනිසුන් ලෙස අපට ලෝකය හමුවේ නැගී සිටිය හැක. “හරිත රටක් - වසවිස නැති හෙටක්” ගොඩනගන ගමනට දායකත්වය ලබා දීම සියලු පුරවැසියන්ගේ කර මත ඇති යුතුකමයි. ඒ තුළින් මතු පරපුරත්, මහ පොළවත්, පුරවැසියාත් පුරක්ෂිත කොට ලෝකයේ කාබනික ගෙවත්ත ශ්‍රී ලංකාව කිරීමේ අභිමානවත්, ඓතිහාසික අවස්ථාව අපට හිමිව ඇත. ඒ සඳහා පක්ෂ, පාට, ආගම් හේද අතහැර මුදල් හමුවේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත පාචා නොදී සියල්ලන් එක්ව එක ගමනකින් පෙරට පැමිණ මව්පොළව වසවිස නැති ලෝකයේ සුන්දර දේශය කිරීමට අත්වැල් බැඳගන්නා ලෙස ජාතිය වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.



ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය

වි හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, ඵලවළු, පළතුරු, මිරිස්, ඵෑණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මගින් මෙරට ජනතාව හමුවේ තැබූ, මෙරට අති බහුතරයක් වූ 69 ලක්ෂයක් ජනතාවගේ ආශීර්වාදය හිමි වූ “වස විස හැති හරිත රටක්” බිහි කිරීමේ ඒ ඓතිහාසික නිව්දව යථාර්ථයක් බවට පත්ව ඇති මොහොතක කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව මෙරට ගොවිජනතාව දැනුවත් කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පාදනය කරන “දේශගුණ විපර්යාසයන්ට තිරසර විසඳුමක් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථික රටාවක් - කාබනික පොහොර සකසා ගනිමු” නම් කෘතියට සුබපැතුමක් එක් කිරීමට ලැබීම කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මා ලද භාග්‍යයක් කොට සලකමි.

100%ක් කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වෙත පිවිසීමට ජනපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය ගත් නිව්දව 1960 දශකයේ ඊනියා “හරිත විප්ලවය” හඳුන්වා දුන් ආ සිට අඛණ්ඩව පැවැති විද්වත් හා පරිසරවාදී ඉල්ලීමක් යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමකි. එය තිරසර ලෝකයක් පදනම් කරගත් අනාගතවාදී සිහිනයක් ඉටුවීමක් මිස හුදු දේශපාලන හෝ “හදිසි” නිව්දවක් නොවේ. එය ඉතාම පැහැදිලිව රටටත්, ජනතාවටත්, සමස්ත පරිසරයත් ගැන සංවේදී වෙමින් ගත් අතිශය කාලීන නිව්දවකි.

ආර්ථික, දේශපාලන හා මාධ්‍ය බලයෙන් සන්නද්ධ ඛනුජාතික සමාගම් ජාලයක ආරක්ෂාව හා පැවැත්ම මත රඳාපවතින, වාර්ෂිකව ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණනක් හුවමාරු වන රසායනික පොහොර කර්මාන්තයට සෘජුව අභියෝග කළ රටක් අපට මෑත ඉතිහාසය තුළ සොයා ගැනීමට නොහැකිය. එවැනි අභියෝගාත්මක හා සංකීර්ණ තීන්දුවක් ගැනීමට හැකියාව ඇත්තේ තම ජනතාවට, ගත කොළ ඇතුළු සමස්ත පරිසරයට අසීමිතව ආදරය කරන දුරදුර්ගී දැක්මක් ඇති අතීත නායකයෙකුට පමණය.

ලෝකයේ විශිෂ්ටතම කෘෂිකාර්මික හා වාරිසංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන, අට ලෝ දහමේ දී කම්පා නොවන, සජීවී - අජීවී සමස්ත ජීවී වර්ගයාටම ආදරය කරන අදින ගොවිජනතාවක් නිජබිම කරගත් ශ්‍රී ලංකාව, රසායනික පොහොර සමාගම්වලට හා ඔවුන්ට ආශීර්වාද කරන දේශපාලන, මාධ්‍ය බලවේගවලට අභියෝග කරමින් "වස විස නැති හරිත රටක්" බිහි කිරීමට ගත් තීන්දුව ඓතිහාසික තීන්දුවක් පමණක් නොව සමස්ත ලෝකයේම අනාගත පැවැත්ම වෙනුවෙන් ගත් තීන්දුවක් වනු ඇති බව නිසැකය.

මන්ද කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වෙත 100%ක් ගමන් කිරීමට ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම කෘෂිකාර්මික රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව ගත් ඒ අභියෝගාත්මක තීන්දුව කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වෙත ගමන් කිරීමට මහත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින තවත් රටවල් රැසකට ආදර්ශයක්, ධෛර්යක් හා ශක්තියක් වන නිසාය. ලෝකය පුරා සිටින මිලියන සංඛ්‍යාත කාබනික ගොවීන්ට, කාබනික ආහාරවලට කැමැත්තක් දක්වන පරිභෝගිකයින්ට සහ පරිසරවේදීන්ට හැවුම් අපේක්ෂාවන් දුල්වන නිසාය.

කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වෙත වැටී ඇති මාවත කිසිසේත් සරල - සුමග එකක් නොවන බව පසුගිය දශක ගණනාව පුරා අපත්, ලෝකයත් අත්විඳ ඇති බොහෝ අත්දැකීම්වලින් ගමන් වේ. දැවැන්ත ඛනුජාතික සමාගම්,

ඔවුන් මත යැපෙන දේශපාලන හා මාධ්‍ය බලවේග මෙම අරමුණ පහසුවෙන් ජය ගැනීමට කිසිසේත්ම ඉඩ දෙනු ඇතැයි සිතිය නොහැකිය. ඔවුන් තමන් සතු සෑම බලයක්ම, හැකියාවක්ම ශ්‍රී ලංකාව ආරම්භ කළ මෙම ගමන නතර කිරීමට, පමා කිරීමට කොන්දේසි විරහිතව භාවිත කරනු ඇති බව නිසැකය. මන්ද ලෝකයේ විශිෂ්ටතම කෘෂිකාර්මික සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථකත්වය යනු රසායනික පොහොර කර්මාන්තයේ ගෝලීය ආධිපත්‍ය බිඳ වැටීමේ ආරම්භය වන බැවිනි.

මේ තත්ත්වය තුළ “වස විස නැති හරිත රටක්” බිහිකිරීමේ මෙම ගමනට මෙරට සියලු දෙනා පාට - පක්ෂ, ජාති, ආගම් හේදයෙන් තොරව සහාය ලබාදිය යුතුය. මේ නින්දාව අද ජීවත්වන ජනතාවගේ ඉරණුම පමණක් නොව අපේ අනාගත පරම්පරාවේ ද ඉරණුම නින්දා කරන බව අප සියලු දෙනාම වටහා ගත යුතුය. මෙම අභියෝගාත්මක ගමන සාර්ථක කර ගැනීමට දැනුවත් ගොවි ජනතාවක් මෙන්ම පරිභෝගික සමාජයක් ද අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියකි. එකී අරමුණ ජය ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්පාදනය කර ප්‍රකාශයට පත් කරන මෙම කෘතියෙන් මහත් පිටුබලයක් ලැබෙනු ඇති බව මගේ විශ්වාසයයි.



නීතිඥ මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා (පා.ම)

කාබනික හා ස්වභාවික පොහොර නිෂ්පාදන
සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව දේශගුණික විපර්යාසයන්ට නිරසර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථික රටාවක් කරා යන මැයෙන් යුතු අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් සියලුම වර්ගවල රසායනික පොහොර හා පළිබෝධනාශක ආනයනය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීම කරනු ලැබුවේ නිරෝගි හා ඵලදායී පුරවැසියෙකු බිහි කිරීමට නම් රජය විසින් වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක් සඳහා ජනතාවට ඇති අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීමේ උතුම් අරමුණ පෙරදැරි කරගෙනය.

රටක් ලෙස ස්වභාවික පොහොර නිෂ්පාදනය කරා ගමන් කිරීමේ දී ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණයට දායක වන ගමන් ම රටේ මුදල් හා සම්පත් රට තුළ ඉතිරි කර ගැනීමේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ද මේ සමඟ ඇරඹෙනු ඇත. ඊට අමතරව ජාතික පොහොර අවශ්‍යතාවය රට තුළ ම නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් දේශීය ව්‍යවසායකයන්ගේ බිහිවීම ද, රටේ ආර්ථික අභිවෘද්ධියට රුකුලක් වනු ඇත. මෙසේ සංවර්ධනය කරා යන ගමනේ නිරෝගිමත් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහිවීම ද මේ තුළින් අප ලබන ප්‍රතිඵලයකි.

මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා රජයක් ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඇතුළු කාබනික හා ස්වභාවික පොහොර නිෂ්පාදන සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය

අමාත්‍යාංශය වශයෙන් අප සතු වගකීම රට වෙනුවෙන් අප නොපිරිහෙලා
ඉටු කිරීමට බැඳී සිටින්නෙමු.

වස විස නැති හෙටක් වෙනුවෙන් සිදු කරන මෙම ජාතික කට්තව්‍ය අප
සියලු දෙනාගේම වගකීමක් ලෙස සලකා ඒ වෙනුවෙන් ඔබගේ යුතුකම රට
වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නට අප සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්නා ලෙස ඔබ සැමට
ආරාධනා කරමි.



ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උදින් කේ. ජයසිංහ
ලේකම්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

හරිත විප්ලවය තුළින් ගොඩ නැගුණු ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ශාක පෝෂක අවශ්‍යතාවය සපුරා ගනු ලැබුවේ රසායනික පොහොර භාවිතයට මුල්තැන දෙමිනි. කාලයක් ගතවත්ම මෙම රසායනික පොහොර භාවිතය, අනිසි හා අවිධිමත් මට්ටමට පත්වීම හේතුවෙන් පාරිසරික හා සෞඛ්‍යමය ගැටළු ඇතිකරමින් රටෙහි ආර්ථිකයට අධික වැය බරක් සේම සමාජ ව්‍යසනයක් බවට පත් ව ඇත. එමෙන්ම, මෙරට කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ අවධානය වැඩි වශයෙන් යොමු වී තිබුණේ භූමියෙහි පාංශුමය, භෞතික හා රසායනික ගුණාංග සංවර්ධනය පිළිබඳව වන අතර, පාංශු සෞඛ්‍යය ඉහළ නැංවෙන ජෛවමය ගුණාංග ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් තරම් අවධානයක් යොමු වී නොතිබිණි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම අනුව යමින්, අනාගත පරපුරට සෞභාග්‍යමත් රටක් හා හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් බිහිකරදීමේ පරමාර්ථයෙන්, නිරසර කෘෂිකර්මාන්තයට මුල් තැන දෙමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයක් සඳහා වන වැඩසටහන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඒ වෙනුවෙන් සැකසුණු කාබනික පොහොර සකසා ගනිමු. අත් පොතෙහි අඩංගු කරුණු මනා පිටිවහලක් වනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.

පටුන

හැඳින්වීම	01
1. කොමිපෝස්ට් පොහොර	03
2. වගා බිමට කොළ පොහොර	14
3. සරුසාර ගොවි බිමකට සත්ත්ව පොහොර.....	20
4. පිදුරු කාබනික පොහොරක් ලෙස බෝගවලට යෙදීම	25
5. ගැඬවිල් කොමිපෝස්ට් පොහොර	26
6. ගැඬවිල් පණු දියර පොහොර	32
7. දියර කොමිපෝස්ට් (කොමිපෝස්ට් තේ).....	38
8. බෝග වගාව සඳහා මාළු නිස්සාරකය	43
9. ජීවමෘත	47
10. පලතුරු ටොනික්	49
11. දහයිසා අඟුරු.....	51
12. ජීව අඟුරු	57

හැඳින්වීම

දේශගුණ විපර්යාසයන්ට තිරසර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථික රටාවක් බිහි කිරීම අරමුණු කරගෙන කාබනික පොහොර භාවිතයට ගොවි ජනතාව දිරිමත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අවට පරිසරයෙන් පහසුවෙන් සපයාගත හැකි සත්ත්ව සහ ශාක අමු ද්‍රව්‍ය එකතු කරගෙන අපගේ වගාබිම් තුළම උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් කාබනික පොහොර අපටම නිෂ්පාදනය කර ගත හැකිය.

පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම මගින් අස්වැන්නන් සමඟ පසෙන් ඉවත් වන ශාක පෝෂක නැවත පසට ලබාදීමට අමතරව පසේ සාරවත් බව රැකගැනීමට ඉවහල් වන පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආරක්ෂාවීමත්, පසේ භෞතික ගුණාංග වැඩි දියුණුවීමත් සිදුවෙයි.

කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන

- පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු වීම
- බෝග වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පෝෂක මෙන්ම අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ද ලබාදීම
- බුරුල් පසක් ඇති කිරීම මගින් වාතාශ්‍රය දියුණු වීම සහ මුල් වර්ධනය පහසු කරවීම
- පසේ ජලය රඳවාගැනීමේ හැකියාව වැඩි වීම
- ශාක පෝෂක රඳවාගැනීමේ හැකියාව වැඩි වීම

කාඩ්කාඩ් පොතොර ලෙස යොදා ගත හැකි දේ

01. කොමිපොස්ට් පොතොර
02. කොළ පොතොර
03. සත්ත්ව පොතොර
04. බෝග අවශේෂ
05. ගැඩවිල් කොමිපොස්ට් පොතොර
06. ගැඩවිල් දියර පොතොර
07. කොමිපොස්ට් (තේ) දියර පොතොර
08. මාළු නිස්සාරකය (රිෂ් ටොනික්)
09. පීචූර
10. පලතුරු ටොනික්

1. කොම්පෝස්ට් පොහොර

1.1 හැඳින්වීම

සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය හා ශාක කොටස් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ උපකාරයෙන් පිරණය කොට නිපදවාගනු ලබන පොහොරකි. මෙහි දී උෂ්ණත්වය හා තෙතමනය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට සුදුසු පරිදි පවත්වා ගැනීම වැදගත් වනු ඇත.

1.2 නිපදවීමේ ක්‍රම

- ගොඩ ක්‍රමය
- කෝටු රාමු ක්‍රමය

1.3 නිපදවීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

- සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය - කුකුල් පොහොර, ගොම පොහොර, එළු පොහොර වැනි
- ශාකමය ද්‍රව්‍ය - වියළි ශාක පත්‍ර හා අමු කොළ අතු
- බෝග අවශේෂ - කුඩාවට කපාගත් කෙසෙල් කඳුන්
- කොම්පෝස්ට් මුහුන් හෝ හොඳින් දිරාගිය කොළ රොඩු
- කොම්පෝස්ට් ගොඩ වසා තැබීමට ප්‍රමාණවත් කළු පොලිතින් කැබැල්ලක්, කොහු ලණු කැබැල්ලක් හා ජලය

1.4 නිෂ්පාදනයට සුදුසු බිමක් තෝරා ගැනීම

- වර්ෂාවේ දී වතුරෙන් යට නොවන, හොඳින් ජලය බැස යන සහ මද සෙවන සහිත සමතලා බිමක්.

1.5 ගොඩ ක්‍රමයට කොම්පෝස්ට් පිළියෙල කිරීම

- ගොදුන් බිම සමතලා කර වතුර නොරැඳෙන සේ සකස් කර කොම්පෝස්ට් ගොඩෙහි දිග හා පළල සලකුණු කර ගන්න.
- ප්‍රථමයෙන් පස මතුපිට අඟල් 6 - 8 පමණ උස වියළි ශාක ද්‍රව්‍ය තට්ටුවක් අතුරන්න. ඒ මත සත්ත්ව පොහොර අඟල් 3 ක පමණ තට්ටුවක් අතුරන්න.
- ඊට උඩින් අමු කොළ, ළපටි අතු, අඟල් 6 - 8 ක තට්ටුවක් අතුරා ඒ මත, කොම්පෝස්ට් මුහුන්, වර්ග මීටරයට ග්‍රෑම් 30 ක් පමණ වන පරිදි විසුරුවා හරින්න.
- ඉන්පසු මාරුවෙන් මාරුවට සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය හා ශාක අපද්‍රව්‍ය අඩි 5 ක් පමණ උසට අතුරන්න. එසේ ඇසිරීමේ දී සෑම තට්ටු දෙකක් අතරට ම මුහුන් යෙදීම කළ යුතුය.



- ← කෙසෙල් කැකුළු
- ← ගොළු/කුකුළු පොහොර
- ← තණකොළ
- ← ගොළු/කුකුළු පොහොර
- ← ගල්ලි/සීනි
- ← බ්‍රොයිලර් අතුරුණු
- ← වියළි කොළ රොඩු

හිතවැදිලි ගොඩ ගැසූ කොම්පෝස්ට් ගොඩක තරස්කඩ

- සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය නොමැති නම්, වියළි ශාක අපද්‍රව්‍ය හා අමු කොළ පොහොර මාරුවෙන් මාරුවට අතුරන්න.
- භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය පමණට වඩා වියළි නම් නට්ටුවක් ඇතිරූ පසු ප්ලාස්ටික් තෙත් කළ යුතුය.
- භාවිතා කරන යම් අමුද්‍රව්‍යයක් පමණට වඩා තෙත් නම් ගොඩ සෑදීමේ දී වියළි උපස්තරයක් මත ඇතිරීමට සැලකිලිමත් වන්න.
- කොළ පොහොර පමණක් භාවිතා කොට සකසන කොම්පෝස්ට්වලට සාපේක්ෂව වැඩි කොම්පෝස්ට් අස්වැන්නක් සත්ත්ව පොහොර ද යොදා ගැනීමෙන් ලබා ගත හැක.



ගොඩ ගසා ඇවෑමේ කළ කොම්පෝස්ට් ගොඩ



පොලිතින්වලින් වැසූ කොම්පෝස්ට් ගොඩ

- නවීථු අසුරා අවසන් වූ පසු ගොඩ වටේ පහළින් අගල් 10 ක පමණ ඉඩක් ඉතිරි වන සේ පොලිතින් කැබැල්ලෙන් වසා ලණුවලින් හොඳින් ගැට ගසන්න.
- සෑම සතියකට වරක්ම තෙතමනය හා උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරන්න. තෙතමනය ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් ජලය යොදා තෙත් කරන්න.
- පළමු සති 4 තුළ අතට දැනෙන තරමේ උෂ්ණත්වයක් ගොඩ තුළ පවත්වා ගත යුතුය. උෂ්ණත්වය අඩු නම් තෙතමනය පරීක්ෂා කර වතුර යොදන්න.
- සති 4 කට පසු පළමු පෙරළීම සිදුකර නැවත ගොඩ ගසා පෙර පරිදි වසා තැබිය යුතු වන අතර, පළමු පෙරළීමෙන් සති හතරකට පසු දෙවන පෙරළීම ද, දෙවැනි පෙරළීමෙන් සති හතරකට පසු තුන්වෙනි පෙරළීම සිදුකර සෑම පෙරළීමකට පසුව ම පොලිතිනයෙන් වසා තබන්න.
- තුන්වන පෙරළීමෙන් පසු පොහොර භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ.
- තුන්වන පෙරළීමෙන් දිරාපත් වීම ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් නැවත ගොඩ සකස් කර හොඳින් තෙත් කර අමතර සති දෙකක් තබන්න.
- මෙම සෑම පෙරළීමක දී ම මුහුන් සහ ජලය මිශ්‍ර කර ගැනීම මගින් හොඳින් ලද කොටස් කඩිනමින් දිරාපත් කළ හැකිය.



- මේ අනුව මාස 3 - 3 ½ කට පසු ගුණාත්මක කොම්පෝස්ට් පොහොර ඔබට නිපදවා ගත හැකි අතර, අගල් ½ දැලකින් හලා මලුවලට අසුරා නොතෙමෙන ස්ථානයක ගබඩාකර තැබීමෙන් අවශ්‍ය අවස්ථාවක දී භාවිතයට ගත හැක.

1.6 කඩිනම් ක්‍රමයට කොම්පොස්ට් සෑදීම (සති 6)

- නිෂ්පාදනය සඳහා සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය, අමුශාක පත්‍ර සහ වියළි ශාක/බෝග අවශේෂ කොටස් පරිමාව අනුව 1 : 1 : 1 අනුපාතයට යොදා ගැනීමෙන් සති 6 ක් වැනි කෙටි කලකින් ගුණාත්මයෙන් ඉහල කොම්පොස්ට් සාදාගත හැකිය.
- සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය වශයෙන් වියළි ගොම හෝ කුකුල් පොහොර හෝ එළු පොහොර හෝ මේ සියල්ලගේම මිශ්‍රණයක් යොදා ගත හැකිය. මෙහිදී වඩාත් පහසුවෙන් සොයා ගත හැකි සහ වැඩිපුර නිබේන සත්ත්ව අපද්‍රව්‍යයන් මේ සඳහා භාවිත කළ හැක.
- අමු ශාක පත්‍ර වශයෙන් පෝෂක බහුලව අඩංගු ශාක පත්‍ර එනම් වැටහිර (ග්ලිරිසිඩියා), ඉපිල් ඉපිල්, එරබදු සහ වල් සුරියකාන්ත වැනි ශාක වඩාත් සුදුසු වන අතර වෙනත් ශාක පත්‍ර හෝ ශාක වර්ග කිහිපයක මිශ්‍රණයක් වුව ද යොදා ගත හැකි ය. ගෙවත්තෙන් උදළු හා ඉවත් කරන අමු තණකොළ හා මාන වැනි ශාක ද මේ සඳහා යොදා ගත හැකිය.
- වියළි ශාක කොටස් ලෙස පිදුරු හෝ වෙනත් ඕනෑම බෝග අවශේෂයක් භාවිත කළ හැකිය.
- මෙහිදී යොදන ශාක කොටස් කුඩා කොටස්වලට කැබලි කිරීම මගින් මෙම ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් කඩිනම් කරගත හැකි ය.

ගොඩ සැකසීම

- වියළි ශාක පත්‍ර අගල් 5 - 6 ක තට්ටුවක් ලෙස බිමට අතුරන්න. ඒ මත අගල් 3 - 4 ක අමුකොළ තට්ටුවක් අතුරන්න. ඒ මත නැවත වියළි කොළ තට්ටුවක් අතුරන්න. ඉන්පසුව වියළි සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය තට්ටුවක් අතුරන්න.
- මේ ආකාරයට තට්ටු ලෙස අසුරා මීටර් 1 - 1.5 පමණ උසට ගොඩ සකසන්න.
- අමුද්‍රව්‍ය තට්ටු වශයෙන් ඇසිරීමේ දී ඒවායේ තෙතමනය අඩු නම් අවශ්‍ය පමණ ජලය යොදා තෙත් කරන්න.
- ගොඩ ආවරණය වන පරිදි කළු පොලිතිනයකින් වසන්න.

ගොඩ පෙරලීම



- ගෙවත්තක් සඳහා පළමු අඩි 3 ක්, උස අඩි 3 ක් හා දිග අඩි 6 ක් වන ගොඩක් සෑහේ. මෙමගින් කොම්පෝස්ට් කිලෝ ග්‍රෑම් 250 - 300 ක් පමණ නිපදවිය හැකිය.

අමුද්‍රව්‍ය සුලබතාව, පවතින සම්පත් අනුව පහත විවිධ ආකාර සංයෝජනවලින් වඩාත් ගැලපෙන ආකාරයකට කොම්පෝස්ට් සකසා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

ක්‍රමවේදය	කොම්පෝස්ට් ටොන් 1 ක් ලබාගැනීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය බර අනුව අනුපාතය (කිලෝ ග්‍රෑ.)	අමුද්‍රව්‍ය කැබලි කළ යුතු ද යන්න	ගොඩ පෙරලීම කාලාන්තරය	කාලය දළ වශයෙන් (සති)
1	සත්ව අපද්‍රව්‍ය 1000 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 350 : වියලි බෝග අවශේෂ 150	කැබලි කළ	පළමු පෙරලීම සති 2 න් හා ඉන් පසුව සති 2 කාලාන්තරයෙන්	6
2	සත්ව අපද්‍රව්‍ය 750 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 750 : වියලි බෝග අවශේෂ 750	කැබලි කළ	පළමු පෙරලීම සති 2 න් හා ඉන් පසුව සති 1 කාලාන්තරයෙන්	8
3	සත්ව අපද්‍රව්‍ය 750 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 750 : වියලි බෝග අවශේෂ 750	කැබලි කළ	සති 3 කාලාන්තරයකින්	10

4	සත්ව අපද්‍රව්‍ය 750 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 750 : වියළි බෝග අවශේෂ 750	කැබලි නොකළ	සති 3 කාලාන්තරයකින්	12
5	සත්ව අපද්‍රව්‍යය 1000 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 1000	කැබලි කළ	පළමු පෙරලීම සති 2 න් හා ඉන් පසුව සති 1 කාලාන්තරයෙන්	6
6	සත්ව අපද්‍රව්‍ය 1000 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 1000	කැබලි කළ	සති 3 කාලාන්තරයකින්	8
7	සත්ව අපද්‍රව්‍ය 1000 : අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 1000	කැබලි නොකළ	සති 3 කාලාන්තරයකින්	10
8	අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 1500 : වියළි බෝග අවශේෂ 1500	කැබලි නොකළ	සති 3 කාලාන්තරයකින්	12
9	අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 1500 : වියළි බෝග අවශේෂ 1500	කැබලි කළ	පළමු පෙරලීම සති 2 න් හා ඉන් පසුව සති 1 කාලාන්තරයෙන්	8
10	අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය 1500 : වියළි බෝග අවශේෂ 1500	කැබලි කළ	සති 3 කාලාන්තරයකින්	10

සත්ව අපද්‍රව්‍ය - විල් බැරෝ ලෝඩ් 01 = දළ වශයෙන් කි. ග්‍රෑ. 25 පමණ
අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය - විල් බැරෝ ලෝඩ් 01 = දළ වශයෙන් කි. ග්‍රෑ. 10 පමණ
වියළි බෝග අවශේෂ - විල් බැරෝ ලෝඩ් 01 = දළ වශයෙන් කි. ග්‍රෑ. 04 පමණ

මෙම අගයන් භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය හා අමුද්‍රව්‍යවල පවතින ජල ප්‍රතිශතය මත සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැකිය.

අමු ශාකමය ද්‍රව්‍ය - වල් සූරියකාන්ත, ග්ලිරිසිඩියා, ඉපිල් ඉපිල්, සැල්විනියා, ජපන් ජබර සහ වෙනත් කොළ පැහැ ශාක පත්‍ර හා ශාක කොටස්

සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය - කුකුල් ආස්තරණ, කුකුල් පොහොර, ගොම, එළි පොහොර, වවුල් පොහොර (එළි පොහොර කුඩු කර භාවිතය කොම්පෝස්ට් පීරණය ඉක්මන් කරවයි)

බෝග අවශේෂ - පිදුරු, කෙසෙල් කඳුන්, බඩඉරිඟු ශාක කොටස් හා පොල් අතු වැනි දෑ භාවිතා කළ හැකිය. මේවා අගල් 2 - 3 කුඩා කැබලිවලට කැපීම පීරණය ඉක්මන් කරවයි. කෙසේ නමුත් වී වගාවට පෝෂක සැපයීම සඳහා පිදුරු භාවිතය අනිවාර්යය බැවින් කොම්පෝස්ට් සැකසීම සඳහා පිදුරු භාවිතය සීමාවිය හැක.

මෙහිදී පහත කරුණු කෙරේද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

- පහත ද්‍රව්‍ය අමතර වශයෙන් භාවිතා කිරීමෙන් අමුද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්ට් බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ගතවන කාලය සති 2 කින් පමණ අඩුකරගත හැකිය. (සංයෝජන අංක 1 හා 5 හැර)
- ක්ෂුද්‍රජීවී ආමුකුලන
- ගව මුත්‍ර
- නයිට්‍රජන් වැඩි අනුපාතයකින් අඩංගු කාබනික දියර පොහොර

- කොමිපෝස්ට් හෝ ස්වාභාවික කොළරොඩු ගොඩනැගිලි දිරාපත් වෙමින් පවතින කොළරොඩු සමඟ එයට යටින් ඇති අගලක පමණ පස් තට්ටුවෙන් කිලෝ ග්‍රෑම් 30 ක් සෑම අමුද්‍රව්‍ය කිලෝ ග්‍රෑම් 1000 ක් සඳහා මුහුන් ලෙස භාවිතා කිරීම යෝග්‍ය වේ.
- අවසාන පෙරලීමේ දී අමුද්‍රව්‍ය දිරාපත්වීම අඩු බවක් පෙනේ නම් අමතර සති 2 ක් තැබීම අවශ්‍යය වනු ඇත.
- සෑම අමුද්‍රව්‍ය කිලෝ ග්‍රෑම් 1000 ක් සඳහාම එස්පාවල රොක් පොස්පේට් කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක් මිශ්‍ර කළ යුතුය.
- ගොඩනැගිලි තෙතමනය සතිපතා පරීක්ෂා කර ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය ලබාදිය යුතුය.

බ්‍රොයිලර් අතුරුණුව භාවිතයේ දී මාස 5 - 6 ක් පමණ දිරාපත්වූ අතුරුණුව භාවිතා කරන්න.

කෙසේ නමුත් භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය, ගොඩ සැකසීමේ ක්‍රමය, තෙතමනය හා ප්‍රදේශයේ පවතින උෂ්ණත්වය වැනි කරුණු මත ඉහත සඳහන් ලෙස ජීරණ ක්‍රියාවලියට ගතවන කාලය සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැක.

මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ඒකකවල දී අමුද්‍රව්‍ය කැබලි කිරීම හා ගොඩ පෙරලීම සඳහා යන්ත්‍ර භාවිතය ප්‍රායෝගික වේ.

1.7 කොමිපෝස්ට්වල ගුණාත්මකබව ඉහළ නංවා ගැනීම

- නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම
 - සත්ව අපද්‍රව්‍ය හා රනිල කුලයේ බෝග වැඩිපුර භාවිත කිරීම
- පොටෑසියම් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම

- නිපදවන ලද කොම්පෝස්ට්වල මුලු බරෙන් 5% ක් පමණ දහයිසා අගුරු කලවම් කිරීම
- අමුද්‍රව්‍ය ලෙස වල් සුරියකාන්ත වැඩිපුර යොදා ගැනීම
- කුඩාවට කපාගත් කෙසෙල් කඳුන් හා පොල් අතු යොදා ගැනීම
- පොස්පරස් ප්‍රමාණය වැඩිකර ගැනීම
- කොම්පෝස්ට් ගොඩ ඇසිරීමේ දී එප්පාවල රොක් පොස්පේට් නට්ටු මත විසුරුවා හැරීම (අමුද්‍රව්‍ය කිලෝ ග්‍රෑ. 1,000 කට රොක් පොස්පේට් කිලෝ ග්‍රෑ. 50)

1.8 කෝටු රාමු ක්‍රමය

- ග්ලිරිසිඩියා හෝ වෙනත් කෝටු වර්ගයක් උපයෝගී කරගෙන රූප සටහනේ පරිදි කෝටු රාමුවක් සාදා ගන්න.
- ගෙවත්තේ අතුගා ඉවත් කරන කොළ රොඩු අපතේ යන ඵලවළු සහ මුලුතැන්ගෙයි වෙනත් අපද්‍රව්‍ය (ඉඳුල් හැර) මෙයට එකතු කළ හැකිය.
- නිපදවන කොම්පෝස්ට්වල ගුණාත්මකබව වැඩි කර ගැනීම සඳහා වරින් වර ගොම, ගව මුත්‍රා, ග්ලිරිසිඩියා අතු යනාදිය එකතු කිරීම සුදුසුය.
- මාස කීපයකට පසුව මෙම කොටුවේ යට පැත්තෙන් දිර්ඝ ලද කොම්පෝස්ට් ලබාගත හැකිය.
- මෙම ක්‍රමය ගෙවතු වගාවේ දී යොදා ගත හැකිය.



කෝටු රාමු ක්‍රමය

කොමිපෝස්ට් පොහොර සඳහා ප්‍රමිතිය

තෙතමනය	< 25%
වැලි ප්‍රතිශතය (වියළි බර)	< 20%
පී එච් අගය	6.5 - 8.5
කාබන් - නයිට්‍රජන් අතර අනුපාතය	10 - 25
අවම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමාණය (වියළි බරට)	
කාබන් C	20%
නයිට්‍රජන් N	1%
පොස්පරස් P_2O_5	0.5%
පොටෑසියම් K_2O	1%
මැග්නීසියම් MgO	0.5%
කැල්සියම් CaO	0.7%
උපරිම බර ලෝහ ප්‍රමාණය (වියළි බරට) (mg/Kg)	
කැඩ්මියම් (Cd)	3
ක්‍රෝමියම් (Cr)	50
ප්ලිම් (Pb)	50
රසායන (Hg)	50
නිකල් (Ni)	0.5
කුප්‍රනිකාගම් (Zn)	50
ආසනික් (As)	3

මූලාශ්‍රය : ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවේනි ආයතනය, 2019

2. වගා බිමට කොළ පොහොර

ඔබේ ගොවි බිම සාරවත් කිරීමටත්, සාරවත් බව තිරසාරව පවත්වා ගැනීමටත් කොළ පොහොර යෙදීම බොහෝසෙයින් උපකාරී වේ.

2.1 කොළ පොහොර

ඉක්මණින් දිරාපත් වන කොළ පැහැයෙන් යුත් ශාක පත්‍ර හා ළපටි දඩු ආදිය කොළ පොහොර ලෙස හැඳින්වේ.

2.2 කොළ පොහොර සඳහා සුදුසු ශාකවල ලක්ෂණ

- වැඩි කොළඳාවක් සහිත කප්පාදුවෙන් පසු ඉක්මණින් වර්ධනය වන ශාක
- කාබන් : නයිට්‍රජන් අනුපාතය අඩු රහිල කුලයේ ශාක වඩාත් සුදුසුය. කාබන්, නයිට්‍රජන් අනුපාතය අඩුවීම යනු අඩංගු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය වැඩි බවයි. එවැනි ශාක කොටස් ඉක්මණින් දිරාපත් වේ.



වල් යුරියකාන්ත



ගංයුරිය



එබඳු



ගිරිසිඬයා

කොළ පොහොර ලෙස භාවිතයට සුදුසු ශාක වර්ග සහ ඒවායේ පෝෂණ සංයුතිය

ශාක වර්ගය	පෝෂ්‍ය පදාර්ථ % ලෙස (වියළි බරට සාපේක්ෂව)			
	නයිට්‍රජන්	පොස්පරස්	පොටෑසියම්	කාබන් නයිට්‍රජන් අනුපාතය
ගිරිසිඬයා	4.2	0.3	2.1	12
එරබදු	4.0	0.3	2.4	14
වල් සුරියකාන්ත	4.7	0.4	3.2	14
ගංසුරිය	3.4	0.3	2.2	14
සන්හෙමිප්	2.9	0.3	0.7	16
වරා	3.8	0.3	3.4	11
පැණි තෝර	4.9	0.2	1.8	12
පිල	3.7	0.2	1.7	11
කැප්පෙටියා	3.5	0.3	2.1	15
තෙල් කැකුණ	2.3	0.1	0.6	19

ඉහත ශාක වර්ගයන්ට අමතරව කොළ පොහොරක් වශයෙන් අතරමැද කන්නයන්හි වගාව සඳහා ආහාරමය රනිල බෝග (උඳු, මුං, කවිපි) යොදා ගත හැකිය.

2.3 කොළ පොහොර භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම

- පසේ සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.
- පසට පෝෂක එකතු කිරීම.
- පහසුවෙන් සපයාගත හැකි වීම.
- ඉක්මනින් දිරාපත් වීම.
- වල් බීජ පැළවීම දුර්වල වීම.

2.4 කොළ පොහොර යොදන ආකාර

- පිටතින් කපා ගෙනවිත් කේන්ද්‍රයට දැමීම.
- වගා බිමෙහි වවා පසට යට කිරීම.
- දියර පොහොරක් ලෙස යෙදීම.

පිටතින් කපා ගෙනවිත් කේන්ද්‍රයට දැමීම

- මේ සඳහා ග්ලිරිසිඩියා, ඉපිල් ඉපිල්, කැප්පෙටියා වැනි ශාකවල පත්‍ර හා ළපටි කඳුන් වඩාත් සුදුසුය.
- එම ශාක කොටස් පසට යට කිරීම කළ යුතු වේ.
- මෙම ශාක කොටස් වසුන් වශයෙන් ද යෙදිය හැකි නමුත් එහිදී ලබා ගත හැක්කේ අඩු පෝෂක ප්‍රමාණයකි.

වගා බිමෙහි සිටුවා පසට යට කිරීම

- කොළ පොහොරක් ලෙස රනිල බෝග (උඳ, කවිපි, මුං, රටකපු)
- සන්නෙමිස් වගා කිරීම

කොළ පොහොරක් ලෙස රනිල බෝග වගාව

- වී වගාවේ දී ප්‍රධාන කන්න දෙක අතරමැද කාලයේ අවම තරමින් මාස තුනක කාලයක් පවතින්නේ නම් කවිපි, මුං, උඳ වැනි බෝගයක් වගා කළ හැක.
- එහිදී අතින් වී අස්වනු නෙලන ලද කුඹුරු සඳහා අස්වනු නෙළ වහාම බීජ ඉසීම.
- යන්ත්‍ර මගින් අස්වනු නෙලන ලද කුඹුරු සඳහා රොටරිය යොදා බිම සමතලා කර ගැනීමෙන් අනතුරුව බීජ ඉසීම.
- බෝගය පිහිටුවීමෙන් පසු අධික වර්ෂාවෙන් සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා අඩි 10 - 12 පරතරයෙන් කාණු යෙදීම.
- අස්වනු වාර 1 - 2 ක් ලබාගත් වහාම බෝගය පසට යටවන සේ සි සැම.

සුදුසු බෝග ප්‍රභේද හා බීජ අවශ්‍යතාව

බෝගය	ප්‍රභේදය	බීජ අවශ්‍යතාවය (අක්./කි. ග්‍රෑම්)
මුං	MI 6, MI 05, MI 7, MIMB 7	10
උඳ	MIBG 4	10
මෑ	බුමිටා	8
කවිපි	ANKGCP 1, ANKGCP 2, වරුණි	10 - 12

කොළ පොහොරක් ලෙස සන්නෙම්ප් වගා කිරීම

- වී වගාවේ අතරමැදි කන්නයේ මෙන්ම කන්න බෝගයක් වශයෙන් ද සන්නෙම්ප් වගා කළ හැකිය.
- කොළ පොහොර බෝගයක් වශයෙන් වගා කිරීම සඳහා සන්නෙම්ප් බීජ අක්කරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 20 - 25 ක් අවශ්‍ය වේ.
- බීජ වළුරා සති 10 - 12 කට පසු එම ශාක කොටස් පසට යට කළ යුතුවේ.
- සන්නෙම්ප් වගාකිරීම තුළින් පසේ මූල ගැටිති වටපනුවන් පාලනයක් ද සිදුවේ.



සන්නෙම්ප් වගාවක්

අක්කරයක සන්නෙමිජ වගාවක් තුළින් පසට එකතු වන පෝෂක ප්‍රමාණය

වියළි ද්‍රව්‍ය (කිලෝ ග්‍රෑම්)	නයිට්‍රජන් (කිලෝ ග්‍රෑම්)	පොස්පරස් (කිලෝ ග්‍රෑම්)	පොටෑසියම් (කිලෝ ග්‍රෑම්)
3,000	54	18	36

ශාක පත්‍ර දියර පොහොරක් ලෙස යෙදීම

- කොළ පොහොර වශයෙන් යොදා ගත හැකි ඕනෑම කොළ වර්ගයකින් මිටක් ගෙන හොඳින් කොටන්න.
- වතුර ලීටර් 1 ක් දමා පල් වීමට දින 14 ක කාලයක් තබන්න.
- වාතාශ්‍රය ලබා දීම සඳහා සෑම දිනකට වරක්ම මෙම මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරන්න.
- දින 14 කට පසු මිශ්‍රණය රෙදි කඩකින් පෙරා ගන්න.
- පෙරාගත් ද්‍රාවණයේ කොටස් එකකට ජලය කොටස් 3 ක් මිශ්‍ර කරන්න.
- ඉහත මිශ්‍රණය බෝග සඳහා සතියකට වරක් බැගින් සවස් කාලයේ දී යොදන්න.


3. සරුසාර ගොවි බිමකට සත්ත්ව පොහොර

සතුන්ගේ අපද්‍රව්‍යවලින් සමන්විත පොහොර සත්ත්ව පොහොර ලෙස හැඳින්වේ. උදා: ගොම, ගව මුත්‍ර, එළු පොහොර

සතුන්ගේ අපද්‍රව්‍ය හා ඔවුන් විසින් ආහාරයට නොගත් ඉතිරි වූ කොටස් මිශ්‍ර වූ පොහොර ගොවිපල පොහොර ලෙස හැඳින්වේ.

උදා: කුකුල් කොටුවල ආස්තරණය

3.1 සත්ත්ව පොහොර වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි ආකාර



සත්ත්ව පොහොර ගොවි බිමට එක් කිරීමෙන්

- බෝගවලට අවශ්‍ය ප්‍රධාන මෙන්ම ක්ෂුද්‍ර පෝෂක වර්ගවලින් සමන්විතය.
- කාබනික පොහොරක් නිසා පසේ ගුණාත්මය වැඩි කරයි.
 - පසේ පොහොර, ජලය, වාතය, රදවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි.
 - පසෙන් පොහොර සේදී යාම වළක්වයි.
 - පසේ ඇති ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිකර තවදුරටත් පස සාරවත් කරයි.

කොම්පෝස්ට් සැකසීමේ දී, අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස සත්ත්ව පොහොර එක් කිරීමෙන්

- කොම්පෝස්ට් ගොඩනි ඇති ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කිරීම මගින්,
 - කොම්පෝස්ට් සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් වේ.
 - කොම්පෝස්ට්වල පෝෂකත්වය වැඩි කරයි.

සත්ත්ව පොහොරවල අඩංගු ප්‍රධාන පෝෂක ප්‍රමාණයන්

පොහොර වර්ගය	වියළි බර අනුව ප්‍රතිශතය		
	නයිට්‍රජන්	පොස්පරස්	පොටෑසියම්
ගොම	1.7	0.7	0.8
කුකුල් පොහොර (ලේයර්)	2.3	1.2	2.2
කුකුල් පොහොර (බ්‍රොයිලර්)	2.2	0.8	1.9
එළු පොහොර	2.2	0.7	1.2
උෆුරු පොහොර	1.5	0.8	0.7

3.2 සත්ත්ව පොහොර ගොවි බිමට යොදන අයුරු

වියළි ගොම පොහොර

වියළි ගොම පොහොර යෙදීමට පෙර ගොඩගසා හොඳින් වතුර යොදා විනිවිද පෙනෙන පොලිතින් කොළයකින් හොඳින් වසා හිරුළුයට නිරාවරණය වන ලෙස දින 05 ක් පමණ තබන්න. මෙමඟින් ගොම පොහොරවල ඇති වල් බීජ මර්දනය කර ගත හැක. ඊට පසුව වගාවට යෙදීමට යොදා ගත හැක.

කුකුල් පොහොර

- ලේයර් කුකුල් පොහොර (බිත්තර දමන කිකිළියන්ගේ අතුරුණුව) හා බ්‍රොයිලර් කුකුල් පොහොර (මසට සාදන කුකුළන්ගේ අතුරුණුව) ලෙස ආකාර 02 කි.
- ලේයර් කුකුල් පොහොර කුකුල් කොටුවෙන් ඉවත් කළ වහාම බෝගවලට යෙදීම සුදුසු නොවේ. මාස 3 ක් පමණ හොඳින් දිරාපත් වීමට ඉඩහැර බෝගවලට යෙදීම කළ යුතුය.
- කුකුල් කොටුවෙන් ආස්තරණය ඉවත් කළ වහාම හෝ දිරන ලද කුකුල් ආස්තරණ කොම්පෝස්ට් සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැක.
- බ්‍රොයිලර් කුකුල් පොහොර භාවිත කරන්නේ නම් කොම්පෝස්ට් පොහොර ලෙස සැකසීමෙන් පසු හෝ මාස 5 - 6 ක් පමණ දිරාපත් වූ විට භාවිත කළ යුතුය.
- බ්‍රොයිලර් කුකුල් පොහොරවල අධික කාබන් නයිට්‍රජන් අනුපාතය අඩුකර ගැනීම සඳහා ගව මුත්‍ර, අමුකොළ, අමු තණකොළ, වෙනත් සත්ත්ව පොහොර එක් කළ යුතුයි.

3.3 අමු ගොම භාවිත කර සකසා ගත හැකි දියර පොහොරක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

- ප්ලය : ලීට් 100
- ග්ලිරිසිඩියා කොළ : කිලෝ ග්‍රෑම් 25
- මුරුංගා කොළ : කිලෝ ග්‍රෑම් 1/2
- අමු ගොම : කිලෝ ග්‍රෑම් 10
- චෙනත් කොළ : කිලෝ ග්‍රෑම් 5 (ගඳපාන, මඳුරුතලා)
- පස් මට්ක් (කැලෑ බිමකින් ලබා ගත්)

සාදන ක්‍රමය

- ඉහත සියළු ද්‍රව්‍ය බැරලයකට දමා දිනපතා විනාඩි 05 බැගින් කලහමින් දින 14 ක් යනතුරු පදම් වීමට තබන්න.
- ඊට පසු මිශ්‍රණය පෙරා මිශ්‍රණයේ කොටස් 1 කට ප්ලය කොටස් 03 ක් වන ලෙස මිශ්‍රකර සවස් වරුවේ දී ඉසින යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් බෝගයට යොදන්න.



එළි පොහොර එකතුකර ගැනීම



ගොළ සහ ගව මුත්රා එකතුකර ගැනීම



පිටි වායු ඒකකය



පිටි වායුව ලබාගත් පසු ඉවත් කරනු ලබන තරලය

4. පිදුරු කාබනික පොහොරක් ලෙස බෝගවලට යෙදීම

අස්වනු නෙලීමෙන් පසුව කමතේ ඉතිරිවන පිදුරු පොහොරක් ලෙස යොදාගත හැක. එමෙන් ම පිදුරු කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනී.

4.1 පිදුරුවල අඩංගු ප්‍රධාන පෝෂක

නයිට්‍රජන් 0.6%, පොස්පරස් 0.2% ක් ද හා පොටෑසියම් 1.4% අඩංගුය. පිදුරු වල ඇති පොටෑසියම් වර්ෂාවත් සමඟ සේදී ඉවත්වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න.

4.2 වී වගාවේ දී පිදුරු යෙදීම

- පළමු හියෙන් පසුව පිදුරු ලියැදි පුරා විසුරුවා හැරීම
- පිදුරු ගොඩවල් ලෙස ගොඩ ගසා දෙවැනි හියේ දී පසට එකතු කිරීම

අනෙකුත් බෝග සඳහා වල් පාලනය කිරීමට වසුනක් ලෙස යෙදීම මගින් පිදුරු දිරාපත් වී බෝගයට පෝෂක සපයන කාබනික පොහොරක් බවට පත් වේ.



පිදුරු ලියැදි පුරා විසුරුවා හැරීම

5. ගැබ්විල් කොමිපෝස්ට් පොහොර (වර්ම කොමිපෝස්ට්)


සාමාන්‍යයෙන් කොමිපෝස්ට් පොහොර නිපදවනු ලබන්නේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ආධාරයෙනි. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට අමතරව පසේ ජීවත් වන ගැබ්විල් පණුවන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ද යොදාගෙන ශාක හා සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය මගින් ගුණාත්මයෙන් ඉහල කොමිපෝස්ට් පොහොර මසකින් පමණ නිපදවා ගත හැක. මෙසේ නිපදවාගන්නා පොහොර ගැබ්විල් කොමිපෝස්ට් පොහොර (වර්ම කොමිපෝස්ට්) ලෙස හඳුන්වයි.

5.1 ගැබ්විල් පණුවන් බෝ කර ගැනීම

ගැබ්විල් කොමිපෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා ගැබ්විල් විශේෂ පහක් පමණ අපට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. මේ සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ රතු පැහැති ගැබ්විල් පණුවන් විශේෂයයි. මෙම විශේෂ සොයා ගැනීමට අපහසු අවස්ථාවල දී පහත ක්‍රියා පිළිවෙත අනුගමනය කිරීමෙන් ඒ සඳහා සුදුසු ගැබ්විලුන් තෝරාගනු ලැබේ.

- ගෙවත්තේ ඇති කුණු ගොඩක් පාදා එය තෙත් කර ඒ මතට සක්කර (උක් හකුරු) ද්‍රාවණයක පොගවාගත් තෙත ගෝනියක් දමන්න. ඒ මතට අමු ගොම ස්වල්පයක් දමන්න.
- සතියකින් පමණ බැලූවිට ගෝනියේ යටි පැත්තේ රතු පැහැති ගැබ්විලුන් රාශියක් දැකගත හැකිය. එම සතුන් අමු ගොම සහිත බඳුනකට දමා තබන්න.

මෙසේ සපයාගත් ගැබ්විල් පණුවන් පහත ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනයෙන් ගුණනය කර ගත හැක.



ගැඩවිල් පණුවන් ගුණනය කර ගැනීම

- ලීටර 200 ප්ලාස්ටික් බැරලයකින් බාගයක් ගෙන පතුලට ආසන්නයෙන් පල වහනය සඳහා සිදුරු කරන්න. එය හොඳින් සෙවන සහිත ස්ථානයක තබන්න.
- එම බඳුනේ පතුලට අඟල් 2 ක් පමණ ප්‍රමාණයේ උළු හෝ ගඩොල් කැබලි අතුරන්න. ඒ මත අඟල් 2 ක් පමණ උසට රළු වැළලි අතුරන්න.
- ඊට උඩින් අඟල් 2 ක් පමණ උසට අමු ගොම තට්ටුවක් යොදන්න.
- අමු ගොම මතට රතු පැහැති ගැඩවිල් පණුවන් යොදන්න. ඉන් අනතුරුව පිදුරු හෝ වියළි කොළ හෝ ශාක පත්‍ර තට්ටුවක් දමා ප්‍රමාණවත් තෙතමනය ලබාදෙන්න.
- මසකට පමණ පසු ගැඩවිල් පණුවන් ගුණනය වී ඇති බව දැක ගත හැකිය.

5.2 ගැඩවිල් කොමිපෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

මෙය ආකාර දෙකකට කළ හැකිය

1. ටැංකි ක්‍රමය
2. බැරල් ක්‍රමය

5.3 ටැංකි ක්‍රමය

වාණිජ මට්ටමෙන් ගැඩවිල් කොමිපෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ දී මෙම ක්‍රමය ඉතා සුදුසුය. ඒ සඳහා සෙවන සැපයීමට වහලය සහිත ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍ය වෙයි. එය තුළ ඉදිකරන ටැංකි අඩි 6 ක් පමණ පළල, අඩි 3 ක් පමණ උස සහ දිග අඩි 10 ක් පමණ හෝ අවශ්‍යතාවය අනුව දිග තෝරා ගත හැකිය. ටැංකියෙහි පතුල කොන්ක්‍රීට් හෝ සිමෙන්ති යොදා ආස්ථිරණය කිරීම අවශ්‍යය. එසේ නොමැති වුවහොත් ගැඩවිල් පනුවන් පස තුළට ගමන් කිරීම මෙන්ම, පෝෂක කාන්දු වීමද සිදුවේ. ටැංකි පතුල එක් පසෙකට කුඩා බෑවුමක් සහිතව සකස් කර එම බිත්තියෙහි පතුලෙහි සිදුරු තබා එම සිදුරුවලින් පිටවන ද්‍රාවණය එකතු කර ගත හැකි අයුරින් සකස් කිරීමෙන් ගැඩවිල් දියර පොහොර ද ලබා ගත හැකිය.



ගැඩවිල් කොමිපෝස්ට් ටැංකි

5.4 ටැංකි තුල ගැඩවිල් කොමිපෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය

- සකස් කරගත් ටැංකිවල පතුලටම අඟල් 6 පමණ ඝනකමට කොළ රොඩු තට්ටුවක් අතුරුණ.

- එම කොළරොඩු නට්ටුව මතට ගොම හා නවත් කොළරොඩු අඩි 02 ක් පමණ උසට එක් කිරීම සුදුසුය. මේ ආකාරයට ටැංකිය පුරවා ඒ මතට පණුවන් සහිත ගොම මිශ්‍රණය ඒකාකාරීව පැතිරෙන ලෙස විසුරුවන්න.
- එම ටැංකි අවශ්‍ය පරිදි තෙත් කර සෙවන හා වාතාශ්‍රය ලබා දෙන්න. ප්‍රශස්ත තෙතමනය පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.
- මසකට පමණ පසු යෙදූ කාබනික ද්‍රව්‍ය පණු පොහොර බවට පත්ව තිබෙනු දක්නට හැකිය.

5.5 ගැඩවිල් කොම්පෝස්ට් පොහොරවලින් පණුවන් ඉවත් කර ගැනීම

සාදාගත් පණු පොහොර ටැංකියේ එක් කෙළවරකට ගොඩ ගසන්න. නිස් වූ කෙළවරට අමු ගොම හා කොළ රොඩු එකතු කරන්න. පණු පොහොර ගොඩ පැත්ත වියළීමට හරින්න. හැකිනම් සූර්යාලෝකය වැටීමට සලස්වන්න. අමු ගොම හා කොළ රොඩු එකතු කළ පැත්ත අවශ්‍ය පරිදි තෙත් කර සෙවන හා වාතාශ්‍රය ලබා දෙන්න. මෙසේ සතියකට පමණ පසු සාදා ගත් පණු පොහොර ගොඩෙහි සිටි පණුවන් අමු ගොම හා කොළ රොඩු එකතු කළ පැත්තට ගමන් කරයි.

සතියකට පසු කොම්පෝස්ට් ගොඩෙහි ඉහල සිට දිනකට අඩියක් පමණ බැගින් ගැඹුරට කොම්පෝස්ට් පොහොර ඉවත් කර ගන්න. මේ ආකාරයට දිනපතා ඉහල ඇති වියලි කොම්පෝස්ට් ගොඩ අවසන් වන තුරු සිදුකරන්න. (අලෝකයෙන් හා වියළීමෙන් බේරීමට පණුවන් පහළට ගොස් අවසානයේ නව අමුද්‍රව්‍ය ගොඩට ගමන් කරයි.) පසුව මුළු ටැංකියම අලුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය හා ගොම මිශ්‍රණයෙන් සම්පූර්ණයෙන් පුරවන්න. මෙලෙස නොකඩවා ගැඩවිල් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කළ හැක.



තැවෙන අමුද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම



භෞත පැහැරී ගැබවිල්ල පත්‍රවත්

5.6 බැරල් ක්‍රමය

- මෙම ක්‍රමය කුඩා පරිමාණයෙන් ගැබවිල් කොමිපෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදන කර ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකිය. මේ සඳහා සිමෙන්ති, ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් වලින් සැදූ භාජනයක් භාවිතා කළ හැකිය. භාජනයෙහි උස උපරිම අඩි 03 ක් තිබීම ප්‍රමාණවත්ය. එහි පතුල හොඳින් සිල් වී තිබිය යුතුය. එම භාජනයෙහි පතුලට ආසන්නයෙන් ජල වහනය සඳහා බිත්තිය සිදුරු කරන්න. එය හොඳින් සෙවන සහිත ස්ථානයක තබන්න. සෙවන සැපයීමට වහලය සහිත තාවකාලික මඩුවක් හෝ ඉඳි කිරීම කළ යුතුය.
- සකස් කර ගන්නා ලද භාජනයෙහි පතුලටම අඟල් 6 ක පමණ වියළි කොළ රොඩු ස්ථරයක් යොදන්න. එම ස්ථරයට ඉහළින් තවත් ගොම හා කාබනික ද්‍රව්‍ය අඩි 2 ක් පමණ පුරවා ගන්න. ඒ මතට ගොම හා සපයා ගන්නා ලද රතු ගැබවිල් පණුවන් මිශ්‍රණය ඒකාකාරීව විසුරුවා හරින්න.
- එම භාජනයට අවශ්‍ය තෙතමනය, වාතාශ්‍රය හා සෙවන ලබා දෙන්න. මසකට පමණ පසු ගැබවිල් කොමිපෝස්ට් පොහොර ලබාගත හැකිය. වැඩි තෙතමනය ඉවත් කිරීමට තබන ලද පිටාර සිදුර මගින් ගැබවිල් දියර පොහොර ද එකතුකර ගැනීමේ හැකියාව ඇත.



5.7 ගැඩවිල් කොම්පෝස්ට් පොහොරවල ප්‍රයෝජන

- ගුණාත්මයෙන් ඉතා ඉහළය.
- කොම්පෝස්ට් සෑදීමට ගතවන කාලය අඩුය.
- ගොඩ පෙරළීමක් අවශ්‍ය නොවේ.
- කොම්පෝස්ට් සෑදීමට ශ්‍රම අවශ්‍යතාවය අඩුය.
- බෝග වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂකවලට අමතරව ශාක වර්ධනය ඉහළ නංවන සංයෝග ප්‍රතිජීවක පාංශු එන්සයිම සහ හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ද අන්තර්ගතය.
- ගැඩවිල් කොම්පෝස්ට් පොහොර භාවිතයෙන් බෝග අස්වැන්න ප්‍රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව ඉහළ යයි.
- එමෙන්ම බෝගවල රෝග පළිබෝධවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉහළ යයි.

6. ගැඩවිල් පණු දියර පොහොර

6.1 ගැඩවිල් පණු දියර පොහොර

බඳුනක් තුළ අඩංගු කර ඇති කාබනික ද්‍රව්‍ය ගැඩවිලින්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් ජීර්ණය කිරීමට සලස්වා එමගින් නිපදවන ද්‍රව්‍ය හා ගැඩවිල්ලන් විසින් නිපදවන සියළු ශ්‍රාවයන් ජලයේ දිය වීමෙන් පසු බඳුනේ පතුලේ එකතුවන දියරය ගැඩවිල් දියර පොහොර ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

මෙසේ එකතුවන දියරය බඳුනේ පතුලේ සවි කර ඇති කරාමයක් මගින් ඉවත් කරගෙන එම දියරය ජලය සමඟ මිශ්‍ර කර පොහොරක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

එහි නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් සහ පොටෑසියම් යන ශාක පෝෂක, අංශු මාත්‍ර පෝෂක මෙන්ම ශාක වර්ධනයට හේතුවන රසායනික ද්‍රව්‍යයන් ද අන්තර්ගතය. එපමණක් නොව එහි නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියාවන් හා පොස්පේට් දිය කිරීමට උපකාරවන බැක්ටීරියාවන් ද අඩංගු වේ.

ගැඩවිල් පණු දියර පොහොර

- ගුණාත්මයෙන් ඉහළය
- පහසුවෙන් නිපදවා ගත හැකියි
- නිෂ්පාදන වියදම ඉතා අඩුය
- 100% ක්ම පරිසර හිතකාමී දියර පොහොරකි

6.2 යෙදීමේ වාසි

- ලෙඩ රෝග කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධීතාවය ඇතිකරයි
- පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවී ගහනය ඉහළ නංවයි
- බෝග අස්වැන්න ඉහළ නංවයි
- කාබනික ද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීම වේගවත් කරයි

6.3 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය


- ගැඩවිල් පණුවන් (ගොමවල සිටින, රතු පැහැති)
- ගඩොල් හා රළු වැලි
- අමු ගොම
- කාබනික ද්‍රව්‍ය
- ප්ලාස්ටික් බැරලයක් (ලීටර 200 - 250 ධාරිතාවය)
- ලීටර 10 පමණ ධාරිතාවෙන් යුත් බාල්දියක්/මැටි බඳුනක්

ගැඩවිල් පණුවන් රැස් කිරීම

ගැඩවිල් දියර පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා ගැඩවිල් විශේෂ පහක් පමණ අපට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ය. මෙම විශේෂ සොයා ගැනීමට අපහසු අවස්ථා වලදී පහත ක්‍රියා පිළිවෙත අනුගමනය කිරීමෙන් ඒ සඳහා සුදුසු ගැඩවිලුන් සපයාගත හැක.

- ගෙවත්තේ ඇති කුණු ගොඩක් පාදා එය තෙත්කර ඒ මතට සක්කර (උක් හකුරු) ද්‍රාවණයක පොඟවා ගත් තෙත ගෝනියක් දමන්න.
- සතියකින් බැලූවිට ගෝනියේ යටි පැත්තේ ගැඩවිලුන් රාශියක් දැකගත හැකිය.

- එම සතුන් අමු ගොම සහිත බඳුනකට දමා තබන්න. එසේ නොමැති නම් තෙත ගෝනියක් මතට අමු ගොම දමා දින 2 - 3 ක් තබා පසු දින උදෑසන පණුවන් එකතු කර ගත හැකිය.



පණු දියර නොහොර නිෂ්පාදනය කරන ඇටවුම

6.4 ගැඩවිලි පණු දියර සකසා ගන්නා ආකාරය

- ඒ සඳහා ඉහත රූප සටහනේ ආකාරයට ඇටවුමක් සකස් කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ඇටවුම සෙවන සහිත වර්ෂාවට නොතෙමෙන ස්ථානයක සකස් කිරීම ඉතා වැදගත්ය.
- බැරලයේ පතුළට අගල් උසින් සිදුරක් විදි කරාමයක් සවිකර ගන්න.
- රූපයේ ආකාරයට බැරලය ගඩොල් කැබලි කිහිපයක් මත සිටුවා තබන්න.
- බැරලයේ පතුළේ අගල් එකක් පමණ වන ගඩොල් කැබලි අගල් දෙකක තට්ටුවක් අතුරන්න.
- පසුව රළු වැලි තට්ටුවක් අගල් දෙකක් ඝනකමට අතුරන්න.
- ඒ මත අඩි එකක් ඝනකමට අමු ගොම තට්ටුවක් දමන්න.
- ඉන්පසු ඉහත එකතු කරගත් ගැඩවිල් පණුවන් එක් කරන්න (ලීටර් 250 ක බඳුනකට සතුන් 500 ක් දැමීම සුදුසුය).
- ඉන්පසු බඳුන පිරිනතුරු කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කරන්න.
- ප්‍රධාන පෝෂක අන්තර්ගතය ඉහළ නැංවීම සඳහා නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් බහුල ශාක වර්ග : ග්ලිරිසිඩියා හා වල් සූරියකාන්ත කොළ ආදී හා එළවළු අපද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ යුතුය.
- සෑම විටම මෙම උපකරණය තුළ තෙතමනය 75% - 85% අතර පවත්වා ගන්න.

6.5 ගැඩවිල් පණු දියර ලබා ගැනීම

ඉහත ඇටවුමට දින 45 ක් පමණ ගත වූ පසු එය ගැඩවිල් දියර ලබා ගැනීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත්වේ.

- දැන් ලීටර 10 ක පමණ බඳුනක් ගෙන පිටතට වැටෙන පරිදි කපු රෙදි වලින් තැනූ සිහින් තිර එක් කෙලවරක කුඩා ගල් කැටයක් ගැට ගසා බඳුනෙන් පිටතට සිටින සේ රඳවා ගන්න.
- ඉහත රූප සටහනේ දක්වා ඇති ආකාරයට එම බඳුන කොම්පෝස්ට් බඳුනට ඉහළින් රඳවන්න.
- එම බඳුනට ජලය පුරවන්න. එවිට ජලය බිංදු වශයෙන් තිර දිගේ පහළ බඳුනට වැස්සේ.
- පැය 24 කට පසු කරාමය ඇර පණු දියර පොහොර ලබාගත හැක.
- සෑම දිනකම උදෑසන ඉහළින් ඇති ජල බඳුන පුරවන්න.
- මෙසේ දින 10 ක් නොකඩවා දියර පොහොර ලබාගත හැක (ලීටර් 100 පමණ).
- ඉන් පසුව බැරලයෙහි ඇති මිශ්‍රණය ඉවතට ගෙන ගැඩවිලි පණුවන් වෙන්කර තබා ගන්න. පෙර පරිදි ම බැරලය තුළ අළුතෙන් අමුද්‍රව්‍ය නැමිපත් කර නැවත ගැඩවිලි පණුවන් එකතු කරගන්න.

මෙලෙස අඛණ්ඩව ගැඩවිලි දියර පොහොර සකසා ගත හැකිය.



6.6 දියර පොහොර භාවිතය

- කොළ එළවළු සඳහා පණු දියර පොහොර ලීටර් 1 ක් පිරිසිදු ජලය ලීටර් 7 ක් සමඟ මිශ්‍රකර සතියට දෙවතාවක් උදෑසන හෝ සවස් කාලයේ පත්‍ර හොඳින් තෙමී යන සේ ඉසින්න.

- කරල් සහිත බෝග වර්ග සඳහා පණු දියර පොහොර ලීටර් 1 ක් පිරිසිදු ජලය ලීටර් 4 ක් සමඟ මිශ්‍රකර සතියට වතාවක් උදෑසන හෝ සවස් කාලයේ පත්‍ර හොඳින් තෙමී යන සේ ඉසින්න.
- ගෙඩි සහිත බෝග වර්ග සඳහා පණු දියර පොහොර ලීටර් 1 ක් පිරිසිදු ජලය ලීටර් 5 ක් සමඟ මිශ්‍රකර සතියට වතාවක් උදෑසන හෝ සවස් කාලයේ පත්‍ර හොඳින් තෙමී යන සේ ඉසින්න.
- කුඩා පැළ සඳහා දියර පොහොර හා ජලය 1 : 10 අනුපාතයට මිශ්‍ර කර යොදන්න.



ජලය සමඟ වීදු කිරීම



අත් ඉස්නයක් මගින් දියර පොහොර යෙදීම

7. දියර කොම්පෝස්ට් (කොම්පෝස්ට් තේ)

කොම්පෝස්ට් පොහොර, භාවිතා කර වගා කිරීමේ දී කොම්පෝස්ට් විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවීම නිසා ප්‍රායෝගික අපහසුතා මතුවන අවස්ථාවල දී ඒ සඳහා සුදුසු විසඳුමක් ලෙස කොම්පෝස්ට් දියර (කොම්පෝස්ට් ටී) භාවිත කළ හැක.

එනිදි කොම්පෝස්ට් ප්‍රමාණයෙන් අඩක් මූලික පොහොර ලෙස පසට යොදා ඊට පසුව කොම්පෝස්ට් දියර පොහොර වරින් වර ඉසීම මගින් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි අතර, සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයක් සඳහා කොම්පෝස්ට් දියරය සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ කොම්පෝස්ට් කි. ග්‍රෑ. 15 ක ප්‍රමාණයකි. මෙසේ සාදා ගන්නා කොම්පෝස්ට් දියරය “කොම්පෝස්ට් තේ” ලෙස ද හැඳින්වෙයි.

7.1 කොම්පෝස්ට් තේ හි ප්‍රයෝජන

- සියළුම පෝෂක වර්ග පහසුවෙන් ශාකවලට උරාගත හැකි ආකාරයෙන් පවතී.
- කොම්පෝස්ට් තේවල සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් ශාක වර්ධනයට, රෝග පාලනයට හා පරිසර තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමට හැකියාව ශාකවලට ලබාදෙයි.
- කොම්පෝස්ට් තේවල සිටින නිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ශාක මත හා පසෙහි වෙසෙන රෝග කාරක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අඩපණ කිරීමට උපකාරී වේ.
- නවාන් පාලනයේ දී ළපටි පැළවල වර්ධනය වේගවත් කරන උත්තේජකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

පෝෂණ අගය

පෝෂණ ගුණාත්මය	කොම්පෝස්ට් (තේ) දියර පොහොර
පී. එච්. අගය	7.34
ලවණතාවය (ds/m) (1:5)	2.20
නයිට්‍රේට් (%)	2.05
ලබාගත හැකි පොස්පරස් (%)	0.65
පොටෑසියම් (%)	2.63
කැල්සියම් (%)	1.84
මැග්නීසියම් (%)	0.24
සින්ක් (%)	0.03

7.2 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය (වී වගාව සඳහා අත්කරයකට එකවර ඉසීමට)

- ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය බඳුනක් හෝ බැරලයක් (ලීටර් 100 - 200)
- ගුණාත්මයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් කිලෝ 15 ක් පමණ
- සක්කර හකුරු/දුඹුරු සීනි/උක් හකුරු දියර හෝ ඉවතලන පලතුරු කිලෝ ග්‍රෑ. 01 ක් පමණ
- ක්ලෝරීන් මිශ්‍ර නොවූ පිරිසිදු ජලය ලීටර් 75
- කොම්පෝස්ට් බහාලීමට රෙදි කවරයක්
- ලණු කැබැල්ලක් හා ලී දණ්ඩක්
- ආවරණය කිරීමට දැලක්, රෙදි කැබැල්ලක් හෝ ගෝනියක්

7.3 සාදන ආකාරය

- දියර කොම්පෝස්ට් සෑදීමට සිසිල් සෙවන ඇති ස්ථානයක් තෝරා ගන්න.
- කොම්පෝස්ට් හා ජලය ගත යුතු අනුපාතය පරිමාව අනුව කොම්පෝස්ට් 1 : ජලය 5 කි.
- බඳුනට ජලය අවශ්‍ය පමණ දමා සක්කර හෝ උක් හකුරු මිශ්‍ර කරන්න. කොම්පෝස්ට් මල්ල ලණු කැබැල්ලෙන් ගැට ගසා බැරලය තුළ ගිල්වා ලණුවේ අනෙක් කෙළවර දණ්ඩේ මැදින් ඵල්ලන්න.




කොම්පෝස්ට් බැගය බදුන තුළ bැඳවීම

- දිනපතා තෙවරක්වත් කොම්පෝස්ට් මල්ල ජලයේ ගිල්වමින් ඔක්සිජන් හා හොඳින් මිශ්‍ර වන සේ හොඳින් වාතනය කරන්න.
- මදුරුවන් බෝ වීම හා සතුන් වැටීම වැලැක්වීමට පැරණි දැල්/රෙදි කැබැල්ලකින් වසා තබන්න.
- දින 05 - 07 කට පසු භාජනයේ ඇති දියරය බෝගවලට යෙදිය හැක.

සැලකිය යුතුයි

ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුත් කොම්පෝස්ට් තේ සෑදීමේ දී විශේෂ අවශ්‍යතාවය වන්නේ ස්වායු තත්ත්වයක් පවත්වා ගැනීමයි. එම තත්ත්වයන් ලබාදීම සඳහා මිශ්‍රණය අතින්/කෝටුවකින් කලවම් කිරීම හෝ ඔක්සිජන් සැපයුම් උපකරණයක් භාවිතයෙන් වාතනය කළ හැක.



ඔක්සිජන් සැපයුම් උපකරණයක් භාවිතය

7.4 භාවිත කරන ආකාරය

- කොම්පෝස්ට් තේ ජලය සමග 1 : 3 අනුපාතයට මිශ්‍රකර සවස් වරුවේ ඉසිය යුතුය.
 - තවාන් සඳහා දින 7 - 10 වයසේ දී
 - වපුරා/පැළ සිටවා සති 02, 04, 06 කාලවල දී
- වී වගාවේ දී හා එළවළු තවාන්වලදී දිලිරනාශක වෙනුවට බීජ ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස ද භාවිත කළ හැකි අතර, මෙහි ඇති පෝෂක නිසා මුල් ඇදීම හා වර්ධනය ඉක්මන් වේ.

ගුණාත්මය දියුණු කිරීමට

බෝගවල රිකිලි දැමීම හා පඳුරු දැමීම උත්තේජනය සඳහා ග්ලිරිසිඩියා නිස්සාරකය මිශ්‍ර කර යෙදීමත් මල් පිපීම උත්තේජනය සඳහා පොටෑසියම් පෝෂකය වැඩි වල් සූර්යකාන්ත ශාක නිස්සාරකය මිශ්‍ර කර යෙදීමත් පහසුවෙන් කළ හැකිය. අදාළ අනුපාතය වන්නේ, කොම්පෝස්ට් දියර 1 : ශාක නිස්සාරකය 1 : ජලය 5 කි.

8. බෝග වගාව සඳහා මාළු නිස්සාරකය

මාළු නිස්සාරකය යනු ඉවත දමන මාළු හෝ මාළු අපද්‍රව්‍ය (මාළු ඔළු, බොකු, වරලේ, කටු) යොදා ගනිමින් සාදා ගන්නා කාබනික දියර පොහොරකි.



මාළු නිස්සාරකය

පෝෂක සංයුතිය

- නයිට්‍රජන් මි.ලි./ලි. 2.6 - 6.3
- පොස්පරස් මි.ලි./ලි. 0.1 - 0.3
- පොටෑසියම් මි.ලි./ලි. 0.9 - 3.2

8.1 භාවිතයේ ඇති වාසි

- බෝගවල වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂණය සපයයි
- පළිබෝධකයන් පලවා හරියි
- පසේ පෝෂකත්වය හා පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දියුණු කරයි

8.2 අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

- සීල් කළ හැකි පියනක් සහිත බඳුනක් හෝ කුඩා බැරලයක්
- ඉවත දමන මාළු හෝ මාළු අපද්‍රව්‍ය - කිලෝ ග්‍රෑ. 01
- සක්කර හකුරු හෝ උඹුරු සීනි - කිලෝ ග්‍රෑ. 01
- ජලය



සීල් කළ හැකි පියන යහිත බඳුන



අමුද්‍රව්‍ය

8.3 සකස් කරන ආකාරය

1. සීල් කළ හැකි පියන සහිත බඳුනකට මාළු අපද්‍රව්‍ය කිලෝ ග්‍රෑ. 01 ක් දමන්න (එම අපද්‍රව්‍ය කටු සමඟ හොඳින් අඹරා යෙදිය හැකි නම් වඩාත් සුදුසුය).

2. එම බඳුනටම පොඩිකරගත් සක්කර හකුරු හෝ දඹුරු සීනි මුළු ප්‍රමාණයෙන් හරි අඩක් (ග්‍රෑම් 500) දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර අමු ද්‍රව්‍ය පෙරෙන තරමට වතුර දමා පියන තදින් වසා පැසෙන්නට තබන්න.
3. දින 10 - 14 කට පසු එම මිශ්‍රණයට ඉතිරි සක්කර හකුරු හෝ දඹුරු සීනි ප්‍රමාණය ද දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර වසා තවත් දින 14 ක් තබන්න.
4. බඳුන විවෘත කර මිශ්‍රණය පෙරා අඳුරු පැහැති බෝතල් වල සුරියාලෝකයට නිරාවරණය නොවන ලෙස ගබඩා කර තබන්න (මෙම ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් මගින් මුළු නිස්සාරකය ලීටර් 1.5 ක ප්‍රමාණයක් නිපදවා ගත හැක).
5. මිශ්‍රණය පෙරීමෙන් පසු පෙරනයේ ඉතිරි වූ හොඳිරු මාළු කොටස් වලට හැවෙන සක්කර එක්කර පැසීමට හැරිය හැක.
6. මාළු, සක්කර මිශ්‍රණයට ගවමුත් එක් කිරීම මගින් ඉක්මනින් පැසීම සිදුවන අතර පෙරනයේ ගුණාත්මය ද ඉහළ යනු ඇත.



සකස් කර ගත් මාළු නිස්සාරකය

8.4 බෝග සඳහා නිෂ්කාරකය යෙදීම

තවාන් සඳහා

ද්‍රාවණයෙන් මිලි ලීටර් 30 ක් ජලය ලීටර් 10 ක මිශ්‍රකර යොදන්න.

ක්ෂේත්‍රය සඳහා

- බෝග වර්ධනය වන අවස්ථාවේ දී ද්‍රාවණයෙන් මිලි ලීටර් 50 ක් ජලය ලීටර් 10 ක මිශ්‍රකර පත්‍රවලට යොදන්න.
- බෝග වගාවේදී සති 2 කට වරක් යෙදීම කළයුතු වේ. (මෙම මිශ්‍රණය පසට ද යෙදීම කළ හැකිය. පසට යොදන්නේ නම් වසුන් යෙදීම කළ යුතුය).



9. පීචමෘත

පීචමෘත යනු එළ ගවයින්ගේ ගොම, ගව මුත්තා යොදාගනිමින් නිපදවා ගන්නා ක්ෂුද්‍ර පීචි ද්‍රාවණයකි. එබැවින් මෙය භාවිතයෙන් පාංශු ක්ෂුද්‍ර පීචින් සංඛ්‍යාව හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නංවයි. එය කාබනික දියර පොහොරක් මෙන්ම පාංශු සත්කාරකයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.

9.1 පීචමෘත සාදාගැනීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

1. ලිට් 200 පමණ ප්ලාස්ටික් බැරලයක්
2. අමු එළ ගව ගොම : කිලෝ ග්‍රෑම් 10
3. එළ ගව මුත්තා : ලිට් 10
4. සක්කර හකුරු හෝ දුඹුරු සීනි : කිලෝ ග්‍රෑම් 02
5. දෙපියලි බීජ පිටි : කිලෝ ග්‍රෑම් 02
6. වහාත්තරයකින් හෝ දිරාපත් වන කොළ ගොඩක් යටින් ලබාගත් පස් මිටක්
7. පිරිසිදු ජලය : ලිට් 200 පමණ

9.2 සාදා ගන්නා පිළිවෙළ

- ඉහත අංක 2 - 6 දක්වා ද්‍රව්‍ය ප්ලාස්ටික් බැරලයට දමා ලිට් 200 මට්ටම දක්වා ජලය එකතු කර විනාඩි 10 පමණ දකුණු අතට මිශ්‍රණය කෝටුවකින් කරකවන්න.
- මෙසේ දිනකට පස් වරක් දකුණු අතට කෝටුවකින් කරකවා තෙත ගෝනියකින් වසා තබන්න. මේ අන්දමට දින තුනක් මිශ්‍ර කර තබා පස් වන දිනට පසු භාවිතයට ගන්න.



නෛන ගෝත්‍රියකින් ව්‍යා තැබීම

9.3 භාවිතය හා ප්‍රයෝජන

- මිශ්‍රණය පෙරා දියර කොටස් එකකට ජලය කොටස් හතරක් මිශ්‍රකර පත්‍ර තෙමී යන ලෙස වගාව සඳහා ඉසීම කළ යුතු ය.
- පසට එකතු වන පීචමෘතවල වෙසෙන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සුර්යාලෝකයෙන් විනාශ වීම වැළැක්වීම සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ලබාදීම සඳහා යෙදීමෙන් පසුව පිදුරු වැනි වස්තුන් ඇතිවීම වැළැක්වීම වේ.
- පාංශු පෝෂකත්වය ඉහළ නංවමින් බෝග වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරයි.
- එළවළු හා පලතුරුවල සහ මල්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරයි.

සැලකිය යුතුය

පීචමෘත කල් තබාගත නොහැකි බැවින් දින අටකට පෙර භාවිත කර අවසන් කළ යුතු ය.

10. පලතුරු ටොනික්

පලතුරු ටොනික් යනු පලතුරු යොදා ගනිමින් නිපදවා ගන්නා ක්ෂුද්‍ර ජීවී ද්‍රාවණයකි. මෙය භාවිතා කිරීමෙන් පසේ රසායනික හා ජෛවී ලක්ෂණ කෙටි කලකින් වැඩි දියුණු කර ගත හැක. මෙම ද්‍රාවණය පත්‍ර මත ඉසීමෙන් ශාක වර්ධනය හා ඵලදාව ද ඉහළ යයි.

10.1 අක්කරයට අවශ්‍ය ද්‍රාවණය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

1. මුඩිය තදින් වැසිය හැකි ප්ලාස්ටික් භාජනයක් හෝ කුඩා බැරලයක්
2. ඉඳුණු ගස්ලබු : කිලෝ ග්‍රෑම් 03
3. ඉඳුණු කෙසෙල් ගෙඩි : කිලෝග්‍රෑම් 03
4. හොඳින් පැසුණු වට්ටක්කා : කිලෝ ග්‍රෑම් 03
5. සක්කර හකුරු : කිලෝ ග්‍රෑම් 03
6. බින්තර : 02
7. ජලය : ලීටර් 10



10.2 සාදා ගන්නා පිළිවෙළ

- ඉඳුණු ගස්ලඩු, කෙසෙල් ගෙඩි සහ වට්ටක්කා ඉතා කුඩා කැබලිවලට කපා බදුනට දමන්න. එම බදුනටම කුඩු කරගත් සක්කර හකුරු, බින්තර සහ පලය එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.



- ඉන් පසු භාජනයේ කට තදින් වසා දින 45 ක් පැසෙන්නට තබන්න.
- දින 45 කට පසු ද්‍රාවණය පාවිච්චියට සුදුසුය. එය කපු රෙදි කඩකින් පෙරා පාවිච්චියට ගත යුතුය.
- මෙම පලතුරු ටොනික් ද්‍රාවණය ලීටර් එකකට වතුර ලීටර් 20 මිශ්‍ර කර බෝග වගාවට යොදා ගත යුතුය.

10.3 නාවිතය හා ප්‍රයෝජන

- පසේ සාරවත් බව වැඩි කරයි
- පසේ ක්ෂුද්‍ර ජීවී සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිකරයි
- පාංශු සත්කාරකයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි
- බෝගවල වර්ධනය හා අස්වැන්න වැඩි කරයි
- බෝගවල රෝගවලට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව වැඩිකරයි
- පළිබෝධකයින් පලවා හරියි

11. දහසියා අඟුරු

සහල් නිපදවීමේ දී ඉවත්වන දහසියා පාලිත තත්ත්ව යටතේ අර්ධව දහනය කර ගැනීමෙන් දහසියා අඟුරු සකස් කර ගනු ලැබේ.

11.1 දහසියා අඟුරු භාවිතයේ ඇති වාසි

- ශාකයේ වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක හා ප්ලය රදවා තබාගන්නා මාධ්‍යක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් පෝෂක අපතේ යාම මගහරවයි.
- දහසියා අඟුරුවල සිලිකන් නම් වූ ශාක පෝෂකය බහුලව අඩංගු වේ.
- සිලිකන් පෝෂකය මගින් ශාකයේ දැඩි බව වැඩි වන අතර, මේ නිසා රෝග පළිබෝධ හානි අවම වේ.
- මුල්වල වර්ධනයට අවශ්‍ය මෘදු බවක් පසට ලබාදෙන බැවින් හොඳින් වර්ධනය වූ මූල පද්ධතියක් සහිත ශාකයක් ලැබේ.
- දහසියා අඟුරු මගින් පසේ ප්ල වහනය වැඩි දියුණු කරයි.
- ලවණතාවය මෙන්ම යකඩ විෂවීම වළක්වා ගැනීමට එම ගැටලු පවතින ක්ෂේත්‍රවලට යෙදීමට යෝග්‍ය වෙයි.

11.2 දහසියා අඟුරු සකස් කිරීම

මේ සඳහා කුම 02 ක් යොදාගත හැක

- කුන්නාන් විමිනි කුමය
- ගොඩ කුමය

කුන්තාන් විමිනි ක්‍රමය

- හොඳිරන ලද බැරලයක් ගෙන රූප සටහනේ පරිදි දුම් බටයක්, බැරලයේ පතුලට සිදුරක් සාදා වෙල්ඩින් කරගන්න. බැරලයේ තැනින් තැන සිදුරු කරගෙන කුන්තාන් විමිනියක් සාදාගන්න.




පිටවන දුමාරය

ගිනි ගොඩ
වැසෙන පරිදි
තැබූ විමිනිය

කුන්තාන් විමිනිය

- වියළි දර, පොල්කටු කිහිපයක් යොදාගෙන කුඩා ගිනි ගොඩක් සාදා ගන්න. ගින්න හොඳින් ඇවිලෙන විට එම ගිනි ගොඩ වැසෙන පරිදි කුන්තාන් විමිනිය ගොඩාල් කැට කිහිපයක් මත තබන්න.
- කුන්තාන් විමිනිය වැසී යන පරිදි දහයිසා ගොඩගසන්න.

- සාමාන්‍යයෙන් පැය 4 ක් පමණ ගත වූ පසු දහයිසා ගොඩ නැතින් තැන කළුපාට ලප දැකිය හැක. එම ස්ථානවලින් ගිණිදර පිටතට ඒමට පෙර දහයිසා ගොඩේ ඇති නොපිළිස්සුනු දහයිසා මගින් වසා දමන්න. ඒ සඳහා සවලක්/උදැල්ලක් වැනි උපකරණයක් භාවිතා කිරීම වැදගත් වනු ඇත.



නොපිළිස්සුනු දහයිසා මගින් කළුපාට ලප වැරදීම


- පැය 6 කට පමණ පසු ප්‍රවේශමෙන් උදැල්ලකින් හෝ උපකරණයකින් කුන්නාන් විමේනිය වටේ ඇති දහයිසා ඉවත් කර කුන්නාන් විමේනිය ඉවත් කරන්න.
- දහයිසා ගොඩ මැද ඇති ඉතිරි සුන්බුන් ඉවත් කර අර්ධ දහනයට ලක් වූ දහයිසා තවදුරටත් දහනය වීම වැළැක්වීමට වතුර යොදා නිවා ගන්න.
- මේ මොහොත වන විට සියලුම දහයිසා කළු පාටට හුරු ඇඟුරු බවට පත් වී තිබිය යුතුය. කිසි විටකත් රත් වූ බැරලය මතට වතුර යෙදීම නොකළ යුතුය.



දැහැයා ඇහැර

ගොඩ ක්‍රමය


- වියළි ස්ථානයක දැහැයා ගොඩ ගසන්න.



දැහැයා ගොඩ ඇකැනීම හා ගිනි ඇවිලීම

- දැහැයා ගොඩේ මුදුනේ වලක් සකසා ඒ තුළ හොඳින් ගිණි අවුලන ලද පොල්කටුවක් තබා දැහැයා වලින් වසා දමන්න.
- පැය 4 ක් පමණ ගතවන විට දැහැයා ගොඩ මුදුනේ සිට පහළ හා මතුපිටට ගිනිදුර පැතිරී යනු ඇත. මේ අවස්ථාවේ දැහැයා ගොඩ මතුපිට ඇතිවන කළු පාට ලප නොපිළිස්සුනු දැහැයා මගින් වසා දැමිය යුතුය.

- පැය 6 කට පසු සියළු දහයිසා කළු පැහැ ගැන්වෙමින් පවතිනු දක්නට ලැබේ. මේ අවස්ථාවේ දී තවදුරට නොපිළිස්සුනු දහයිසා ඇත්නම් ඒවා උදැල්ලක් හෝ සවලකින් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊටපසු වතුර ඉසිමින් අර්ධ ලෙස දහනය වූ දහයිසා තවදුරටත් දහනය වීම වලක්වා ගන්න.



දහයිසා ගොඩ මුදුනේ යට පහළට යන මතුපිටට ගින්නේ පැතිරීම

- ප්‍රායෝගිකව මෙලෙස දහයිසා අඟුරු නිපදවීමේදී සවස 5 ට පමණ දහයිසා ගොඩට ගිනි තැබීමෙන් පසුව ඔබට උදේ 6 ට පමණ දහයිසා ගොඩ පහසුවෙන් නිවා ගත හැකි වනු ඇත.
- දහයිසා අඟුරු කිලෝ ග්‍රෑම් 250 ක් නිපදවීමට වියළි දහයිසා කිලෝ ග්‍රෑම් 700 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. ආසන්න වශයෙන් කිලෝ ග්‍රෑම් 50 යූරියා උරයකට වියළි දහයිසා කිලෝ ග්‍රෑම් 10 ක් පමණ පිරවිය හැක. එවැනි උර 75 කින් අවශ්‍ය දහයිසා අඟුරු ප්‍රමාණය නිපදවා ගත හැක.

11.3 එළවළු වගාව සඳහා දහයිසා අඟුරු යෙදීම

වලවල් සකස් කරන අවස්ථාවේ දෝතක් බැගින් වලවල්වලට එක්කර පසට කවලම් කිරීම සිදු කරයි.



කුණතාන් විවිභිය



දහයිසා ගොඩ සැකසීම



කළු පහල ලප දහයිසාවලින් වැසීම



අර්ධව දහනය වූ දහයිසා කලවම් කිරීම




ප්ලය සොදා තවදුරටත් දහනය වැළැක්වීම

12. ජීව අඟුරු

ජීව අඟුරු යනු සත්ත්ව හෝ ශාක ද්‍රව්‍ය (කාබනික ද්‍රව්‍ය) ඔක්සිජන් රහිත හෝ ඉතා අඩු ඔක්සිජන් සහිත මාධ්‍යයකදී අධික උෂ්ණත්වයකට (350°C - 600°C) භාජනය කර නිපදවා ගන්නා ද්‍රව්‍යයකි.

ජීව අඟුරු සියුම් සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක් වන අතර ගුණාත්මය තීරණය වනුයේ භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය හා උෂ්ණත්වය අනුවය.



ජීව අඟුරුවල අන්වීක්ෂීය ව්‍යුහය

12.1 ජීව අඟුරු පසට යෙදීම තුළින්

- පසේ ගුණාංග වැඩි දියුණු කරයි.
- ප්‍රලය හා අපද්‍රව්‍ය පෙරණයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- අපද්‍රව්‍ය අධිශෝෂණය කොට විශෝජනය කරයි.
- පාංශු පෝෂක මතු පිටින් උරාගෙන හෙමින් නිදහස් කරයි.
- විෂ රසායන ද්‍රව්‍ය සහ බැර ලෝහ වර්ග ශාකවලට උරා ගැනීමට ඉඩ නොදී රඳවා තබා ගනී.

- කුඩා අවකාශ වල ජලය රඳවාගෙන හෙමින් නිදහස් කරයි.
- නියතයෙන් ශාක වලට ඇතිවන පීඩාව වලක්වයි.
- පසෙහි ආම්ලිකතාව අඩු කරන අතර ශාකවලට පෝෂක ලබා ගැනීම පහසු කරයි.
- පසෙන් ශාක පෝෂක ඉවත් වීම (ක්ෂරණය) වලක්වයි.
- පසෙහි පොස්පරස් සුලභතාවය ඇති කරයි.
- පස තුල ක්ෂුද්‍රජීවීන් හා ගැඩවිල් පණුවන් ප්‍රමාණය වැඩි කරයි.
- වල් පැළෑටි පැලවීම අඩු කරයි.
- කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ දී අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යොදා ගැනීම තුළින්, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී හයිට්‍රජන් වාෂ්ප වී යාම අවම කරලයි.

12.2 ජීව ඇඟුරු නිපදවා ගන්නේ කෙසේද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

- ග්ලිරිසිඩියා, ඉපිල් ඉපිල් වැනි කාෂ්ඨීය දැව කොටස්, ඉවතලන බෝග කොටස් සත්ත්ව මල ද්‍රව්‍ය වැනි කාබනික අපද්‍රව්‍ය හෝ මේවායේ මිශ්‍රණයක්.
- ලොකු බැරලයක් - අඩි 2 - 2 1/2 පමණ විෂ්කම්භය ඇති පියන හා පතුල ඉවත් කරන ලද විවෘත බැරලයක්.
- කුඩා බැරලයක් - අඩි 1 ක් පමණ විෂ්කම්භය ඇති කට විවෘත බැරලයක් : මෙම බැරලය ලොකු බැරලයට වඩා අඩි 1/2 ක් පමණ උසින් අඩු විය යුතු ය.
- හොඳින් ගිනි ඇවිලවීම සඳහා පොල් කටු දර කැබලි ආදිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට.

සකසන ආකාරය :-

- විශාල බැරලය පතුලට ආසන්නයෙන් කවුළු කීපයක් (4 ක් පමණ) කපාගන්න.
- කුඩා බැරලය තුළ ජීව අගුරු සකසා ගැනීමට යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍යය අසුරා පියන වසන්න.



යකකා ගත් විශාල බැරලය හා කුඩා බැරලය

- කුඩා බැරලය පොලව මට්ටමේ සිට අගල් 7 - 8 ක පමණ උසින් සිටින සේ ගඩොල් කැට ආධාරයෙන් තබා ගන්න.
- කුඩා බැරලය මැදි වන සේ විශාල බැරලය තබන්න.
- කුඩා බැරලය හා විශාල බැරලය අතර හිඩැසට කුඩා දුර කැබලි පොල්කටු, දහයියා වැනි දේ පුරවා ගිනි තබන්න.
- මෙම දුර දැව් යන විට නැවත එකතු කරමින් පැය 1 1/2 ක පමණ කාලයක් ඇවිලීමට ඉඩ හරින්න.
- දැව් අවසන් වූ පසු ඉතිරි අගුරු කැබලි හා අළු ලී කැබැල්ලක ආධාරයෙන් විශාල බැරලයේ කවුළු වලින් පිටතට ගෙන ප්ලයෙන් නිවා දමන්න.



කුඩා බැරලය වැදි වන ජෝ විශාල බැරලය තැබීම

- ඉන් පසු කුඩා බැරලය හැකි ඉක්මනින් පිටතට ගෙන ඒ තුළ ඇති පීච අඟුරු බිමට හලා ජලය යොදා නිවාගන්න.

12.3 පීච අඟුරු භාවිතය

- සාදාගත් පීච අඟුරු කඩල ඇට තරම් කුඩා කැබලිවලට කඩාගෙන බෝග වගා කිරීමට පෙර පස සමඟ මිශ්‍ර කරන්න.
- දැනට සිටුවා ඇති බෝග වලට යොදන්නේ නම් බෝගයේ අතු විහිදී ඇති දුරින් බෝගය වටා මුළු වට ප්‍රමාණයෙන් 1/4 ක් පමණ වන සේ කාණුවක් කපා එයට පීච අඟුරු එක්කර පස්වලින් වසන්න.
- අළුතින් බෝග වගාවට සකසන බිමක නම් බිම් සැකසීමේ දී පීච අඟුරු යොදන්න.
- බඳුන් වගාවක නම් බඳුන් මිශ්‍රණයට පීච අඟුරු යොදන්න.
- වී වගාවේ දී නම් පළමු සිසෑමේ දී පීච අඟුරු එක් කරන්න.

- ජීව අගුරු දියර පොහොර සමඟ තුනී දියාරු මිශ්‍රණයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
- ජීව අගුරු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් දිරාපත් නොවන බැවින් වරින් වර යෙදීම අවශ්‍ය නොවේ.
- පසක භෞතික, රසායනික හා ජෛව ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සරලම විසඳුම ජීව අගුරු භාවිතය බව තහවුරු කර ඇත. එබැවින් පරිසර හිතකාමීවූත් තිරසාරවූත් කෘෂි කර්මාන්තයක් උදෙසා ඔබේ ගොවිබිම් ජීව අගුරු යොදා පෝෂණය කරන්න.
- වලවල් සකස් කරන අවස්ථාවේ දෝතක් බැගින් වලවල්වලට එක්කර පසට කලවම් කිරීම සිදු කරයි.

තාක්ෂණික කමිටුව

ජගත් සුදසිංහ (අධ්‍යක්ෂ - ව්‍යාප්ති හා පුහුණු)
ආචාර්ය එම්.එස්. නිජමුදින් (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ)
සීතා වයලට් (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - අධ්‍යාපන)
රේණුකා ද සිල්වා (ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ)
එච්. ඔමුණුආරච්චි (ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ)
පී.එන්. අරුණාචලක (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන)
ටී.පී.පී.ඩී. ජයසිංහ (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන)
ප්‍රදීප් රණසිංහ (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන)
ප්‍රියංගා දිසානායක (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)

විධායක සම්බන්ධීකරණය හා සංස්කරණය

එච්.එම්. ජයන්තා ඉලංකෝන් මැණිකේ (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - සංවර්ධන)

ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ඩබ්.එල්. නිරාන් පීරිස් (අධ්‍යක්ෂ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන)
එන්.ඒ.ආර්.ජේ. පෙරේරා (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන)

සහාය ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ලක්මිණී නාරංගම්මහ (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
එච්.එම්. උදයානි හේරත් (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

පරිගණක පිටු සැකසුම

එන්.ඒ. ලසන්තා කුමාරි විරසිංහ
දේවිකා විගෝදනි
කුමුදු සෙනෙවිරත්න
දුලාංජලි කොශලො පෙරේරා
ජේ. මධුශානි ඒකනායක
සාදමාලි කරුණාරත්න
ජයලත් කුමාරතුංග
සංගීති ගුණසිංහ
රුවනි යශෝධරා
රොෂානි සේනාරත්න
ගෝතමී ලියනගේ

පිටිකවරය සැකසුම

ගයානි දිල්ලිංකි ඊරියගම

නිර්මාණය

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය