




වි වගාවේ කෙළුනු අන් භොග



ආයුර්වේද දැනගන්න

කේ. රෝහණ නිලකසිරි
ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ

එච්.එම්.එන්. කාංචනා හේරත්
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

වි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
ආයතනය, බනලගොඩ



වී වගාවේ කෙළවුණු 4වන පොත

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය,
බතලගොඩ
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

පටුන

ඒ වගාවෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගන්න,
අන මිටි සරු කර ගන්න

පිටුව

01. බිම් සැකසීම	05
02. ගුණාත්මක බිත්තර වී භාවිතා කිරීම	07
03. වගාව පිහිටුවීම	08
04. ජල පාලනය	09
05. වල් පාලනය	10
06. පොහොර යෙදීම	11
07. රෝග පළිබෝධ මර්දනය	13
08. අස්වැන්න නෙලීම	14

වී වගාවෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගන්න. අන මිට සරු කර ගන්න



ලංකාවේ වී වගා කරන ගොවිමහතාගේ හට වී වගාවෙන් සරු අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු වත්පිළිවෙත් ඉතා සරලව මෙහි විස්තර කර ඇත. මෙම වගා පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමෙන් වී ගොවිතැනේ යෙදෙන ඔබට ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නිසැක වම හැකි වනු ඇත.

1. බිම් සැකසීම

මෙය වී වගාවේ සාර්ථකත්වයට බලපාන ඉතාම වැදගත් කටයුත්තකි. නිවැරදි බිම් සැකසීමක් මගින් ලැබෙන වාසි රැසක් ඇත. වල් මර්දනය හරියාකාරව සිදු කිරීම බිම් සැකසීමේ ප්‍රධානතම අරමුණකි. එසේම ගොයම් ශාකයේ මූල පද්ධතිය හොඳින් වැඩීමට ද ප්‍රමාණවත් ගැඹුරක් ඇතිවෙන පරිදි බිම් සැකසීම කළ යුතුය. මූල පද්ධතිය හොඳින් ගැඹුරට වැඩෙන විට ශාකයට පසේ ඇති පොහොර උරා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන නිසා හොඳ වර්ධනයක් ඇති වේ. එය වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීමට ප්‍රධාන වශයෙන් උපකාරී වේ.

නිවැරදිව බිම් සකසන්නේ කෙසේද?

පුරං හිය (පළවන හිය) පසේ සාමාන්‍ය තෙතමනයක් තිබෙන විට පස් පිඩැල්ල කපා වල් ශාක පසට යට වන පරිදි පස පෙරළන්න. මේ සඳහා තැටි නගුල හෝ හැඩලෑලි (මෝල්ඩෝඩ්) නගුල මෙන්ම ගැමි නගුල ද භාවිතා කළ හැකි වේ. බිම් පෙරලීමෙන් පසු පිඩැල්ලේ අඩක් වැසෙන පරිදි ජලය බැඳ සති දෙකක් පමණ තබන්න.



අධිකව චරෙන වගල් කුඹුරුවල හැර අනෙක් කුඹුරුවල පලවෙහි සී සෑම සඳහා රොටවේටරය භාවිතා කිරීමෙන් වලකින්න.

දෙවන බිම් සැකසීම - මෙහිදී පස් පිඩැලි කැට පොඩිකර මඩ කිරීමක් සිදුවේ. මේ සඳහා රොටවේටරය සුදුසු උපකරණයකි. මෙම සී සෑමට පසුව ජලය කඩා හැරීම නොකල යුතුය. සී සෑමට පසුව දින 5 ක් - 7 ක් පමණ අඩු ජල මට්ටමක් පවතින සේ තබා ගන්න.



මෝම් කිරීම - මෙය වී වගාවට ඉතාම වැදගත් කටයුත්තකි. නිසි ලෙස මට්ටම් නොකළ කුඹුරක ජලය චිකාකාරව බැඳ තැබීමට නොහැකි නිසා වල් පාලනය හරි හැටි කළ නොහැකිවීම, පොහොර චිකාකාරීව යෙදීමට නොහැකිවීම වැනි ගැටලු මතු වේ.



2. ගුණාත්මක බිත්තර වී භාවිතා කිරීම

හොඳ වගාවක් සඳහා ප්‍රමිතියෙන් යුතු බිත්තර වී වගාවට භාවිතා කළ යුතුය. මේ සඳහා සහතික බිත්තර වී සාමාන්‍ය වගාව සඳහා නිර්දේශ කර ඇත. මෙම සහතික බිත්තර වීවල පැලවීමේ ප්‍රතිශතය 85% වඩා වැඩිවිය යුතු අතර, තෙතමනය 13% වැඩි නොවිය යුතුය. වල් වී සහ වෙනත් බෝගවල බීජ මිශ්‍ර වී නොතිබිය යුතුය. බිත්තර වී ග්‍රෑම් 500 ක වල් බීජ 10 කට වඩා අඩු විය යුතුය.



සහතික බිත්තර වී නොමැති අවස්ථාවලදී ස්වයං බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කර ගත හැක.

බිත්තර වී පැල කිරීමේදී පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා බොල් ඉවත් කර පොඟවා ගත යුතුය. පිරිසිදු ජලයේ පැය විසිහතරක් (දිනක්) පොඟවා යහන් කළ යුතුය. පොලිසැක් බෑග්වල වී පැල කිරීම සුදුසු නැත. යහන් කර තබන කාලය වී වැපිරීමේ ක්‍රමය අනුව වෙනස් වේ.

යහන් කිරීමට පෙර කෲසර් හෝ ගවුණෝ යන කෲම් නාශකයකින් බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම මඟින් ගොයම් පැල කාලයේ පැතිරීමට ඉඩ ඇති පැළ මැක්කාගේ හානිය වලක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

3. වගාව භින්නවීම

පැය 36 ක් හෝ පැය 48 ක් යහන් කර මුල් අද්දවා පැල කර ගත් බිත්තර වී වැපිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමයයි. මෙහිදී වී පැලවීමත් සමගම වල් බීජද පැලවී මතුවන නිසා වල් මර්ධනය බොහෝදුරට අපහසු වේ.



පැල සිටුවීමේ ක්‍රම අනුගමනය කළ විට සති දෙකක් පමණ වැඩුණ පැලයක් සිටවන නිසා පැල සිටවීමට පසුව ජලය බැඳ තැබීමෙන් පහසුවෙන් වල් මර්ධනය කළ හැකි වේ.

පැල සිටවීමේ යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් සහ පැරණි ක්‍රමයෙන් මෙම පැල සිටවීම කළ හැක.

පැරණි ක්‍රමය භාවිතා කිරීම බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කිරීමේදී වඩාත් සුදුසුයි. මෙම ක්‍රමයට බීජ අවශ්‍යතාවය සාමාන්‍ය වැසිරීමට වඩා 75% ක ඉතිරියක්ද ඇති අතර වල් නාශක අවශ්‍ය නොවීමද විශේෂ වාසියකි.



4. ජල භාලනය

වී බෝගය ජලයට ඉතා සංවේදී බෝගයකි. නමුත් විය ජලජ පැලෑටියක් නොවන නිසා ජලය අනවශ්‍ය ලෙස බැඳ තැබීම අවාසි සහගත වේ. ජලය බැඳ තැබීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වල් පාලනයයි. ගොයම පඳුරු දමන අවධියේදී ජලය වැඩිපුර උසට බැඳ තැබීමෙන් පඳුරු දැමීම අඩුවේ.

ගොයම හීන් බංඩි අවධියට විලඹෙන අවස්ථාවේදී (පුෂ්ප අංකුර හට ගන්නා අවස්ථාවේදී) ජලය හිඟ තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් පඳුරේ සරු රිකිලි හට ගැනීම අඩු වීමට හේතු වන අතර, පිදෙන අවධියේ දී ජල හිඟයක් ඇති වුවහොත් පුෂ්ප පරාගනය අඩුවී බොල් හට ගැනීම සිදුවේ. මේ නිසා අස්වැන්න අඩුවේ.

පිදීමෙන් සති දෙකකට පසුව ජලය බැඳ තැබීම අවශ්‍ය නොවේ. පසේ ඇති තෙතමනය ප්‍රමාණවත් වේ.

5. වල් පාලනය

වල් පාලනය වී වගාවේ අස්වැන්න කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් ඇති කරයි. වල් පාලනය නොකිරීම නිසා ගොයමේ වර්ධනය බාල වීම සහ පඳුරු දැමීම අඩු කරයි.



වල් පාලනය සඳහා ඒකාබද්ධ ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වේ.

වගාවට පෙර වනාන්ත හා ඇල වේලි ශුද්ධ කිරීම මගින් වල් බීජ කුඹුරට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම.

වල් බීජවලින් තොර පිරිසිදු බිත්තර වී භාවිතා කිරීම.


විධිමත් ලෙස බිම් සකස් කර කුඹුරේ ඇති වල් ශාක සහ වල් බීජ විනාශ කිරීම.

වැසිරීම වෙනුවට පැල සිටවීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කර ජලය බැඳ තැබීමෙන් වල් බීජ පැලවීම වැළැක්වීම.

ගොයමේ මුල් අවධියේ දී ජල පාලනය මගින් වල් බීජ පැල වීම අවම කිරීම.

තැන තැන වල් පැලෑටි ඇති නම් ඒවා ගලවා ඉවත් කිරීම.

ගොයම් කැපීමට පෙර මාරුක්, ගොජරවාළි වැනි තෘණ ශාකවල කරල් ඇතිනම් ඒවා කපා කුඹුරෙන් ඉවතට දැමීම මගින් පසේ ඇති වල් බීජ ප්‍රමාණය අඩු කිරීම.



අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී සුදුසු වල් නාශක නිර්දේශය අනුව යෙදීම. වල් නාශක භාවිතයේ දී චිකම් කේත අංකය සහිත වල් නාශක නැවත නැවත යෙදීම නොකල යුතුය.

6. පොහොර යෙදීම

සාර්ථක වී වගාවක් සඳහා කාබනික සහ රසායනික පොහොර දෙවර්ගයම භාවිතා කළ යුතුය. කාබනික පොහොර ලෙස පෙර කන්නයේ ඉතිරි වූ ඉපහැල්ල සහ පිදුරු පලවෙහි බිම් සැකසීමේදී පස පෙරලා පසට යට කිරීම කළ හැක. මේ මගින් අක්කරයට කාබනික ද්‍රව්‍ය ටොන් දෙකක් පමණ එකතුවේ. කර දහයියා කිලෝ ග්‍රෑම් 250 ක් පමණ අක්කරයකට එක් කිරීමෙන් පසේ ගුණාත්මය වැඩි දියුණු කළ හැකි වේ. එවිට රසායනික පොහොර පසේ රඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන නිසා ගොයම් සාර්ථකව වර්ධනය වීමට උපකාරී වේ.


රසායනික පොහොර යෙදීමේදී පහත නිර්දේශ අනුව පොහොර යෙදීම මගින් වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වේ.



අතරමැදි කලාපය සහ විශ්ලි කලාපය
(චාර් ඡලයෙන් වගා කරන කුඹුරු සඳහා)

වයස් කාණ්ඩය	යොදන කාලය (සිටුවීමට හෝ වැසිරීමට පසු)	පොහොර වර්ගය හා ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර එකකට කිලෝග්‍රෑම්)			
		යුරියා	ටී.එස්.පී.	එම්. ඩී. පී.	සින්ක් සල්ෆේට්
මාස 3 සඳහා	මූලික		55		5
	සති 2	50			
	සති 4	75		25	
	සති 6	65		35	
	සති 7	35			
එකතුව		225	55	60	5
මාස 3 1/2 සඳහා	මූලික		55		5
	සති 2	50			
	සති 4	75		25	
	සති 6	65		35	
	සති 8	35			
එකතුව		225	55	60	5
මාස 4 සඳහා	මූලික		55		5
	සති 2	50			
	සති 4	75		25	
	සති 7	65		35	
	සති 9	35			
එකතුව		225	55	60	5

රසායනික පොහොර ලෙස නයිට්‍රජන් ලබා දීමට පත්‍ර වර්ණ දර්ශකය භාවිතා කිරීම මඟින් ශාකයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් යූරියා පොහොර යෙදිය හැක. පොස්පරස් (පී.ඒස්.පී) සහ පොටෑසියම් (ඒම්.ඕ.පී) පස් පරීක්ෂාව සිදු කර ඊට අනුව



පසට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය යෙදිය හැකිය. මේ මඟින් පොහොර අපතේ යාම වලක්වා ගැනීමට මෙන්ම ශාකයට පොහොර හිඟයක් ඇති නොවීමටද හැකි වන පරිදි කාර්යක්ෂමව පොහොර යෙදිය හැකි වේ.

7. හේඟ පළබෝධ වර්දනය

වී වගාවට හානි කරන ප්‍රධාන කෘමි පළිබෝධකයින් සහ රෝග පාලනය සඳහා කටයුතු කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ඉවක් බවක් නොමැතිව කෘමි නාශක භාවිතා කිරීම මඟින් කෘමි උවදුරු තවත් උග්‍ර වීමටද ඉඩ ඇති අතර, අනවශ්‍ය වියදම් දැරීමටද සිදුවේ. මේ නිසා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම වේදය අනුගමනය කිරීම ඉතාම වැදගත් වේ.

- කන්නයට වගා කිරීම හා යාය එකට වගා කිරීම
- ගුණාත්මක බිත්තර වී භාවිතා කිරීම
- බිම් සැකසීම වගාව ඇරඹීමට පෙර ප්‍රමාණවත් කාලයක් ඇති පරිදි සිදු කිරීම.
- බීජ ප්‍රතිකාර කර වගා කිරීම.
- නියමිත පැල ගහනයක් පවත්වා ගැනීම.
- වල් පාලනය නිසි ලෙස සිදු කිරීම.
- සමබර පෝෂක කළමනාකරණය

- කර දහයිසා පසට එක් කිරීම මගින් සිලිකන් පෝෂකය ලබා දීම වැනි වගා පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම මගින් රෝග පළිබෝධ හානි ඇතිවීම අවම කරගත හැකිවේ.

වගා ක්ෂේත්‍ර නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කළ යුතු අතර, අතර්ගත අවස්ථාවලදී නිර්දේශිත රසායනික ද්‍රව්‍ය නිර්දේශිත ආකාරයට යෙදීම කළ යුතුයි.



8. අස්වැන්න නෙලීම

වී වගාවේ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු වල අවසන් කටයුත්ත ලෙස අස්වනු නෙලීම සලකනු ලබයි. වර්තමානයේ වී අස්වනු නෙලීම සංයුක්ත අස්වනු නෙලනය භාවිතයෙන් සිදු කරන නිසා අස්වනු නෙලීමේදී සිදු වන අස්වනු හානිය ඉතා ඉහල මට්ටමක පවතී.

මෙම අස්වනු හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුය.

- ගොයම 85% ක් පැසීම ඇති විට අස්වනු නෙලීම කළ යුතුය.
- ගොයමේ 50% ක් පිදීම සිදුව ඇති දින සිට දින 30 කදී අස්වනු නෙලීම කළ යුතුය.
- හොඳින් නඩත්තු කල යන්ත්‍ර භාවිතා කල යුතුය.
- යන්ත්‍ර වල නිවැරදි වේගය භාවිතා කල යුතුය.

අස්වනු නෙලීමට පසුව තෙතමනය 13% වන තුරු වියලා ගබඩා කිරීම කළ යුතුය.

වී වගාවේ කෙළතු 4න් 1ොන

නෘෂණික දායකත්වය

කේ. රෝහණ ත්ලකසිරි
ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ

ඩී.ඩී.ඩී. කාංචනා හේරත්
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, බතලගොඩ

ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ඩබ්ලිව් ඩල් හිරාන් පීරිස්
ආර්.පී. අපිත් ගුණසේකර

සහාය ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ලක්මණි නාරංගම්මන

පිට කවරය නිර්මාණය සහ පිටු නිර්මාණය

ඩී.පී. ලසන්තා කුමාරි වීරසිංහ

නිර්මාණය

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය

මුද්‍රණය

කෘෂිකර්ම ප්‍රකාශන ඒකකය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය



වි වගාවේ කෙළවුණු අතට පොත

වි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
ආයතනය, බතලගොඩ



Designed by:
NATIONAL AGRICULTURE INFORMATION & COMMUNICATION CENTRE,
Department of Agriculture