ICS 11.020
C 60

中华人民共和国国家标准

GB 17149.5—1997

化妆品甲损害　诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management of nail damage induced by cosmetics

1997-12-15 发布　　1998-12-01 实施

自2017年3月23日起，本标准转为推荐性标准，编号改为GB/T 17149.5-1997。

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部　发布

根据中华人民共和国国家标准公告(2017年第7号)和强制性标准整合精简结论，本标准自2017年3月23日起，转为推荐性标准，不再强制执行。

前　　言

为配合中华人民共和国《化妆品卫生监督条例》的实施特制定本标准。

本标准规定的诊断标准和处理原则，涉及化妆品引起的指、趾甲损害。

本标准从 1998 年 12 月 1 日起实施。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位：解放军空军总医院、北京协和医院、南京医学院第一附属医院、大连医学院第二附属医院。

本标准主要起草人：袁兆庄、蔡瑞康、刘玮、赵辨、黄畋。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

中华人民共和国国家标准

化妆品甲损害　诊断标准及处理原则

GB 17149.5—1997

Diagnostic criteria and principles of management of nail damage induced by cosmetics

化妆品甲损害是指应用甲化妆品所致的甲本身及甲周围组织的病变。

1 范围

本标准规定了化妆品甲损害的诊断及处理原则。

本标准适用于化妆品引起的甲及甲周组织损害，不适用于甲及甲周组织非化妆品病变及其指(趾)甲病。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 17149.2—1997　化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则

3 诊断原则

有明确的甲化妆品接触史，在甲及甲周发生病变，停用化妆品后可逐渐恢复正常。应除外其他甲病，必要时做斑贴试验(GB 17149.2)，以协助诊断。

4 诊断标准

4.1　化妆品甲损害必须是在应用甲化妆品如甲油、染料、甲清洁剂等之后发生。

4.2　化妆品甲损害表现为甲板变形、软化剥离、脆裂、失去光泽，有时也可伴有甲周皮炎症状，如皮肤红肿甚至化脓、破溃，自觉疼痛。

4.3　应除外其他原因引起的甲损害，如真菌、球菌、物理损伤、营养性甲改变等。

4.4　停用化妆品后，甲可逐渐恢复正常，甲周皮炎不再复发。

4.5　必要时做斑贴试验(GB 17149.2)以协助诊断。

5 处理原则

5.1　停用甲化妆品

5.2　清除甲及甲周残留的化妆品。

5.3　按一般甲损伤及甲周皮炎对症治疗。

国家技术监督局1997-12-15批准　　1998-12-01实施

附 录 A

（提示的附录）

正确使用标准的说明

A1 化妆品甲损害常见下列病变：由清洁甲板的有机溶剂引起的，如甲失去光泽、变脆、变形、纵裂等；由纤维型胶引起的勺状甲、甲沟炎；由染料等引起的甲周围皮炎等。须依据病史及症状综合分析方能作出诊断。

A2 其他甲及甲周病变有多种原因，如营养缺乏、内脏疾病、高原气候、物理因素、真菌及细菌感染等，应予以排除。

A3 对指（趾）甲做显微镜观察有助于确诊，对甲化妆品做化学分析及必要的斑贴试验（见GB 17149.2），有利于化妆品甲损伤及甲周皮炎的确诊。