ICS 11.020
C 60

中华人民共和国国家标准

GB 17149.6—1997

化妆品光感性皮炎诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management of photosensitive dermatitis induced by cosmetics

1997-12-15发布 1998-12-01实施

自2017年3月23日起，本标准转为推荐性标准，编号改为GB/T 17149.6-1997。

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部 发布

根据中华人民共和国国家标准公告(2017年第7号)和强制性标准整合精简结论，本标准自2017年3月23日起，转为推荐性标准，不再强制执行。

前　　言

为配合中华人民共和国《化妆品卫生监督条例》的实施特制定本标准。

本标准规定的诊断标准和治疗原则仅涉及化妆品引起的光感性皮炎。

本标准从 1998 年 12 月 1 日起实施。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位:解放军空军总医院、大连医学院第二附属医院、南京医学院第一附属医院、北京协和医院。

本标准主要起草人:黄畋、蔡瑞康、刘玮、赵辨、袁兆庄。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

中华人民共和国国家标准

化妆品光感性皮炎诊断标准及处理原则

GB 17149.6—1997

Diagnostic criteria and principles of management of photosensitive dermatitis induced by cosmetics

化妆品光感性皮炎是指使用化妆品后，又经过光照而引起的皮肤炎症性改变，它是化妆品中的光感物质引起的皮肤粘膜的光毒反应或光变应反应。

1 范围

本标准规定了化妆品光感性皮炎的诊断及处理原则。

本标准适用于化妆品引起的光感性皮炎。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 17149.2—1997 化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则

3 诊断原则

有明确的化妆品接触史，又经过光照而在相应部位出现光感性皮炎。必要时可结合光斑贴试验，见附录 A，排除非化妆品引起的光感性皮炎。

4 诊断标准

4.1 有明确的化妆品接触史和光照史。

4.2 皮损主要发生于曾使用化妆品后的光照部位。

4.3 皮损形态多样，可出现红斑、丘疹、小水疱。自觉症状瘙痒；慢性皮损可呈浸润、增厚、苔癣化等。

4.4 发生在口唇粘膜时可表现为肿胀、干裂、渗出等，下唇发病多见或较重。

4.5 病程可迁延，停用化妆品后仍可有皮疹发生，再接触光敏物质后可再发病。

4.6 化妆品光斑贴试验阳性，见附录 A。

4.7 排除非化妆品引起的光感性皮炎。

5 处理原则

5.1 及时清除皮肤上存留的化妆品。

5.2 停止使用致病的化妆品，避免光照。

5.3 根据病情，按光感性皮炎对症治疗。

国家技术监督局1997-12-15批准　　1998-12-01实施

附 录 A
（标准的附录）
皮肤光斑贴试验方法

A1 原理：在皮肤斑试基础上再光照，若对斑试试验物有光变应性，则光照后可产生皮肤迟发型光变态反应。

A2 方法及反应程度判定：

A2.1 将可疑光敏物于患者背部同时做三处斑贴试验或使用斑贴试验胶带同时进行几种不同试验物，见 GB 17149.2—1997 附录 A。

A2.2 光源：一般采用高压汞气石英灯或水冷式石英灯，在前臂屈侧或腹部测定最小红斑量（MED）。

A2.3 24h 后去除三处斑贴试验物，其中一处去除后立即用遮光物覆盖，避免任何光线照射，作为对照；第二处用低于 MED 的亚红斑量照射（主要是 UVB）；第三处用经普通窗玻璃滤过的光源照射（主要是 UVA，时间为 MED 的 20～30 倍）。

A2.4 于照射后 24，48，72h 分别观察结果，反应程度评定同 GB 17149.2。

A3 结果判定：未经光照处出现阳性反应者可参照 GB 17149.2 进行诊断；仅在亚红斑量照射处出现阳性反应可判定为光毒性反应；仅在窗玻璃滤过的光源照射处出现阳性反应可判定为光变应性反应；若后两者均出现阳性反应则说明既有光毒反应又有光变应性反应。

附 录 B
（提示的附录）
化妆品光感性皮炎的常见致敏物及其斑贴浓度

表 B1 化妆品光感性皮炎的常见致敏物及其斑贴浓度

常 见 物	斑贴浓度，%
苯酮（benzophenones）	1
对氨基苯甲酸（p-Aminobenzoic acid）（PABA）	2
二甲苯麝香（musk xylene）	5
芬替克洛（fenticlor）	1
磺胺（sulfanilamide）	5
甲醛（formaldehyde）	1
葵子麝香（musk ambrette）	5
雷弗奴尔（rivanol）	0.1
6-甲基香豆素（6-methylcoumarin）	1
硫氯酚（bithionol）	1
六氯酚（hexachlorophene）	1
硫脲（thiourea）	0.1
氯已定二醋酸盐（chlorhoxidine diacetate）（醋酸洗比泰）	0.5
美蓝（blue methylene）	1
柠檬油（lemon oil）	2
肉桂醛（cinnamaldehyde）	1
三溴沙仑（tribromsalan）	1
三氯生（triclosan）	2
三氯卡因（triclocarban）	1
伞花麝香（moskene）	5

表 B1(完)

常　　见　　物	斑贴浓度,%
四氯-N-水杨酰苯胺(tetrachloro Salicylanilide)	0.1
檀香油(sandalwood oil)	2
酮麝香(musk ketone)	5
盐酸氯丙嗪(chlorpromazine hydrochloride)	0.1
盐酸普鲁麦嗪(promethazine hydrochloride)	1
盐酸二苯羟胺(diphenhydamine hydrochloride)	1
伊红(eosin)	1
荧光素(fluorescein)	50