ICS 11.0.20
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.18—2009

针灸技术操作规范　第18部分：口唇针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 18：Oral and lip acupuncture

2009-02-06 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；
——第2部分：头针；
——第3部分：耳针；
——第4部分：三棱针；
——第5部分：拔罐；
——第6部分：穴位注射；
——第7部分：皮肤针；
——第8部分：皮内针；
——第9部分：穴位敷贴；
——第10部分：穴位埋线；
——第11部分：电针；
——第12部分：火针；
——第13部分：芒针；
——第14部分：锓针；
——第15部分：眼针；
——第16部分：腹针；
——第17部分：鼻针；
——第18部分：口唇针；
——第19部分：腕踝针；
——第20部分：毫针基本刺法；
——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第18部分。

本部分的附录A、附录B为规范性附录，附录C为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分起草单位：成都中医药大学。

本部分主要起草人：余曙光、唐勇、罗玲、曾芳、尹海燕、袁成凯、王静。

引　言

一般标准中所涉及的长度、宽度的计量都要求采用国际单位制，但是人体高矮胖瘦的差异很大，无法采用绝对的标准值描述针灸腧穴部位，只有通过等分折量的方法——骨度折量法描述腧穴部位，才能适用于所有人群和所有个体。1987 年世界卫生组织在韩国汉城召开的国际会议上确定采用“寸”作为针灸经穴标准计量单位。因此，本标准的腧穴定位采用这种计量单位。

针灸技术操作规范　第18部分:口唇针

1　范围

GB/T 21709的本部分规定了口唇针疗法的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项和禁忌。

本部分适用于口唇针疗法技术操作。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

2.1

口针疗法　oral acupuncture therapy

针刺口腔黏膜上的特定穴区以治疗疾病的方法。

2.2

唇针疗法　lip acupuncture therapy

针刺唇部穴位以治疗疾病的方法。

3　操作步骤与要求

3.1　施术前准备

3.1.1　针具选择

3.1.1.1　口针

宜选择直径为0.20 mm～0.25 mm,长度为15 mm～50 mm的毫针。

3.1.1.2　唇针

宜选择直径为0.20 mm～0.30 mm,长度为25 mm～40 mm的毫针。

3.1.2　穴位选择

根据疾病选取穴位或特定分区。附录A、附录B分别给出了口针和唇针腧穴的命名与定位、示意图。

3.1.3　体位选择

口针操作可选择坐位或卧位,唇针操作宜选择卧位。

3.1.4　环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

3.1.5　消毒

3.1.5.1　针具消毒

应选择高压蒸汽消毒灭菌法。宜使用一次性针具。

3.1.5.2　部位消毒

3.1.5.2.1　口针

应用含有1%碘酊或0.5%碘伏的棉签或棉球对施术部位进行消毒。

3.1.5.2.2　唇针

应用含有75%乙醇或0.5%的碘伏棉签或棉球对施术部位进行消毒。

3.1.5.3　医者消毒

医者双手应先用肥皂水清洗,再用75%乙醇或0.5%碘伏棉球擦拭。

3.2 施术方法

3.2.1 口针疗法

3.2.1.1 进针

令患者张口，医者戴上无菌手套一手持无菌纱布捏住患者上唇或下唇，或用消毒棉签暴露施术部位，另一手持针柄将针刺入口腔黏膜穴位或特定分区。根据针刺的部位，选择合适的进针角度和深度。针刺手法，以病人耐受为度，可无针感。

3.2.1.2 留针

参见附录C的C.1.1。

3.2.1.3 出针

医者施术完毕，持针柄将针退出。

3.2.1.4 出针后处理

施术处若出血，宜用消毒干棉签或无菌纱球按压针孔至血止，然后嘱患者用0.9%生理盐水漱口。

3.2.2 唇针疗法

3.2.2.1 进针

医者一手将施术部位两侧皮肤提捏固定，另一手持针柄将针刺入。上唇部穴位沿人中沟向鼻中隔方向斜刺入6 mm～15 mm，以雀啄手法为宜；下唇部穴位平刺入10 mm～30 mm，可不施手法。

3.2.2.2 留针

参见附录C的C.1.2。

3.2.2.3 出针

医者一手固定施术部位两侧皮肤，另一手持针柄将针退出。

3.2.2.4 出针后处理

宜用消毒干棉签按压针孔。

4 疗程及适应证

4.1 口唇针的疗程参见第C.2章。

4.2 口唇针的适应证参见第C.3章。

5 注意事项

5.1 初次接受治疗的患者，应首先消除其紧张情绪。

5.2 如患者出现晕针，按照晕针常规处理法予以处理。

5.3 不配合治疗的小儿，精神病患者，中、重度糖尿病患者，体质过度虚弱者和孕妇应慎用。

6 禁忌

6.1 口腔破溃、化脓、出血或肿瘤处。

6.2 出血性疾病患者。

6.3 严重高血压、心脏病患者。

6.4 金属过敏者。

附　录　A
（规范性附录）
口针腧穴命名与定位、示意图

A.1　口针腧穴命名与定位

A.1.1　上肢区域

在上颌两侧，齿龈黏膜及口腔前庭黏膜处。

A.1.1.1　拇指穴

中切牙中点上齿龈，距牙齿 0.4 寸处。

A.1.1.2　四指外侧穴

中切牙与侧切牙之间齿龈上 0.2 寸处。

A.1.1.3　四指内侧穴

中切牙与侧切牙之间，内侧齿龈上 0.2 寸处。

A.1.1.4　手背穴

侧切牙中点上齿龈，距牙齿 0.5 寸处。

A.1.1.5　手掌穴

侧切牙内侧中点上齿龈，距牙齿 0.5 寸处。

A.1.1.6　手腕外侧穴

侧切牙与尖牙之间齿龈上 0.5 寸处。

A.1.1.7　手腕内侧穴

侧切牙内侧中点上齿龈距牙齿 0.2 寸处。

A.1.1.8　前臂外侧穴

尖牙与第一前磨牙之间齿龈上 0.5 寸处。

A.1.1.9　前臂内侧穴

尖牙与第一前磨牙之间内侧齿龈上 0.5 寸处。

A.1.1.10　肘外穴

尖牙与第一前磨牙之间齿龈上 0.1 寸处。

A.1.1.11　肘内穴

第一、二前磨牙之间内侧齿龈上 0.1 寸处。

A.1.1.12　上臂外侧穴

第二前磨牙与第一磨牙之间齿龈上 0.3 寸处。

A.1.1.13　上臂内侧穴

第二前磨牙与第一磨牙之间内侧齿龈上 0.3 寸处。

A.1.1.14　肩前穴

第一、二磨牙之间齿龈上 0.3 寸处。

A.1.1.15　腋窝穴

第一、二磨牙之间内侧齿龈上 0.3 寸处。

A.1.1.16　肩后穴

第二、三磨牙之间齿龈上 0.3 寸处。

A.1.1.17　肩内穴

第二、三磨牙之间内侧齿龈上 0.3 寸处。

A.1.2 下肢区域

在下颌两侧，齿龈黏膜及口腔前庭黏膜处。

A.1.2.1 足大趾穴

中切牙中点下齿龈，距牙齿 0.5 寸处。

A.1.2.2 四趾穴

中切牙与侧切牙之间齿龈下 0.5 寸处。

A.1.2.3 足掌穴

中切牙中点下齿龈，距牙齿 0.3 寸处。

A.1.2.4 足背穴

中切牙与侧切牙之间齿龈下 0.3 寸处。

A.1.2.5 足跟穴

中切牙中点下齿龈，距牙齿 0.1 寸处。

A.1.2.6 足外踝穴

侧切牙与尖牙之间齿龈下 0.2 寸处。

A.1.2.7 足内踝穴

侧切牙与尖牙之间内侧齿龈下 0.2 寸处。

A.1.2.8 小腿外侧穴

尖牙与第一前磨牙之间齿龈下 0.4 寸处。

A.1.2.9 小腿内侧穴

尖牙与第一前磨牙之间内侧齿龈下 0.4 寸处。

A.1.2.10 膝关节穴

第一前磨牙与第二前磨牙之间齿龈下 0.2 寸处。

A.1.2.11 腘窝穴

第一前磨牙与第二前磨牙之间内侧齿龈下 0.2 寸处。

A.1.2.12 大腿外侧穴

第二前磨牙与第一磨牙之间齿龈下 0.2 寸处。

A.1.2.13 大腿内侧穴

第二前磨牙与第一磨牙之间内侧齿龈下 0.2 寸处。

A.1.2.14 坐骨神经穴

第一磨牙与第二磨牙之间齿龈下 0.2 寸处。

A.1.3 生殖泌尿区域

上颚(包括软腭和硬腭)。

A.1.3.1 泌尿穴

泌尿穴Ⅰ：上颌硬腭前端正中，两中切牙之间内侧，腭乳头上。

泌尿穴Ⅱ：上颌硬腭中点，腭缝两侧 0.2 寸处。

泌尿穴Ⅲ：上颌硬腭与软腭连接处，腭缝两侧 0.2 寸处。

A.1.3.2 生殖穴

生殖穴Ⅰ：上颌两中切牙内侧，第一泌尿穴后，左右旁开 0.1 寸。

生殖穴Ⅱ：上颌软、硬腭连接处，在腭缝两侧旁开 0.1 寸。

A.1.4 头部区域

在下唇系带周围及口腔前庭黏膜组织上。

A.1.4.1 前额穴

下唇系带中点处。

A.1.4.2　头顶穴

下唇系带中点上0.2寸处。

A.1.4.3　枕部穴

下唇系带中点上0.4寸处。

A.1.4.4　颈部穴

下唇系带中点上0.5寸处。

A.1.5　腰部区域

在上唇系带周围及口腔前庭黏膜组织上。

A.1.5.1　尾骶部穴

上唇系带下端中点处。

A.1.5.2　腰部穴

上唇系带中点处。

A.1.6　眼及血压区域

上颌两侧,尖牙与双尖牙上方黏膜处。

A.1.6.1　眼穴

尖牙与第一前磨牙之间齿龈上0.5寸处。

A.1.7　皮肤区域

A.1.7.1　皮肤穴

左右口角处。

A.1.8　神经区域

上、下唇上及上、下颌连接处黏膜皱襞处。

A.1.8.1　三叉神经穴

将上唇正中至口角分为三等分,依次相当于三叉神经1、2、3支。

A.1.8.2　面神经穴

上唇上(根据病变反应点取穴)。

A.1.9　消化区域

位于舌下腔内。

A.1.9.1　咽颊穴

金津、玉液穴下,舌系带旁开0.2寸处。

A.1.9.2　胃穴

舌系带左侧,旁开0.4寸处。

A.1.9.3　肠穴

催乳穴两侧0.7寸处。

A.1.9.4　阑尾穴

舌系带右侧0.7寸处,肠穴之下。

A.1.9.5　胰穴

脾穴与胃穴之间。

A.1.10　脏腑区域

舌下腔内。

A.1.10.1　心穴

舌系带中点向左旁开0.2寸处。

A.1.10.2　肝穴

舌系带中点向右旁开0.3寸处。

A.1.10.3　脾穴

舌系带中点向左旁开 0.4 寸处。

A.1.10.4　胆囊穴

肝穴上 0.1 寸处。

A.1.10.5　肺穴

舌系带根部,旁开 0.2 寸处。

A.1.10.6　肋间穴

舌系带根部与下齿槽连接处旁开 0.2 寸处。

A.2　口针的头、腰、眼、皮肤、神经、消化、脏腑区域穴位示意图

口针的头、腰、眼、皮肤、神经、消化、脏腑区域穴位示意图见图 A.1。



图 A.1　口针的头、腰、眼、皮肤、神经、消化、脏腑区域穴位示意图

A.3 口针的四肢、生殖泌尿区域穴位示意图

口针的四肢、生殖泌尿区域穴位示意图见图 A.2。



图 A.2 口针的四肢、生殖泌尿区域穴位示意图

附　录　B
（规范性附录）
唇针腧穴命名与定位、示意图

B.1　唇针腧穴命名与定位

B.1.1　人中穴
在人中沟的上 1/3 与下 2/3 交点处。

B.1.2　承浆穴
颏唇沟的正中凹陷处。

B.1.3　唇Ⅰ穴
位于人中沟下端正中，距唇缘 0.2 cm 处。

B.1.4　唇Ⅱ穴
位于下唇缘中点向下，距下唇缘 0.5 cm 处。

B.2　唇针腧穴示意图

唇针腧穴示意图见图 B.1。



图 B.1　唇针腧穴示意图

附　录　C
（资料性附录）
适应证、留针时间和疗程

C.1　留针时间

C.1.1　口针留针时间

可留针，留针一般不宜超过 30 min。

C.1.2　唇针留针时间

以 20 min～30 min 为宜。

C.2　疗程

宜隔日 1 次，5 次为 1 疗程，疗程间宜间隔 2 d～4 d。

C.3　适应证

C.3.1　口针适应证

疼痛性疾患，面神经麻痹、小儿麻痹后遗症、中风后遗症、急性腰扭伤、癫痫、痹症、急性结膜炎、口疮、产后缺乳、小儿惊痫、遗尿、呕吐、咳喘、牙龈肿痛、咽喉肿痛、鼻塞等。

C.3.2　唇针适应证

疼痛性疾病、齿龈肿痛、口角流涎、面神经麻痹、脑血管意外、癫痫、精神分裂症等。