ICS 11.020
C 00

中华人民共和国国家标准

GB/T 33414—2016

穴位贴敷用药规范

Specification on Chinese herbal application of acupoint paste

2016-12-30 发布　　2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　药物使用总原则 …… 1
5　使用人群 …… 2
附录 A（资料性附录）　穴位贴敷常用药物功效与主治 …… 3
附录 B（资料性附录）　常用穴位贴敷赋形剂、助透剂功效与特点 …… 7

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出并归口。

本标准起草单位：中国中医科学院中医临床基础医学研究所、山东中医药大学针灸推拿学院。

本标准主要起草人：彭锦、高树中、吴夏秋、马玉侠、雷蕾、于岩瀑、张秀刚、房繄恭。

穴位贴敷用药规范

1 范围

本标准规定了穴位贴敷及其用药的术语和定义、药物使用总原则及使用人群的要求。

本标准适用于穴位贴敷临床应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12346 腧穴名称与定位

GB/T 21709.9—2008 针灸技术操作规范 第9部分:穴位贴敷

中华人民共和国药典 2010年版

3 术语和定义

GB/T 21709.9—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

穴位贴敷 acupoint paste

在穴位上贴敷某种药物的治疗方法。

3.2

助透剂 penetration enhancers

能够增加药物透皮速度或增加药物透皮量的物质。

3.3

赋形剂 excipients

赋予药物以适当的形态和体积的物质。

4 药物使用总原则

4.1 基本原则

应根据中医辨证、辨病原则选择贴敷药物。药物的选择应遵守《中华人民共和国药典》2010年版规定。

温阳益气、通经活络、开窍活血、宣肺止咳定喘类药物为首选药，常用药物参见附录A。

4.2 使用原则

4.2.1 凡是临床上防治疾病有效的方剂，可结合既往的临床经验和地域特点进行加减应用，一般都可以研末或者熬膏作为穴位贴敷用药防治相应疾病。

4.2.2 贴敷用药的使用剂量应遵照《中华人民共和国药典》2010年版规定。

4.2.3 刺激发泡类药物对皮肤具有一定的刺激作用，可使局部皮肤充血、起泡，应通过控制贴敷时间、

贴敷剂量或药物炮制等方式减少对皮肤的刺激作用。

4.2.4 有毒的药物，应按照《中华人民共和国药典》2010 年版规定进行减毒加工后使用，贴敷用量、贴敷时间均应严格遵照《中华人民共和国药典》2010 年版规定。经皮直接吸收有毒的药物禁止作为贴敷原材料。

4.2.5 根据患者病情，按 GB/T 12346 的规定选择相应的贴敷穴位。

4.2.6 贴敷方法、贴敷时间、不良反应的处理按 GB/T 21709.9—2008 的规定进行操作和处理。

4.3 制作原则

4.3.1 药材炮制：刺激发泡类、有毒类药物，均采用道地药材，严格按照《中华人民共和国药典》2010 年版规定进行加工炮制，并调整其配伍比例控制对皮肤的刺激程度。

4.3.2 药物制备：药物制备过程要求在无菌、清洁、常温环境下进行，或者在当地医疗部门的专用制剂室完成。常用剂型参照 GB/T 21709.9—2008。

4.4 贮藏原则

根据需要制备的剂型，将生药粉和赋形剂加工成所需要的剂型，置冰箱冷藏室备用；或者在药物使用的当日制备。经制剂室加工制作的药膏、药丸等剂型，在密封或密闭条件下，处于阴凉、遮光处保存备用。

常用的赋形剂和助透剂的主治与特点参见附录 B。

5 使用人群

5.1 适应证

内外妇儿等各科均可使用穴位贴敷疗法，可用于呼吸系统、心血管系统、消化系统、泌尿系统、内分泌系统、免疫系统等疾病的治疗。

5.2 慎用人群

5.2.1 发热、咯血、糖尿病、血液病、恶性高血压、严重心脑血管病、严重心肝肾功能障碍者慎用。

5.2.2 艾滋病、结核病或其他传染病者等慎用。

5.2.3 伴有意识障碍者慎用。

5.3 禁忌人群

5.3.1 贴敷部位皮肤有创伤、溃疡、感染等情况者禁用(治疗皮肤病者除外)。

5.3.2 对药物或敷料成分过敏者禁用。

5.3.3 孕妇，应避免在下腹部、腰骶部腧穴以及能引起子宫收缩的穴位用药。

附　录　A
（资料性附录）
穴位贴敷常用药物功效与主治

A.1　肉桂：性大热，味辛、甘，归肾、脾、心、肝经。具有补火助阳，引火归源，散寒止痛，温通经脉之功。主治阳萎宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，眩晕目赤，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝腹痛，痛经经闭等病症。内服用量 1 g～5 g，外用适量，有出血倾向者及孕妇慎用。

A.2　乳香：性温，味辛、苦，归心、肝、脾经。具有活血定痛，消肿生肌之功，主治胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，风湿痹痛、经脉拘挛等病症。内服用量 3 g～5 g，外用适量，研末调敷，孕妇慎用。

A.3　没药：性平，味辛、苦，归心、肝、脾经。具有散瘀定痛，消肿生肌之功。主治胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，风湿痹痛等病症。内服用量 3 g～5 g，外用适量，孕妇慎用。

A.4　细辛：性温，味辛，归心、肺、肾经。具有祛风散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮之功。主治风寒头痛，牙痛，鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳等病症。内服用量 1 g～3 g，外用适量。

A.5　白芷：性温，味辛，归肺、胃、大肠经。具有解表散寒，祛风止痛，宣通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓之功。主治感冒头痛，眉棱骨痛，鼻渊，牙痛，带下等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.6　白芥子：性温，味辛，归肺，胃经。具有利气豁痰，温中散寒，通络止痛之功。主治痰饮咳喘，胸胁胀痛，中风不语，肢体痹痛麻木，阴疽肿毒等病症。内服 3 g～9 g，外用适量，研末调敷，贴敷时可能会导致皮肤发泡，应注意观察，及时弃药终止贴敷。

A.7　延胡索：性温，味辛、苦，归肝、脾经。具有活血，行气，止痛之功。主治胸胁、脘腹疼痛，胸痹心痛，经闭痛经，产后瘀阻等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.8　甘遂：性寒，味苦，有毒，归肺、肾、大肠经。具有泻水逐饮，消肿散结之功。主治水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利，风痰癫痫等病症。内服用量 0.5 g～1.5 g，炮制后多入丸散用，外用适量，生用，孕妇禁用。

A.9　吴茱萸：性热，味辛、苦，有小毒，归肝、脾、胃、肾经。具有散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻之功。主治厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻等病症。内服用量 2 g～5 g，外用适量。

A.10　大黄：性寒，味苦，归脾、胃、大肠、肝、心包经。具有泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，利湿退黄之功。主治实热积滞便秘，血热吐衄，目赤咽肿，肠痈腹痛，瘀血经闭，湿热痢疾，黄疸，淋证等病症。内服用量 3 g～15 g，外用适量，孕妇及月经期、哺乳期慎用。

A.11　川芎：性温，味辛，归肝、胆、心包经。具有活血行气，祛风止痛之功。主治胸痹心痛，胸胁刺痛，月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，头痛，风湿痹痛等病症。内服用量 3 g～10 g。

A.12　半夏：性温，味辛，有毒，归脾、胃、肺经。具有燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结之功。主治湿痰寒痰，咳喘痰多，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛，呕吐反胃，胸脘痞闷，痈肿瘰核等病症。内服一般炮制后使用，内服用量 3 g～9 g，外用适量，磨汁涂或研末以酒调敷。

A.13　当归：性温，味甘、辛，归肝、心、脾经。具有补血活血，调经止痛，润肠通便之功。主治血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，风湿痹痛等病症。内服用量 6 g～12 g，外用适量。

A.14　麻黄：性温，味辛、微苦，归肺、膀胱经。具有发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿之功。主治风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿等病症。内服用量 2 g～10 g，外用适量。

A.15　附子：性大热，味辛、甘，有毒，归心、肾、脾经。具有回阳救逆，补火助阳，散寒止痛之功。主治亡阳虚脱，肢冷脉微，心阳不足，胸痹心痛，虚寒吐泻，脘腹冷痛，肾阳虚衰，阳痿宫冷，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛等病症。内服用量 3 g～15 g，外用适量，孕妇慎用。

A.16　黄芪：性微温，味甘，归肺、脾经。具有补气升阳，固表止汗，利水消肿，生津养血，行滞通痹，托毒

排脓，敛疮生肌之功。主治气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，内热消渴，半身不遂，痹痛麻木，痈疽难溃，久溃不敛等病症。内服用量 9 g～30 g，外用适量。

A.17　红花：性温，味辛，归心、肝经。具有活血通经，散瘀止痛之功。主治经闭，痛经，恶露不行，癥瘕痞块，胸痹心痛，瘀滞腹痛，胸胁刺痛等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量，孕妇慎用。

A.18　川乌：性热，味辛、苦，有大毒，归心、肝、肾、脾经。具有祛风除湿，温经止痛之功。主治风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛等病症。一般炮制后用，外用适量，孕妇禁用。

A.19　木香：性温，味辛、苦，归脾、胃、大肠、三焦、胆经。具有行气止痛，健脾消食之功。主治胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食等病症。内服用量 3 g～6 g，外用适量。

A.20　桃仁：性平，味苦、甘，归心、肝、大肠经。具有活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘之功。主治经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，肠燥便秘，咳嗽气喘等病症。内服用量 5 g～10 g，外用适量，孕妇慎用。

A.21　丹参：性微寒，味苦，归心、肝经。具有活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈之功。主治胸痹心痛，脘腹胁痛，癥瘕积聚，热痹疼痛，心烦不眠，月经不调，痛经经闭等病症。内服用量 10 g～15 g，外用适量。

A.22　干姜：性热，味辛，归脾、胃、肾、心、肺经。具有温中散寒，回阳通脉，温肺化痰之功。主治脘腹冷痛，呕吐泄泻，肢冷脉微，寒饮喘咳等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.23　草乌：性热，味辛、苦，有大毒，归心、肝、肾、脾经。具有祛风除湿，温经止痛之功。主治风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛等病症。一般炮制后用，生品内服宜慎，外用适量，孕妇禁用。

A.24　地龙：性寒，味咸，归肝、脾、膀胱经。具有清热定惊，通络，平喘，利尿之功。主治高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，水肿尿少等病症。内服用量 5 g～10 g，外用适量。

A.25　苦杏仁：性微温，味苦，有小毒，归肺、大肠经。具有降气止咳平喘，润肠通便之功。主治咳嗽气喘，胸满痰多，肠燥便秘等病症。内服用量 5 g～10 g，外用适量。

A.26　白术：性温，味苦、甘，归脾、胃经。具有健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎之功。主治脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。内服用量 6 g～12 g，外用适量。

A.27　桂枝：性温，味辛、甘，归心、肺、膀胱经。具有发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气之功。主治风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸等病症。内服用量 3 g～10 g，孕妇慎用。

A.28　赤芍：性微寒，味苦，归肝经。具有清热凉血，散瘀止痛之功，主治热入营血，温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛等病症。内服用量 6 g～12 g，外用适量。

A.29　栀子：性寒，味苦，归心、肺、三焦经。具有泻火除烦，清热利湿，凉血解毒，消肿止痛之功。主治热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡，扭挫伤痛等病症。内服用量 6 g～10 g，外用适量。

A.30　地黄：性寒，味甘，归心、肝、肾经。具有清热凉血，养阴生津之功。主治热入营血，温毒发斑，吐血衄血，热病伤阴，烦渴便秘，阴虚发热，骨蒸劳热，内热消渴等病症。内服用量 10 g～15 g，外用适量。

A.31　五倍子：性寒，味酸、涩，归肺、大肠、肾经。具有敛肺降火，涩肠止泻，敛汗，止血，收敛疮之功。主治肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，自汗盗汗，消渴，便血痔血，痈肿疮毒，皮肤湿烂等病症。内服 3 g～6 g，外用适量。

A.32　胡椒：性热，味辛，归胃、大肠经。具有温中散寒，下气，消痰。主治胃寒呕吐，腹痛泄泻，食欲不振，癫痫痰多等病症。内服用量 0.6 g～1.5 g，外用适量。

A.33　莪术：性温，味辛、苦，归肝、脾经。具有行气破血，消积止痛之功。主治癥瘕痞块，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀痛等病症。内服 6 g～9 g，外用适量，孕妇禁用。

A.34　天南星：性温，味苦、辛，有毒，归肺、肝、脾经。具有散结消肿之功。外用主治痈肿，蛇虫咬伤等病症。生品内服宜慎，外用生品适量，研末以醋或酒调敷。孕妇慎用。

A.35　威灵仙：性温，味辛、咸，归膀胱经。具有祛风湿，通经络之功。主治风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利等病症。内服用量 6 g～10 g，外用适量。

A.36　厚朴：性温，味苦、辛，归脾、胃、肺、大肠经。具有燥湿消痰，下气除满之功。主治湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.37　香附：性平，味辛、微苦、微甘，归肝、脾、三焦经。具有疏肝解郁，理气宽中，调经止痛之功。主治肝郁气滞，胸胁胀痛，疝气疼痛，乳房胀痛，脾胃气滞，脘腹痞闷，胀满疼痛，月经不调，经闭痛经等病症。内服用量 6 g～10 g，外用适量。

A.38　白芍：性微寒，味苦、酸，归肝、脾经。具有养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳之功。主治血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕等病症。内服用量 6 g～15 g，外用适量。

A.39　黄连：性寒，味苦，归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。具有清热燥湿，泻火解毒之功。主治湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢黄疸，高热神昏，血热吐衄，目赤牙痛，消渴，痈肿疔疮，湿疹湿疮，耳道流脓等病症。内服用量 2 g～5 g，外用适量。

A.40　黄芩：性寒，味苦，归肺、胆、脾、大肠、小肠经。具有清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎之功。主治湿温、暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.41　五味子：性温，味酸、甘，归肺、心、肾经。具有收敛固涩，益气生津，补肾宁心之功。主治久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗盗汗，内热消渴，心悸失眠等病症。内服用量 2 g～6 g，外用适量。

A.42　苍术：性温，味辛、苦，归脾、胃、肝经。具有燥湿健脾，祛风散寒，明目之功。主治湿阻中焦，脘腹胀满，泄泻，水肿，风湿痹痛等病症。内服用量 3 g～9 g，外用适量。

A.43　防风：性微温，味辛、甘，归膀胱、肝、脾经。具有祛风解表，胜湿止痛，止痉之功。主治感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风等病症。内服用量 5 g～10 g，外用适量。

A.44　柴胡：性微寒，味辛、苦，归肝、胆、肺经。具有疏散退热，疏肝解郁，升举阳气之功。主治感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.45　茯苓：性平，味甘、淡，归心、肺、脾、肾经。具有利水渗湿，健脾，宁心之功。主治水肿尿少，痰饮眩晕，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠等病症。内服用量 10 g～15 g，外用适量。

A.46　马钱子：性温，味苦，有大毒，归肝、脾经。具有通络止痛，散结消肿之功。主治跌打损伤，骨折肿痛，风湿顽痹，麻木瘫痪，痈疽疮毒，咽喉肿痛等病症。内服用量 0.3 g～0.6 g，入丸散用，不宜多服久服及生用，运动员慎用，有毒成分能经皮肤吸收，外用不宜大面积涂敷，孕妇禁用。

A.47　胆南星：性凉，味苦、微辛，归肺、肝、脾经。具有清热化痰，息风定惊之功。主治痰热咳嗽，中风痰迷，癫狂惊痫等病症。内服用量 3 g～6 g，外用适量。

A.48　芒硝：性寒，味咸、苦，归胃、大肠经。具有泻下通便，润燥软坚，清火消肿之功。主治实热积滞，腹满胀痛，大便燥结，肠痈，乳痈，痔疮肿痛等病症。内服用量 6 g～12 g，外用适量，孕妇慎用。

A.49　陈皮：性温，味苦、辛，归肺、脾经。具有理气健脾，燥湿化痰之功。主治脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多等病症。内服用量 3 g～10 g，外用适量。

A.50　三棱：性平，味辛、苦，归肝、脾经。具有破血行气，消积止痛之功。主治癥瘕痞块，痛经，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀痛等病症。内服用量 5 g～10 g，外用适量，孕妇禁用。

A.51　枳实：性微寒，味苦、辛、酸，归脾、胃经。具有破气消积，化痰散痞之功。主治积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不能，痰滞气阻，胸痹等病症。内服用量 3 g～10 g，孕妇慎用。

A.52　莱菔子：性平，味辛、甘，归肺、脾、胃经。具有消食除胀，降气化痰之功。主治饮食停滞，脘腹胀痛，积滞泻痢，痰壅喘咳等病症。内服用量 5 g～12 g，外用适量。

A.53　花椒：性温，味辛，归脾、胃、肾经。具有温中止痛，杀虫止痒之功。主治脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，湿疹，阴痒等病症。内服用量 3 g～6 g，外用适量。

A.54　血竭：性平，味甘、咸，归心、肝经。具有活血定痛，化瘀止血，生肌敛疮之功。主治跌打损伤，心腹瘀痛，外伤出血，疮疡不敛等病症。研末，内服 1 g～2 g，外用适量。

A.55 党参:性平,味甘,归脾、肺经。具有健脾益肺,养血生津之功。主治脾肺气虚,食少倦怠,咳嗽虚喘,气血不足,心悸气短等病症。内服用量 9 g～30 g,外用适量。

A.56 樟脑:性热,味辛,归心、脾经。具有通窍,杀虫,止痛,辟秽之功。主治心腹胀痛,脚气,牙痛,疮疡疥癣等病症。外用适量,研末撒或调敷。

A.57 牛膝:性平,味苦、甘、酸,归肝、肾经。具有逐瘀通经,补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血下行之功。主治经闭,痛经,腰膝酸痛,筋骨无力,淋症,水肿,头痛,眩晕,牙痛,口疮,吐血衄血等病症。内服用量 5 g～12 g,外用适量,孕妇慎用。

A.58 三七:性温,味甘、微苦,归肝、肾经。具有散瘀止血,消肿定痛之功。主治咯血,吐血衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛等病症。内服用量一次 1 g～3 g,外用适量,孕妇慎用。

A.59 补骨脂:性温,味辛、苦,归肾、脾经。具有温肾助阳,纳气平喘,温脾止泻,消风祛斑之功。主治肾阳不足,阳痿遗精,遗尿尿频,腰膝冷痛,肾虚作喘,五更泄泻,白癜风,斑秃等病症。内服用量 6 g～10 g,外用适量。

A.60 全蝎:性平,味辛,有毒,归肝经。具有息风镇痉,通络止痛,攻毒散结之功。主治肝风内动,痉挛抽搐,小儿惊风,中风口歪,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,偏正头痛,疮疡,瘰疬等病症。内服用量 3 g～6 g,外用适量,孕妇禁用。

附　录　B
（资料性附录）
常用穴位贴敷赋形剂、助透剂功效与特点

B.1　麝香：性温，味辛，归心、脾经。具有开窍醒神，活血通经，消肿止痛之功。临床多入丸散使用，内服用量 0.01 g～0.1 g，外用适量，孕妇禁用。穴位贴敷主要利用其辛香走窜、开窍醒神，活血通经的功效，且可促进其他药物的渗透吸收。现在多采用人工麝香。

B.2　冰片：性微寒，味辛、苦，归心、脾，肺经。具有开窍醒神，清热止痛之功。临床多入丸散使用，用量 0.15 g～0.3 g，外用适量，研粉点敷，孕妇慎用。穴位贴敷主要利用其芳香促渗、通经活络的功效。

B.3　生姜：性温，味辛，归肺、脾、胃经。具有解表散寒，温中止呕，化痰止咳之功。内服用量 3 g～10 g，外用适量。外用捣敷，或炒热熨，或绞汁外搽。

B.4　大蒜：性温，味辛，归脾、胃、肺经。具有解毒消肿，杀虫，止痢之功。外用捣敷，作栓剂，取之汁涂或切片隔蒜灸。外用对局部有强烈的刺激性，能引起灼热、疼痛、发泡，故不可久敷。

B.5　斑蝥：性热，味辛，有大毒。归肝、胃、肾经。具有破血逐瘀，散结消癥，攻毒蚀疮之功。用量 0.03 g～0.06 g，炮制后多入丸散用，外用适量，研末或浸酒醋，或制油膏涂敷患处，不宜大面积用，孕妇禁用。

B.6　丁香：性温，味辛，归脾、胃、肺、肾经。具有温中降逆，补肾助阳之功。内服用量 1 g～3 g，外用适量。穴位贴敷主要利用其芳香通络的功效。

B.7　醋：性温，味酸、甘，归肝、胃经。具有散瘀，止血，解毒，杀虫之功。外用和药调敷。

B.8　酒：性温，味甘、苦、辛，有毒，归心、肝、肺、胃经。具有通血脉，御寒气，行药势之功。外用单用或制成酒剂涂搽，或湿敷。

B.9　皂荚：性温，味辛，有小毒。具有祛风痰，除湿毒，杀虫之功。外用捣烂，或烧存性研末调敷，或熬膏涂敷。

B.10　蜂蜜：性平，味甘，归肺、脾、大肠经。具有补中，润燥，止痛，解毒之功。外用涂敷，或作为调和贴敷药。

B.11　食盐：性寒，味咸，归胃、肾、大小肠经。具有涌吐，凉血，解毒，软坚之功。外用炒热熨敷。

B.12　鸡蛋清：又名鸡子白，性凉，味甘，归肺、脾经。具有润肺利咽，清热解毒之功。外用适量，涂敷，或作为调和贴敷药。

B.13　麻油：性凉，味甘，入大肠经。具有润燥通便，解毒，生肌之功。外用涂搽。作为调和贴敷药，可润肤生肌，多用于黄丹麻油收膏。

B.14　医用凡士林：呈半透明状，是从石油提炼出的半固体状碳氰化合物，主要用于医药上配制各种软膏、眼膏的基质，还可用于皮肤保护油膏。

B.15　氮酮：为无色至微黄透明油状液体，性质稳定、无毒、无味、无刺激性，且助透效率相当高，是目前医药和化妆品行业中常用的促进皮肤渗透的助透剂之一。