# 第四章 積分

## 4.1 不定積分

**定義** (反導函數)**.** 給定 $F(x)$, 若 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = f(x)$, 則稱 $F(x)$ 為 $f(x)$ 的反導函數 (antiderivative) .

**性質.** 若 $F(x)$, $G(x)$ 分別為 $f(x)$, $g(x)$ 的反導函數, $c \in \mathbb{R}$. 則

- $F(x) + c$ 為 $f(x)$ 的反導函數.
- $c\,F(x)$ 為 $c\,f(x)$ 的反導函數.
- $F(x) + G(x)$ 為 $f(x) + g(x)$ 的反導函數.

**結論.**

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = f(x) \implies \mathrm{d}F(x) = f(x)\cdot\mathrm{d}x \implies F(x) = \displaystyle\int f(x)\cdot\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x$
- $F(x)$ 為 $f(x)$ 的反導函數 $\iff$ $f(x)$ 的反導函數為 $F(x)$ $\iff$ $F(x)$ 的導函數為 $f(x)$ $\iff$ $F(x)$ (對 $x$) 的微分為 $f(x)$ $\iff$ $f(x)$ (對 $x$) 的 (不定) 積分為 $F(x)$
- $f(x)$ 的反導函數 $\equiv$ $f(x)$ (對 $x$) 的 (不定) 積分
- 基礎積分集: 以下 $\alpha \neq -1$, $a \neq 0$.

| $f(x)$ | $x^\alpha$ | $\dfrac{1}{x}$ | $e^{ax}$ | $\sin ax$ | $\cos ax$ | $\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ | $\dfrac{1}{a^2+x^2}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$ | $\dfrac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$ | $\ln\lvert x\rvert$ | $\dfrac{1}{a}e^{ax}$ | $-\dfrac{1}{a}\cos ax$ | $\dfrac{1}{a}\sin ax$ | $\sin^{-1}\dfrac{x}{\lvert a\rvert}$ | $\dfrac{1}{a}\tan^{-1}\dfrac{x}{a}$ |

- (Liouville) $e^{-x^2}$, $\dfrac{e^x}{x}$, $\dfrac{1}{\ln x}$, $\sin(x^2)$, $\cos(x^2)$, $\dfrac{\sin x}{x}$, $\dfrac{\cos x}{x}$, $x^x$ 無 (初等函數形式之) 反導函數!

**例.**

1. $\displaystyle\int \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$
2. $\displaystyle\int x^\pi\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi+1}x^{\pi+1} + c$
3. $\displaystyle\int \sin\pi x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{\pi}\cos\pi x + c$
4. $\displaystyle\int \cos xy\,\mathrm{d}x = \frac{1}{y}\sin xy + c$
5. $\displaystyle\int e^{-2x}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}e^{-2x} + c$
6. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{\pi-x^2}}\,\mathrm{d}x = \sin^{-1}\frac{x}{\sqrt{\pi}} + c$
7. $\displaystyle\int \frac{1}{e+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{e}}\tan^{-1}\frac{u}{\sqrt{e}} + c$
8. $\displaystyle\int \left(\frac{\pi}{x} - e^{\pi x}\right)\mathrm{d}u = \pi\ln x - \frac{e^{\pi x}}{\pi} + c$
9. $\displaystyle\int \frac{3+x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}u = x + 2\tan^{-1}x + c$

**習題.** 求下列不定積分.

1. $\displaystyle\int \frac{x^3-1}{x^3}\,\mathrm{d}x = x + \frac{1}{2x^3} + c$
2. $\displaystyle\int 5 - \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 5x - 2\sqrt{x} + c$
3. $\displaystyle\int (t-1)(t+1)\,\mathrm{d}t = \frac{t^3}{3} - t + c$
4. $\displaystyle\int (\sqrt{x}+1)^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + x + \frac{4x^{\frac{3}{2}}}{3} + c$
5. $\displaystyle\int x\sqrt{3x}\,\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{3}}{5}x^{\frac{5}{2}} + c$
6. $\displaystyle\int \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^5}\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{2x^2} + \frac{1}{4x^4} + c$
7. $\displaystyle\int \sec^2 x - \sec x\tan x\,\mathrm{d}x = \tan x - \sec x + c$
8. $\displaystyle\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{2x}}{2} - e^x + x + c$

## 變數變換法

**結論.** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(g(x)) = f'(g(x))\cdot g'(x) \implies \mathrm{d}f(g(x)) = f'(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x \implies f(g(x)) = \displaystyle\int f'(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x.$
令 $u = g(x)$, 則 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = g'(x) \implies \mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$; 故 $\displaystyle\int f'(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f'(u)\,\mathrm{d}u = f(u)+c = f(g(x))+c.$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x.$

**解.**

- (解一) 令 $u = x+1$, 則 $x = u-1$, $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$. 故 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{u-1}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = \int u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{3}\,u^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{u} + c = \frac{2}{3}\,(x+1)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{x+1} + c.$
- (解二) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{x+1-1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x.$ 令 $u = x+1$, 則 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$. 故 $\displaystyle\int \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = \int u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{3}\,u^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{u} + c = \frac{2}{3}\,(x+1)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{x+1} + c.$
- (解三) 令 $u = \sqrt{x+1}$, 則 $x = u^2-1$, $\mathrm{d}u = \dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x \implies \dfrac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = 2\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x = \int (u^2-1)\cdot 2\,\mathrm{d}u = \frac{2}{3}\,u^3 - 2u + c = \frac{2}{3}\,(x+1)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{x+1} + c.$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = x^2+1$, 則 $\mathrm{d}u = 2\,x\,\mathrm{d}x \implies x\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^2+1}\cdot x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{u}\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\ln|u| + c = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c.$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{\sin(3\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = \ln x$, 則 $\mathrm{d}u = \dfrac{1}{x}\,\mathrm{d}x$. 故 $\displaystyle\int \frac{\sin(3\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x = \int \sin(3\ln x)\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \int \sin 3u\cdot\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}\cos 3u + c = -\frac{1}{3}\cos(3\ln x) + c.$

**例.** 求 $\displaystyle\int e^x\sqrt{1+e^x}\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = 1+e^x$, 則 $\mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$. 故 $\displaystyle\int e^x\sqrt{1+e^x}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{1+e^x}\cdot e^x\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{u}\cdot\mathrm{d}u = \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3}(1+e^x)^{\frac{3}{2}} + c$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = e^x$, 則 $\mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$. 故 $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{2-e^{2x}}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{2-u^2}}\,\mathrm{d}u = \sin^{-1}\frac{u}{\sqrt{2}} + c = \sin^{-1}\frac{e^x}{\sqrt{2}} + c.$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,\mathrm{d}x.$

**解.** $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{e^x\sqrt{1-e^{-2x}}}\,\mathrm{d}x=\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}\,\mathrm{d}x$. 令 $u=e^{-x}$, 則 $\mathrm{d}u=-e^{-x}\,\mathrm{d}x\implies e^{-x}\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$; 故 $\displaystyle\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sqrt{1-e^{-2x}}}\cdot e^{-x}\,\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u=-\sin^{-1}u+c=-\sin^{-1}e^{-x}+c$.

**例.** 求 $\displaystyle\int\frac{1}{x^2+4x+5}\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\displaystyle\int\frac{1}{x^2+4x+5}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{(x+2)^2+1}\,\mathrm{d}x$. 令 $u=x+2$, 則 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$; 故 $\displaystyle\int\frac{1}{(x+2)^2+1}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{u^2+1}\,\mathrm{d}u=\tan^{-1}u+c=\tan^{-1}(x+2)+c$.

**例.** 求 $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{4+2x-x^2}}\,\mathrm{d}x$

**解.** $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{4+2x-x^2}}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sqrt{5-(x-1)^2}}\,\mathrm{d}x$. 令 $u=x-1$, 則 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$; 故 $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{5-(x-1)^2}}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sqrt{5-u^2}}\,\mathrm{d}u=\sin^{-1}\frac{u}{\sqrt{5}}+c=\sin^{-1}\frac{x-1}{\sqrt{5}}+c$.

**例.** 求 $\displaystyle\int\tan x\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\displaystyle\int\tan x\,\mathrm{d}x=\int\frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x$. 令 $u=\cos x$, 則 $\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$; 故 $\displaystyle\int\frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x=\int\frac{-1}{u}\,\mathrm{d}u=-\ln|u|+c=-\ln|\cos x|+c=\ln|\sec x|+c$

**例.** 求 $\displaystyle\int\sec x\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\displaystyle\int\sec x\,\mathrm{d}x=\int\frac{\sec x\cdot(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\,\mathrm{d}x$. 令 $u=\sec x+\tan x$, 則 $\mathrm{d}u=(\sec^2x+\sec x\tan x)\,\mathrm{d}x$; 故 $\displaystyle\int\frac{\sec x\cdot(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{u}\,\mathrm{d}u=\ln|u|+c=\ln|\sec x+\tan x|+c$

**例.** 令 $\displaystyle T_1=\int\frac{\sin x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x$, $\displaystyle T_2=\int\frac{\cos x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x$, $a$, $b\neq0$, 求 $T_1$, $T_2$.

**解.**

(a) $\displaystyle bT_1+aT_2=\int\frac{b\sin x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x+\int\frac{a\cos x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x=\int\frac{b\sin x+a\cos x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x=\int1\,\mathrm{d}x=x$.

(b) $\displaystyle -aT_1+bT_2=\int\frac{-a\sin x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x+\int\frac{b\cos x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x=\int\frac{-a\sin x+b\cos x}{a\cos x+b\sin x}\,\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln u=\ln|a\cos x+b\sin x|$ (令 $u=a\cos x+b\sin x$, 則 $\mathrm{d}u=(-a\sin x+b\cos x)\,\mathrm{d}x$) .

解 $T_1$, $T_2$ 方程式 (a), (b) 得 $\displaystyle T_1=\frac{bx-a\ln|a\cos x+b\sin x|}{a^2+b^2}$, $\displaystyle T_2=\frac{ax+b\ln|a\cos x+b\sin x|}{a^2+b^2}$.

**例.** 求 $\displaystyle\int\cos^5ax\,\mathrm{d}x$, $a\neq0$.

**解.** $\displaystyle\int\cos^5ax\,\mathrm{d}x=\int(1-\sin^2ax)^2\cos ax\,\mathrm{d}x$. 令 $u=\sin ax$, 則 $\mathrm{d}u=a\cos ax\,\mathrm{d}x$; 故 $\displaystyle\int(1-\sin^2ax)^2\cos ax\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int(1-u^2)^2\,\mathrm{d}u=\frac{1}{a}\int(1-2u^2+u^4)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{a}\left(u-\frac{2}{3}u^3+\frac{1}{5}u^5\right)+c=\frac{1}{a}\left(\sin ax-\frac{2}{3}\sin^3ax+\frac{1}{5}\sin^5ax\right)+c$.

**例.** 求 $\displaystyle\int\cos^4ax\,\mathrm{d}x$, $a\neq0$.

**解.** $\displaystyle\int \cos^4 ax\,\mathrm{d}x = \int \Big(\frac{1+\cos 2ax}{2}\Big)^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \big(1+2\cos 2ax+\cos^2 2ax\big)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \big(1+2\cos 2ax+\frac{1+\cos 4ax}{2}\big)\,\mathrm{d}x$
$\displaystyle = \int \big(\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cos 2ax+\frac{1}{8}\cos 4ax\big)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8}x+\frac{1}{4a}\sin 2ax+\frac{1}{32a}\sin 4ax + c$

**習題.** 以變數變換法求下列不定積分. 注意: 可能會因為常數項而跟此處答案不同.

1. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{2x-1}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2x-1}+c$
2. $\displaystyle\int \sqrt{7x+4}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{21}\,(7x+4)^{\frac{3}{2}}+c$
3. $\displaystyle\int \sin(3x-1)\,\mathrm{d}x = \frac{-\cos(3x-1)}{3}+c$
4. $\displaystyle\int e^{\pi x-1}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{\pi x-1}}{\pi}+c$
5. $\displaystyle\int (x^2-2x+1)^{\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{5}\,(x-1)^{\frac{5}{3}}+c$
6. $\displaystyle\int \sin 3x\cos 3x\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^2 3x}{6}+c$
7. $\displaystyle\int \frac{\cos 3x}{\sin^2 3x}\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{3\sin 3x}+c$
8. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{1+2x^2}}{2}+c$
9. $\displaystyle\int x^2\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x = -\frac{2\,(1-x)^{\frac{3}{2}}}{3}+\frac{4\,(1-x)^{\frac{5}{2}}}{5}-\frac{2\,(1-x)^{\frac{7}{2}}}{7}$

**解.**

1. 令 $u=2x-1$, 則 $\mathrm{d}u=2\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{2x-1}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{u}}\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{u}+c = \sqrt{2x-1}+c.$
2. 令 $u=7x+4$, 則 $\mathrm{d}u=7\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x=\frac{1}{7}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \sqrt{7x+4}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{u}\cdot\frac{1}{7}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{7}\cdot\frac{2}{3}\,u^{\frac{3}{2}}+c = \frac{2}{21}\,(7x+4)^{\frac{3}{2}}+c.$
3. 令 $u=3x-1$, 則 $\mathrm{d}u=3\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x=\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \sin(3x-1)\,\mathrm{d}x = \int \sin u\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}\cos u+c = \frac{-\cos(3x-1)}{3}+c.$
4. 令 $u=\pi x-1$, 則 $\mathrm{d}u=\pi\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int e^{\pi x-1}\,\mathrm{d}x = \int e^u\cdot\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\,e^u+c = \frac{e^{\pi x-1}}{\pi}+c.$
5. 令 $u=x-1$, 則 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$. 故 $\displaystyle\int (x^2-2x+1)^{\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x = \int (x-1)^{\frac{2}{3}}\,\mathrm{d}x = \int u^{\frac{2}{3}}\,\mathrm{d}u = \frac{3}{5}\,u^{\frac{5}{3}}+c = \frac{3}{5}\,(x-1)^{\frac{5}{3}}+c.$
6. 令 $u=\sin 3x$, 則 $\mathrm{d}u=3\cos 3x\,\mathrm{d}x \implies \cos 3x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \sin 3x\cos 3x\,\mathrm{d}x = \int u\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\,u^2+c = \frac{\sin^2 3x}{6}+c.$
7. 令 $u=\sin 3x$, 則 $\mathrm{d}u=3\cos 3x\,\mathrm{d}x \implies \cos 3x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \frac{\cos 3x}{\sin^2 3x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{u^2}\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{u}+c = -\frac{1}{3\sin 3x}+c.$
8. 令 $u=1+2x^2$, 則 $\mathrm{d}u=4x\,\mathrm{d}x \implies x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{1+2x^2}}\cdot x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{u}}\cdot\frac{1}{4}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{4}\cdot 2\,u^{\frac{1}{2}}+c = \frac{\sqrt{1+2x^2}}{2}+c.$
9. 令 $u=\sqrt{1-x}$, 則 $u^2=1-x \implies x=1-u^2$, $\mathrm{d}x=-2\,u\,\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int x^2\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x = \int (1-u^2)^2\cdot u\cdot(-2)\,u\,\mathrm{d}u = -2\int (1-u^2)^2\cdot u^2\,\mathrm{d}u = -2\int \big(u^2-2u^4+u^6\big)\,\mathrm{d}u = -\frac{2\,u^3}{3}+\frac{4\,u^5}{5}-\frac{2\,u^7}{7}+c = -\frac{2\,(1-x)^{\frac{3}{2}}}{3}+\frac{4\,(1-x)^{\frac{5}{2}}}{5}-\frac{2\,(1-x)^{\frac{7}{2}}}{7}.$

**習題.** 以變數變換法求下列不定積分, 其中 $a \neq b \neq 0$. 注意: 可能會因為常數項而跟此處答案不同.

1. $\displaystyle\int e^{2x}\sin e^{2x}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\cos e^{2x} + c$
2. $\displaystyle\int xe^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = -e^{-\frac{x^2}{2}} + c$
3. $\displaystyle\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = -2\cos\sqrt{x} + c$
4. $\displaystyle\int x^2 2^{x^3+1}\,\mathrm{d}x = \frac{2^{x^3+1}}{3\ln 2} + c$
5. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + c$
6. $\displaystyle\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+2x+3} + c$
7. $\displaystyle\int \frac{x^2}{2+x^6}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3\sqrt{2}}\tan^{-1}\frac{x^3}{\sqrt{2}} + c$
8. $\displaystyle\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}\,\mathrm{d}x = \tan^{-1} e^x + c$
9. $\displaystyle\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\sqrt{1-x^2} + \sin^{-1} x + c$
10. $\displaystyle\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}}\,\mathrm{d}x = \sin^{-1}(\tan x) + c$
11. $\displaystyle\int \sin^4 x\cos^5 x\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{2\sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9}$
12. $\displaystyle\int \sin^2 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + c$
13. $\displaystyle\int \sin^{-\frac{2}{3}} x\cos^3 x\,\mathrm{d}x = 3\sin^{\frac{1}{3}} x - \frac{3}{7}\sin^{\frac{7}{3}} x + c$
14. $\displaystyle\int \frac{\sin^3(\ln x)\cos^3(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^4(\ln x)}{4} - \frac{\sin^6(\ln x)}{6} + c$
15. $\displaystyle\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{\cos x} + \frac{1}{3\cos^3 x} + c$
16. $\displaystyle\int \cos ax\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + c$
17. $\displaystyle\int \sin ax\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + c$
18. $\displaystyle\int \sin ax\cos bx\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} + c$

**解.**

1. 令 $u = e^{2x}$, 則 $\mathrm{d}u = 2e^{2x}\,\mathrm{d}x \implies e^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}u$. 故 $\displaystyle\int e^{2x}\sin e^{2x}\,\mathrm{d}x = \int \sin e^{2x}\cdot e^{2x}\,\mathrm{d}x = \int \sin u\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\cos u + c = -\frac{1}{2}\cos e^{2x} + c$.
2. 令 $u = \frac{x^2}{2}$, 則 $\mathrm{d}u = x\,\mathrm{d}x$, 故 $\displaystyle\int xe^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = \int e^{-\frac{x^2}{2}}\cdot x\,\mathrm{d}x = \int e^{-u}\,\mathrm{d}u = -e^{-u} + c = -e^{-\frac{x^2}{2}} + c$
3. 令 $u = \sqrt{x}$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x \implies \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\,\mathrm{d}u$, 故 $\displaystyle\int \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int \sin\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int \sin u\cdot 2\,\mathrm{d}u = -2\cos u + c = -2\cos\sqrt{x} + c$
4. 令 $u = x^3+1$, 則 $\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x \implies x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\mathrm{d}u$, 故 $\displaystyle\int x^2 2^{x^3+1}\,\mathrm{d}x = \int 2^{x^3+1}\cdot x^2\,\mathrm{d}x = \int 2^u\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}\int e^{u\ln 2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3\ln 2}e^{u\ln 2} + c = \frac{2^{x^3+1}}{3\ln 2} + c$
5. 令 $u = \ln x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$, 故 $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \int \ln x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \int u\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}u^2 + c = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + c$
6. 令 $u = x^2+2x+3$, 則 $\mathrm{d}u = (2x+2)\,\mathrm{d}x \implies (x+1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}u$, 故 $\displaystyle\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+3}}\cdot(x+1)\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{u}}\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{u} + c = \sqrt{x^2+2x+3} + c$
7. 令 $u = x^3$, 則 $\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x \implies x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\mathrm{d}u$, 故 $\displaystyle\int \frac{x^2}{2+x^6}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2+x^6}\cdot x^2\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2+u^2}\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3\sqrt{2}}\tan^{-1}\frac{u}{\sqrt{2}} + c = \frac{1}{3\sqrt{2}}\tan^{-1}\frac{x^3}{\sqrt{2}} + c$

8. $\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{e^x}{e^{2x}+1}\,\mathrm{d}x$. 令 $u = e^x$, 則 $\mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$, 故 $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{e^{2x}+1}\cdot e^x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{u^2+1}\,\mathrm{d}u = \tan^{-1}u + c = \tan^{-1}e^x + c$.

9. $\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$. 令 $u = \sqrt{1-x^2}$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x \implies \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u$, 故 $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \int -\mathrm{d}u = -u + c = -\sqrt{1-x^2}$, $\int \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\sqrt{1-x^2} + \sin^{-1}x + c$.

10. 令 $u = \tan x$, 則 $\mathrm{d}u = \sec^2 x\,\mathrm{d}x$, 故 $\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{1-\tan^2 x}}\cdot\sec^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u = \sin^{-1}u + c = \sin^{-1}(\tan x) + c$

11. $\int \sin^4 x\cos^5 x\,\mathrm{d}x = \int \sin^4 x\cdot\cos^4 x\cdot\cos x\,\mathrm{d}x = \int \sin^4 x\cdot(1-\sin^2 x)^2\cdot\cos x\,\mathrm{d}x = \int \big(\sin^4 x - 2\sin^6 x + \sin^8 x\big)\cdot\cos x\,\mathrm{d}x$. 令 $u = \sin x$, 則 $\mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$, 故 $\int \big(\sin^4 x - 2\sin^6 x + \sin^8 x\big)\cdot\cos x\,\mathrm{d}x = \int \big(u^4 - 2u^6 + u^8\big)\,\mathrm{d}u = \frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9} + c = \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{2\sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9} + c$

12. $\int \sin^2 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\cdot\frac{1+\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \big(1-\cos^2 2x\big)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \big(1 - \frac{1+\cos 4x}{2}\big)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \big(\frac{1}{2} + \frac{\cos 4x}{2}\big)\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + c$

13. $\int \sin^{-\frac{2}{3}} x\cos^3 x\,\mathrm{d}x = \int \sin^{-\frac{2}{3}} x\cdot\cos^2 x\cdot\cos x\,\mathrm{d}x = \int \sin^{-\frac{2}{3}} x\cdot(1-\sin^2 x)\cdot\cos x\,\mathrm{d}x = \int \big(\sin^{-\frac{2}{3}} x - \sin^{\frac{4}{3}} x\big)\cdot\cos x\,\mathrm{d}x$. 令 $u = \sin x$, 則 $\mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$, 故 $\int \big(\sin^{-\frac{2}{3}} x - \sin^{\frac{4}{3}} x\big)\cdot\cos x\,\mathrm{d}x = \int \big(u^{-\frac{2}{3}} - u^{\frac{4}{3}}\big)\,\mathrm{d}u = 3u^{\frac{1}{3}} - \frac{3}{7}u^{\frac{7}{3}} + c = 3\sin^{\frac{1}{3}} x - \frac{3}{7}\sin^{\frac{7}{3}} x + c$

14. 令 $u = \ln x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$, 故 $\int \frac{\sin^3(\ln x)\cos^3(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x = \int \sin^3(\ln x)\cos^3(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \int \sin^3 u\cos^3 u\,\mathrm{d}u = \int \sin^3 u\cdot\cos^2 u\cdot\cos u\,\mathrm{d}u = \int \sin^3 u\big(1-\sin^2 u\big)\cdot\cos u\,\mathrm{d}u = \int \big(\sin^3 u - \sin^5 u\big)\cdot\cos u\,\mathrm{d}u$. 令 $w = \sin u$, 則 $\mathrm{d}w = \cos u\,\mathrm{d}u$, 故 $\int \big(\sin^3 u - \sin^5 u\big)\cdot\cos u\,\mathrm{d}u = \int \big(w^3 - w^5\big)\,\mathrm{d}w = \frac{w^4}{4} - \frac{w^6}{6} + c = \frac{\sin^4(\ln x)}{4} - \frac{\sin^6(\ln x)}{6} + c$

15. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x\cdot\sin x}{\cos^4 x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}\cdot\sin x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^4 x}\cdot\sin x\,\mathrm{d}x = \int \big(\frac{1}{\cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x}\big)\cdot\sin x\,\mathrm{d}x$. 令 $u = \cos x$, 則 $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x \implies \sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u$, 故 $\int \big(\frac{1}{\cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x}\big)\cdot\sin x\,\mathrm{d}x = \int \big(\frac{1}{u^4} - \frac{1}{u^2}\big)(-)\,\mathrm{d}u = \int \big(\frac{1}{u^2} - \frac{1}{u^4}\big)\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{u} + \frac{1}{3u^3} + c = -\frac{1}{\cos x} + \frac{1}{3\cos^3 x} + c$

16. 由積化和差公式 $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\big(\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\big)$, $\int \cos ax\cos bx\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big(\cos(ax-bx) + \cos(ax+bx)\big)\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big(\cos(a-b)x + \cos(a+b)x\big)\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + c$.

17. 由積化和差公式 $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}\big(\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\big)$, $\int \sin ax\sin bx\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big(\cos(ax-bx) - \cos(ax+bx)\big)\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big(\cos(a-b)x - \cos(a+b)x\big)\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + c$.

18. 由積化和差公式 $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\big(\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)\big)$, $\int \sin ax\cos bx\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big(\sin(ax-bx)+\sin(ax+bx)\big)\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big(\sin(a-b)x+\sin(a+b)x\big)\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} + c.$

## 部份積分法

**結論.** $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u(x)\,v(x)) = u(x)\,\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} + v(x)\,\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x} \implies u(x)\,v(x) = \int u(x)\,\mathrm{d}v(x) + \int v(x)\,\mathrm{d}u(x)$
$\implies \int u\,\mathrm{d}v = u\,v - \int v\,\mathrm{d}u.$

**例.** 求 $\int x\,e^x\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = x$, 則 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$. 令 $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = e^x$. 故 $\int x\,e^x\,\mathrm{d}x = x\cdot e^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = xe^x - e^x + c.$

**例.** 求 $\int \ln x\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = \ln x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\mathrm{d}x$. 令 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$, 則 $v = x$. 故 $\int \ln x\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + c.$

**例.** 求 $\int x\tan^{-1}x\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = \tan^{-1}x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$. 令 $\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{x^2}{2}$. 故 $\int x\tan^{-1}x\,\mathrm{d}x = \tan^{-1}x\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \tan^{-1}x\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int\big(1-\frac{1}{1+x^2}\big)\,\mathrm{d}x = \tan^{-1}x\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\big(x-\tan^{-1}x\big) + c.$

**例.** 求 $\int x^2\sin x\,\mathrm{d}x.$

**解.** 令 $u = x^2$, 則 $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$; 令 $\mathrm{d}v = \sin x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = -\cos x$. 故 $\int x^2\,\sin x\,\mathrm{d}x = x^2\cdot(-\cos x) + 2\int x\cos x\,\mathrm{d}x.$
令 $u = x$, 則 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$; 令 $\mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \sin x$. 故 $\int x\cos x\,\mathrm{d}x = x\cdot\sin x - \int\sin x\,\mathrm{d}x = x\cdot\sin x + \cos x.$
由上, $\int x^2\sin x\,\mathrm{d}x = -x^2\cos x + 2(x\sin x + \cos x) + c.$

**例.** 求 $\int \sin^{-1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$, $x > 0$.

**解.** 令 $u = \sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\sqrt{1-x^2}\right)^2}}\cdot\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{x^2}}\cdot\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$; 令 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$, 則 $v = x$. 故 $\int \sin^{-1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = x\,\sin^{-1}\sqrt{1-x^2} + \int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = x\,\sin^{-1}\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-x^2}.$

**例.** 求 $\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$ 與 $\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$, $a$, $b \neq 0$.

**解.**

(a) 考慮 $\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$: 令 $u = \cos bx$, 則 $\mathrm{d}u = -b\sin bx\,\mathrm{d}x$; 令 $\mathrm{d}v = e^{ax}\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{1}{a}\,e^{ax}$, 故 $\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \cos bx\cdot\frac{1}{a}e^{ax} + \frac{b}{a}\int e^{ax}\cdot\sin bx\,\mathrm{d}x.$

(b) 考慮 $\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$: 令 $u=\sin bx$, 則 $\mathrm{d}u=b\cos bx\,\mathrm{d}x$; 令 $\mathrm{d}v=e^{ax}\,\mathrm{d}x$, 則 $v=\dfrac{1}{a}\,e^{ax}$, 故 $\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x=\sin bx\cdot\dfrac{1}{a}\,e^{ax}-\dfrac{b}{a}\int e^{ax}\cdot\cos bx\,\mathrm{d}x$.

令 $X=\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$, $Y=\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$, 由 (a)(b) $X=\cos bx\cdot\dfrac{1}{a}e^{ax}+\dfrac{b}{a}Y$, $Y=\sin bx\cdot\dfrac{1}{a}e^{ax}-\dfrac{b}{a}X$. 解 $X, Y$ 得 $X=\dfrac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}$, $Y=\dfrac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}$.

## 列表法

**結論.**

1. 將要微分函數寫左邊, 積分函數寫右邊; 左邊連續微分, 右邊連續積分
2. 依序左上連右下斜線函數相乘, 最底部水平兩邊函數相乘並積分, 符號正負相間
3. 將上式所得項全部加總即為所求積分

**例.** 求 $\int (x+3)\,e^{2x}\,\mathrm{d}x$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $x+3$ | $+$ | $e^{2x}$ |
| $1$ | $-$ | $\frac{1}{2}e^{2x}$ |
| $0$ | | $\frac{1}{4}e^{2x}$ |

$$\int (x+3)\,e^{2x}\,\mathrm{d}x=(x+3)\,\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{4}e^{2x}$$

**例.** 求 $\int (x^2-2x)\,e^{kx}\,\mathrm{d}x$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $x^2-2x$ | $+$ | $e^{kx}$ |
| $2(x-1)$ | $-$ | $\frac{1}{k}e^{kx}$ |
| $2$ | $+$ | $\frac{1}{k^2}e^{kx}$ |
| $0$ | | $\frac{1}{k^3}e^{kx}$ |

$$\int (x^2-2x)\,e^{kx}\,\mathrm{d}x=(x^2-2x)\,\frac{1}{k}e^{kx}-2(x-1)\frac{1}{k^2}e^{kx}+2\frac{1}{k^3}e^{kx}$$

**例.** 求 $\int x^4\,\sin 2x\,\mathrm{d}x$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $x^4$ | $+$ | $\sin 2x$ |
| $4x^3$ | $-$ | $-\frac{1}{2}\cos 2x$ |
| $12x^2$ | $+$ | $-\frac{1}{4}\sin 2x$ |
| $24x$ | $-$ | $\frac{1}{8}\cos 2x$ |
| $24$ | $+$ | $\frac{1}{16}\sin 2x$ |
| $0$ | | $-\frac{1}{32}\cos 2x$ |

$$\begin{aligned}&\int x^4\,\sin 2x\,\mathrm{d}x\\&=-x^4\,\frac{1}{2}\cos 2x+4x^3\,\frac{1}{4}\sin 2x+12x^2\,\frac{1}{8}\cos 2x-24x\,\frac{1}{16}\sin 2x-24\,\frac{1}{32}\cos 2x\\&=\left(-\frac{x^4}{2}+\frac{3x^2}{2}-\frac{3}{4}\right)\cos 2x+\left(x^3-\frac{3x}{2}\right)\sin 2x\end{aligned}$$

**例.** 求 $\int x^5\,e^{ax}\,\mathrm{d}x$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $x^5$ | $+$ | $e^{ax}$ |
| $5x^4$ | $-$ | $\frac{1}{a}e^{ax}$ |
| $20x^3$ | $+$ | $\frac{1}{a^2}e^{ax}$ |
| $60x^2$ | $-$ | $\frac{1}{a^3}e^{ax}$ |
| $120x$ | $+$ | $\frac{1}{a^4}e^{ax}$ |
| $120$ | $-$ | $\frac{1}{a^5}e^{ax}$ |
| $0$ | | $\frac{1}{a^6}e^{ax}$ |

$$\begin{aligned}
&\int x^5\, e^{ax}\,\mathrm{d}x \\
&= x^5\,\frac{1}{a}e^{ax} - 5x^4\,\frac{1}{a^2}e^{ax} + 20x^3\,\frac{1}{a^3}e^{ax} - 60x^2\,\frac{1}{a^4}e^{ax} + 120x\,\frac{1}{a^5}e^{ax} - 120\,\frac{1}{a^6}e^{ax} \\
&= \left(\frac{x^5}{a} - \frac{5x^4}{a^2} + \frac{20x^3}{a^3} - \frac{60x^2}{a^4} + \frac{120x}{a^5} - \frac{120}{a^6}\right) e^{ax}
\end{aligned}$$

**例.** 求 $\displaystyle\int (\sin^{-1} x)^2\,\mathrm{d}x$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $(\sin^{-1} x)^2$ | $+$ | $1$ |
| $\frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$ | $-$ | $x$ |

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $2\sin^{-1} x$ | $+$ | $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ | $-$ | $-\sqrt{1-x^2}$ |

$$\begin{aligned}
&\int (\sin^{-1} x)^2\,\mathrm{d}x = (\sin^{-1} x)^2 \cdot x - \int \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x\,\mathrm{d}x \\
&= (\sin^{-1} x)^2 \cdot x - \int 2\sin^{-1} x \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x \\
&= (\sin^{-1} x)^2 \cdot x - \left(-2\sin^{-1} x \cdot \sqrt{1-x^2} + \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\right) \\
&= (\sin^{-1} x)^2 \cdot x + 2\sin^{-1} x \cdot \sqrt{1-x^2} - 2x
\end{aligned}$$

**例.** 求 $\displaystyle\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$, $a,\ b \neq 0$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $\cos bx$ | $+$ | $e^{ax}$ |
| $-b\sin bx$ | $-$ | $\frac{1}{a}e^{ax}$ |
| $-b^2\cos bx$ | $+$ | $\frac{1}{a^2}e^{ax}$ |

$$\begin{aligned}
&\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a^2}e^{ax}\sin bx - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x \\
&\Longrightarrow \int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2}
\end{aligned}$$

**例.** 求 $\displaystyle\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$, $a,\ b \neq 0$.

**解.**

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $\sin bx$ | $+$ | $e^{ax}$ |
| $b\cos bx$ | $-$ | $\frac{1}{a}e^{ax}$ |
| $-b^2\sin bx$ | $+$ | $\frac{1}{a^2}e^{ax}$ |

$$\begin{aligned}
&\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a^2}e^{ax}\cos bx - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x \\
&\Longrightarrow \int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2}
\end{aligned}$$

**遞迴式**

**例.** 求 $I_n = \displaystyle\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x$, $n \in \mathbb{N}$ 之遞迴式: 令 $u = \dfrac{1}{(x^2+a^2)^n}$, 則 $\mathrm{d}u = -2n\,\dfrac{x}{(x^2+a^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$, 則 $v = x$. 故 $I_n = \displaystyle\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{(x^2+a^2-a^2)}{(x^2+a^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1} \Longrightarrow 2na^2 I_{n+1} = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + (2n-1)I_n \Longrightarrow I_{n+1} = \frac{x}{2na^2(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2}I_n$.

使用例: $I_1 = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$, $I_2 = \frac{1}{2a^2}I_1 + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} = \frac{1}{2a^3}\tan^{-1}\frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)}$, $I_3 = \frac{3}{4a^2}I_2 + \frac{x}{4a^2(x^2+a^2)^2}$ $= \frac{3}{4a^2}\left(\frac{1}{2a^3}\tan^{-1}\frac{x}{a} + \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)}\right) + \frac{x}{4a^2(x^2+a^2)^2} = \frac{3}{8a^5}\tan^{-1}\frac{x}{a} + \frac{3x}{8a^4(x^2+a^2)} + \frac{x}{4a^2(x^2+a^2)^2}$.

**例.** 求 $J_n = \int \sin^n x\,\mathrm{d}x$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$ 之遞迴式: 令 $u = \sin^{n-1}x$, 則 $\mathrm{d}u = (n-1)\sin^{n-2}x\cos x\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \sin x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = -\cos x$. 故 $J_n = \int \sin^n x\,\mathrm{d}x = -\sin^{n-1}x\cdot\cos x + (n-1)\int \cos x\cdot\sin^{n-2}x\cos x\,\mathrm{d}x = -\sin^{n-1}x\cos x + (n-1)\int \sin^{n-2}x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = -\sin^{n-1}x\cos x + (n-1)\int \sin^{n-2}x\cdot(1-\sin^2 x)\,\mathrm{d}x = -\sin^{n-1}x\cos x + (n-1)\int \sin^{n-2}x\,\mathrm{d}x - (n-1)\int \sin^n x\,\mathrm{d}x = -\sin^{n-1}x\cos x + (n-1)J_{n-2} + (1-n)J_n \implies nJ_n = -\sin^{n-1}x\cos x + (n-1)J_{n-2} \implies J_n = \frac{-\sin^{n-1}x\cos x}{n} + \frac{n-1}{n}J_{n-2}$.

使用例: $J_2 = \frac{-\sin x\cos x}{2} + \frac{1}{2}J_0 = \frac{-\sin x\cos x}{2} + \frac{x}{2}$, $J_3 = \frac{-\sin^2 x\cos x}{3} + \frac{2}{3}J_1 = \frac{-\sin^2 x\cos x}{3} - \frac{2\cos x}{3}$, $J_4 = \frac{-\sin^3 x\cos x}{4} + \frac{3}{4}J_2 = \frac{-\sin^3 x\cos x}{4} + \frac{3\sin x\cos x}{8} - \frac{3x}{8}$.

**習題.** 以部份積分法求下列不定積分. 注意: 可能會因為常數項而跟此處答案不同.

1. $\int \frac{\sin^{-1}x}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{-1}x}{x} - \ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + c$
2. $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x = x\,\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + c$
3. $\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16} + c$
4. $\int x(\ln x)^3\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\left((\ln x)^3 - \frac{3(\ln x)^2}{2} + \frac{3\ln x}{2} - \frac{3}{4}\right) + c$
5. $\int x^2\tan^{-1}x\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\tan^{-1}x - \frac{x^2}{6} + \frac{\ln(1+x^2)}{6} + c$
6. $\int x^5 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}e^{-x^2}(x^4+2x^2+2) + c$
7. $\int xe^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\,e^{\sqrt{x}}\left(x\sqrt{x} - 3x + 6\sqrt{x} - 6\right) + c$
8. $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^x}{x+1} + c$
9. $\int \sin(\ln x)\,\mathrm{d}x = \frac{x\,(\sin(\ln x) - \cos(\ln x))}{2} + c$
10. $\int x^2\ln\frac{1-x}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\ln\frac{1-x}{1+x} - \frac{x^2+\ln(x^2-1)}{3} + c$
11. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{1+x}}\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot 2\sqrt{1+x} - 4\sqrt{1+x} - 2\ln(\sqrt{1+x}-1) + 2\ln(\sqrt{1+x}+1) + c$

**解.**

1. 令 $u = \sin^{-1}x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{-1}{x}$. 故 $\int \frac{\sin^{-1}x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \sin^{-1}x\cdot\frac{-1}{x} - \int \frac{-1}{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{-1}x}{x} + \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$. 令 $w = \sqrt{1-x^2}$, 則 $-x^2 = w^2 - 1$, $\mathrm{d}w = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$. 故

$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{-x^2}\cdot\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{w^2-1}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2}\int\Big(\frac{1}{w-1}-\frac{1}{w+1}\Big)\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2}\big(\ln|w-1| - \ln|w+1|\big) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{w-1}{w+1}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{1-x^2}}\right| = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{(1-\sqrt{1-x^2})^2}{x^2}\right| = \ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right|$.

以上, $\int \frac{\sin^{-1}x}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{-1}x}{x} + \int\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{-1}x}{x} + \ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + c$.

2. 令 $u = \ln(x+\sqrt{1+x^2})$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\big(x+\sqrt{1+x^2}\big)'\,\mathrm{d}x = \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\Big(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$, 則 $v = x$. 故 $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x = \ln(x+\sqrt{1+x^2})\cdot x - \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x = \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,x - \sqrt{1+x^2} + c$.

3. 令 $u = \ln x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x^3\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{x^4}{4}$. 故 $\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot\frac{x^4}{4} - \int\frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot\frac{x^4}{4} - \int\frac{x^3}{4}\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot\frac{x^4}{4} - \frac{x^4}{16} + c$.

4. 令 $u = (\ln x)^3$, 則 $\mathrm{d}u = 3(\ln x)^2\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{x^2}{2}$. 故 $\int x(\ln x)^3\,\mathrm{d}x = (\ln x)^3\cdot\frac{x^2}{2} - \int\frac{x^2}{2}\cdot 3(\ln x)^2\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = (\ln x)^3\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}\int x(\ln x)^2\,\mathrm{d}x$. 令 $u = (\ln x)^2$, 則 $\mathrm{d}u = 2\,\ln x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{x^2}{2}$. 故 $\int x(\ln x)^2\,\mathrm{d}x = (\ln x)^2\cdot\frac{x^2}{2} - \int\frac{x^2}{2}\cdot 2\ln x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = (\ln x)^2\cdot\frac{x^2}{2} - \int x\ln x\,\mathrm{d}x$. 令 $u = \ln x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{x^2}{2}$. 故 $\int x\ln x\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot\frac{x^2}{2} - \int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}x = \ln x\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4}$. 以上, $\int x(\ln x)^3\,\mathrm{d}x = (\ln x)^3\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}\Big((\ln x)^2\cdot\frac{x^2}{2} - \big(\ln x\cdot\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4}\big)\Big) = \frac{x^2}{2}\big((\ln x)^3 - \frac{3(\ln x)^2}{2} + \frac{3\ln x}{2} - \frac{3}{4}\big) + c$

5. 令 $u = \tan^{-1}x$, 則 $\mathrm{d}u = \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x^2\,\mathrm{d}x$, 則 $v = \frac{x^3}{3}$. 故 $\int x^2\tan^{-1}x\,\mathrm{d}x = \tan^{-1}x\cdot\frac{x^3}{3} - \int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$. 又 $\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int\frac{(x^3+x)-x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int\frac{x(x^2+1)-x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int\big(x - \frac{x}{x^2+1}\big)\,\mathrm{d}x$. 令 $w = x^2+1$, 則 $\mathrm{d}w = 2x\,\mathrm{d}x \implies x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}w$, 故 $\int\frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \int\frac{1}{x^2+1}\cdot x\,\mathrm{d}x = \int\frac{1}{w}\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2}\ln w + c = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c$. 以上, $\int x^2\tan^{-1}x\,\mathrm{d}x = \tan^{-1}x\cdot\frac{x^3}{3} - \int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \tan^{-1}x\cdot\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{6} + \frac{\ln(x^2+1)}{6} + c$.

6. 令 $w = x^2$, 則 $\mathrm{d}w = 2x\,\mathrm{d}x \implies x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}w$, 故 $\int x^5e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \int e^{-x^2}\cdot(x^2)^2\cdot x\,\mathrm{d}x = \int e^{-w}\cdot w^2\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2}\int w^2\,e^{-w}\,\mathrm{d}w = -\frac{1}{2}\,e^{-w}(w^2+2w+2) = -\frac{1}{2}\,e^{-x^2}(x^4+2x^2+2) + c$.

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $w^2$ | $+$ | $e^{-w}$ |
| $2w$ | $-$ | $-e^{-w}$ |
| $2$ | $+$ | $e^{-w}$ |
| $0$ | | $-e^{-w}$ |

$$\int w^2e^{-w}\,\mathrm{d}w = -w^2\,e^{-w} - 2w\,e^{-w} - 2\,e^{-w} = -e^{-w}(w^2+2w+2)$$

7. 令 $w=\sqrt{x}$, 則 $w^2=x$, $\mathrm{d}x=2w\,\mathrm{d}w$, 故 $\displaystyle\int xe^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=\int w^2e^w\cdot 2w\,\mathrm{d}w=2\int w^3e^w\,\mathrm{d}w=2\,e^w(w^3-3w^2+6w-6)=2\,e^{\sqrt{x}}\,(x\sqrt{x}-3x+6\sqrt{x}-6)+c$

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $w^3$ | $+$ | $e^w$ |
| $3w^2$ | $-$ | $e^w$ |
| $6w$ | $+$ | $e^w$ |
| $6$ | $-$ | $e^w$ |
| $0$ | | $e^w$ |

$$\int w^3\,e^w\,\mathrm{d}w=w^3\,e^w-3w^2\,e^w+6w\,e^w-6\,e^w=e^w(w^3-3w^2+6w-6)$$

8. $\displaystyle\int\frac{xe^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{(x+1-1)e^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{x+1}\,\mathrm{d}x-\int\frac{e^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$. 令 $u=e^x$, 則 $\mathrm{d}u=e^x\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v=\dfrac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$, 則 $v=\dfrac{-1}{x+1}$. 故 $\displaystyle\int\frac{e^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=e^x\cdot\frac{-1}{x+1}+\int\frac{1}{x+1}\cdot e^x\,\mathrm{d}x=\frac{-e^x}{x+1}+\int\frac{e^x}{x+1}\,\mathrm{d}x$; 原式 $\displaystyle\int\frac{xe^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{x+1}\,\mathrm{d}x-\int\frac{e^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{x+1}\,\mathrm{d}x-\left(\frac{-e^x}{x+1}+\int\frac{e^x}{x+1}\,\mathrm{d}x\right)=\frac{e^x}{x+1}$.

9. 令 $w=\ln x$, 則 $e^w=x$, $\mathrm{d}x=e^w\,\mathrm{d}w$, 故 $\displaystyle\int\sin(\ln x)\,\mathrm{d}x=\int\sin w\cdot e^w\,\mathrm{d}w=\int e^w\,\sin w\,\mathrm{d}w=\frac{e^w(\sin w-\cos w)}{2}=\frac{x\,(\sin(\ln x)-\cos(\ln x))}{2}+c$

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $\sin w$ | $+$ | $e^w$ |
| $\cos w$ | $-$ | $e^w$ |
| $-\sin w$ | $+$ | $e^w$ |

$$\int e^w\sin w\,\mathrm{d}w=e^w\sin w-e^w\cos w-\int e^w\sin w\,\mathrm{d}w$$
$$\Longrightarrow\int e^w\sin w\,\mathrm{d}w=\frac{e^w(\sin w-\cos w)}{2}$$

10. 令 $u=\ln\dfrac{1-x}{1+x}$, 則 $\mathrm{d}u=\dfrac{1+x}{1-x}\cdot\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)'\mathrm{d}x=\dfrac{1+x}{1-x}\cdot\dfrac{(1+x)\cdot(-1)-(1-x)}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v=x^2\,\mathrm{d}x$, 則 $v=\dfrac{x^3}{3}$. 故 $\displaystyle\int x^2\ln\frac{1-x}{1+x}\,\mathrm{d}x=\ln\frac{1-x}{1+x}\cdot\frac{x^3}{3}-\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$. 又 $\displaystyle\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int\frac{x^3}{x^2-1}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int\left(x+\frac{x}{x^2-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{3}+\frac{2}{3}\int\frac{x}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$. 令 $w=x^2-1$, 則 $\mathrm{d}w=2x\,\mathrm{d}x\implies x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\,\mathrm{d}w$, 故 $\displaystyle\int\frac{x}{x^2-1}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x^2-1}\cdot x\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{w}\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}w=\frac{1}{2}\ln w+c=\frac{1}{2}\ln(x^2-1)+c$. 以上, $\displaystyle\int x^2\ln\frac{1-x}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{1+x}{1-x}\cdot\frac{x^3}{3}-\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x=\ln\frac{1-x}{1+x}\cdot\frac{x^3}{3}-\frac{x^2+\ln(x^2-1)}{3}+c$.

11. 令 $u=\ln x$, 則 $\mathrm{d}u=\dfrac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v=\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}\,\mathrm{d}x$, 則 $v=2\sqrt{1+x}$. 故 $\displaystyle\int\frac{\ln x}{\sqrt{1+x}}\,\mathrm{d}x=\ln x\cdot 2\sqrt{1+x}-2\int\frac{\sqrt{1+x}}{x}\,\mathrm{d}x$. 令 $w=\sqrt{1+x}$, 則 $w^2=1+x\implies x=w^2-1$, $2w\,\mathrm{d}w=\mathrm{d}x$, 故 $\displaystyle\int\frac{\sqrt{1+x}}{x}\,\mathrm{d}x=\int\frac{w}{w^2-1}\cdot 2w\,\mathrm{d}w=2\int\frac{w^2}{w^2-1}\,\mathrm{d}w=2\int\frac{(w^2-1)+1}{w^2-1}\,\mathrm{d}w=2w+2\int\frac{1}{w^2-1}\,\mathrm{d}w=2\sqrt{1+x}+2\int\frac{1}{w^2-1}\,\mathrm{d}w$. 由 $\dfrac{1}{w^2-1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{w-1}-\dfrac{1}{w+1}\right)$, $\displaystyle\int\frac{1}{w^2-1}\,\mathrm{d}w=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{w-1}-\frac{1}{w+1}\right)\mathrm{d}w=\frac{1}{2}\left(\ln|w-1|-\ln|w+1|\right)=\frac{1}{2}\left(\ln|\sqrt{1+x}-1|-\ln|\sqrt{1+x}+1|\right)$. 以上, $\displaystyle\int\frac{\ln x}{\sqrt{1+x}}\,\mathrm{d}x=\ln x\cdot 2\sqrt{1+x}-2\left(2\sqrt{1+x}+2\left(\frac{1}{2}\left(\ln|\sqrt{1+x}-1|-\ln|\sqrt{1+x}+1|\right)\right)\right)=\ln x\cdot 2\sqrt{1+x}-4\sqrt{1+x}-2\ln|\sqrt{1+x}-1|+2\ln|\sqrt{1+x}+1|+c$.

## 4.2 定積分

定積分 ≈ (帶符號) 面積: $x$ 軸上方為正, 下方為負.

**定義.** 給定 $f : [a,\, b] \to \mathbb{R}$.

- $[a,\, b]$ 分割 $\mathbb{P} : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$
- $\Delta x_k = x_k - x_{k-1},\ k = 1,\, 2,\, \ldots,\, n;\ \|\mathbb{P}\| = \max\{\, |\Delta x_k| \mid 1 \leqslant k \leqslant n\}$
- 樣本點 $\xi_k$: $x_{k-1} \leqslant \xi_k \leqslant x_k,\ k = 1,\, 2,\, \ldots,\, n$
- $u_k = \sup\{\, f(x) \mid x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k\},\ l_k = \inf\{\, f(x) \mid x_{k-1} \leqslant x \leqslant x_k\},\ k = 1,\, 2,\, \ldots,\, n$
- $R(f, \mathbb{P}) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\, \Delta x_k,\ U(f, \mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n} u_k\, \Delta x_k,\ L(f, \mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n} l_k\, \Delta x_k;$
  顯然 $L(f, \mathbb{P}) \leqslant R(f, \mathbb{P}) \leqslant U(f, \mathbb{P})$.
- 求 $\displaystyle\lim_{\|\mathbb{P}\| \to 0} R(f, \mathbb{P})$. 若對不同分割與樣本點選取此極限均存在且相等, 稱 $f$ 在 $[a, b]$ 可積 (分) ; $f(x)$ 在 $[a,\, b]$ 的定積分 $\displaystyle\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x \equiv \lim_{\|\mathbb{P}\| \to 0} R(f, \mathbb{P})$

**註.**

- 在 $\displaystyle\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x$ 中, $a$ 為*積分下限* (lower limit of integration) , $b$ 為*積分上限* (upper limit of integration) , $f(x)$ 為*被積分式* (integrand) , $x$ 為*積分變數* (variable of integration) .
- $\displaystyle\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\, \mathrm{d}t = \int_a^b f(u)\, \mathrm{d}u$ (定積分數值與積分變數無關)

**結論.** 若 $f$ 在 $[a,\, b]$ 連續, 則 $f$ 在 $[a,\, b]$ 可積.




**性質.** 令 $f,\, g$ 在包含 $a,\, b,\, c$ 之區間為可積, $\alpha,\, \beta \in \mathbb{R}$. 則

1. $\displaystyle\int_a^a f(x)\, \mathrm{d}x = 0$
2. $\displaystyle\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\, \mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int_a^b \big(\alpha\, f(x) + \beta\, g(x)\big)\, \mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\, \mathrm{d}x$
4. $\displaystyle\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\, \mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\, \mathrm{d}x$
5. $\displaystyle\int_a^b f(x)\, \mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\, \mathrm{d}x$, 若 $f(x) \leqslant g(x)\ \forall\, x \in [a, b],\ a \leqslant b$

6. $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |\,f(x)\,|\,\mathrm{d}x, \quad a \leqslant b$

7. $f(x)$ 為奇函數: $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

8. $f(x)$ 為偶函數: $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$

**例.**

1. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2}\,\mathrm{d}x = \pi$ (半徑 $\sqrt{2}$ 之半圓面積)

2. $\int_{-1}^{2} \operatorname{sgn}(x)\,\mathrm{d}x = 2\cdot 1 - 1\cdot 1 = 1$; $\operatorname{sgn}(x) \equiv \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$

3. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x^7 - 5x^3)\,\mathrm{d}x = 0$ ($\sin(x^7-5x^3)$ 為奇函數)

4. $\int_{-6}^{6} e^{-x^4}\sin(\sin x)\,\mathrm{d}x = 0$ ($e^{-x^4}\sin(\sin x)$ 為奇函數)

5. $\int_{-4}^{4} \left(e^x - e^{-x}\right)\mathrm{d}x = 0$ ($e^x - e^{-x}$ 為奇函數)

6. $\int_{-2024}^{2024} \left(e^{9x^5-2x^7} - e^{-9x^5+2x^7}\right)\mathrm{d}x = 0$ ($e^{9x^5-2x^7} - e^{-9x^5+2x^7}$ 為奇函數)

7. $\int_{-a}^{a} |x|\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a |x|\,\mathrm{d}x = a^2$ ($|x|$ 為偶函數; 兩 $a\times a$ 等腰直角三角形面積)

8. 定義 $\int_1^x \frac{1}{\tau}\,\mathrm{d}\tau \equiv \ln x$, 則 $\int_{\frac{1}{4}}^{3} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{4}}^{1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + \int_1^3 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -\int_1^{\frac{1}{4}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + \int_1^3 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln 12$

9. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\cdot\operatorname{sgn}(1-x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x - \int_1^2 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x = \left(\frac{4\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{4\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$

10. $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $\int_n^{n+1} \lfloor x \rfloor\,\mathrm{d}x = n$

## 以極限定義求定積分

**結論.** $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

**證.** 由 $k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2) - (k-1)k(k+1)}{3}$, $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$. 又 $k^2 = k(k+1) - k$, $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \sum_{k=1}^{n} \big(k(k+1) - k\big) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

**例.** 求 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$.

**解.** 建立 $[0,\,1]$ 分割 $\mathbb{P}: \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{n}{n}\right\}$, 則 $\Delta x_k = \frac{1}{n}\ \forall\, k = 1, 2, \ldots, n$ 且 $\|P\| \to 0$ 當 $n \to \infty$. $f(x) = x^2$ 且 $f$ 在 $[0,\,1]$ 嚴格遞增, $U(f,\mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n} u_k\,\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{n^2}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$, $L(f,\mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n} l_k\,\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{(k-1)^2}{n^2}\cdot\frac{1}{n} =$

$\dfrac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n-1}k^2$, $L(f,\mathbb{P}) \leqslant R(f,\mathbb{P}) \leqslant U(f,\mathbb{P})$. 由 $\sum_{k=1}^{n}k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\lim_{n\to\infty}U(f,\mathbb{P}) = \lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2 = \lim_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \dfrac{1}{3}$, $\lim_{n\to\infty}L(f,\mathbb{P}) = \lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n-1}k^2 = \lim_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \dfrac{1}{3}$, 故由夾擊定理 $\lim_{n\to\infty}R(f,\mathbb{P}) = \dfrac{1}{3}$.

**結論.** 若 $r\in\mathbb{R}$, $\sum_{k=0}^{n}r^k = \dfrac{r^{n+1}-1}{r-1}$.

**證.** 令 $s = \sum_{k=0}^{n}r^k$, 則 $r\,s = \sum_{k=1}^{n+1}r^k$; $r\,s - s = r^{n+1}-1 \implies s = \dfrac{r^{n+1}-1}{r-1}$.

**例.** 求 $\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x$.

**解.** 建立 $[0,\,1]$ 分割 $\mathbb{P}:\left\{0,\dfrac{1}{n},\dfrac{2}{n},\ldots,\dfrac{n}{n}\right\}$, 則 $\Delta x_k = \dfrac{1}{n}\ \forall\,k=1,2,\ldots,n$ 且 $\|P\|\to 0$ 當 $n\to\infty$. $f(x)=e^x$ 且 $f$ 在 $[0,\,1]$ 嚴格遞增, $U(f,\mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n}u_k\,\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n}e^{\frac{k}{n}}\cdot\dfrac{1}{n} = \dfrac{1}{n}\dfrac{e^{\frac{1}{n}}\left(e^{\frac{n}{n}}-1\right)}{e^{\frac{1}{n}}-1} = \dfrac{e-1}{n}\dfrac{e^{\frac{1}{n}}}{e^{\frac{1}{n}}-1}$, $L(f,\mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n}l_k\,\Delta x_k = \sum_{k=1}^{n}e^{\frac{k-1}{n}}\cdot\dfrac{1}{n} = \dfrac{1}{n}\dfrac{e^{0}\left(e^{\frac{n}{n}}-1\right)}{e^{\frac{1}{n}}-1} = \dfrac{e-1}{n}\dfrac{1}{e^{\frac{1}{n}}-1}$, $L(f,\mathbb{P}) \leqslant R(f,\mathbb{P}) \leqslant U(f,\mathbb{P})$. $\lim_{n\to\infty}U(f,\mathbb{P}) = \lim_{n\to\infty}\dfrac{e-1}{n}\dfrac{e^{\frac{1}{n}}}{e^{\frac{1}{n}}-1} = (e-1)\lim_{x\to 0+}\dfrac{xe^x}{e^x-1} = (e-1)\lim_{x\to 0+}\dfrac{e^x+xe^x}{e^x} = e-1$, $\lim_{n\to\infty}L(f,\mathbb{P}) = \lim_{n\to\infty}\dfrac{e-1}{n}\dfrac{1}{e^{\frac{1}{n}}-1} = (e-1)\lim_{x\to 0+}\dfrac{x}{e^x-1} = (e-1)\lim_{x\to 0+}\dfrac{1}{e^x} = e-1$, 故由夾擊定理 $\lim_{n\to\infty}R(f,\mathbb{P}) = e-1$.

**結論.** $\sum_{k=1}^{n}\cos kx = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}-1\right)$

**證.** 考慮 $\sum_{k=1}^{n}e^{ikx} = \dfrac{e^{ix}(1-e^{inx})}{1-e^{ix}}$, 則 $\sum_{k=1}^{n}\cos kx = \Re\left\{\sum_{k=1}^{n}e^{ikx}\right\} = \Re\left\{\dfrac{e^{ix}(1-e^{inx})}{1-e^{ix}}\right\} = \Re\left\{\dfrac{e^{ix}\,e^{\frac{inx}{2}}\left(e^{-\frac{inx}{2}}-e^{\frac{inx}{2}}\right)}{e^{\frac{ix}{2}}\left(e^{-\frac{ix}{2}}-e^{\frac{ix}{2}}\right)}\right\} = \dfrac{\cos\frac{(n+1)x}{2}\,\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}} = \dfrac{\sin\left(\frac{nx}{2}+\frac{(n+1)x}{2}\right)+\sin\left(\frac{nx}{2}+\frac{(n+1)x}{2}\right)}{2\,\sin\frac{x}{2}} = \dfrac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x-\sin\frac{x}{2}}{2\,\sin\frac{x}{2}} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}-1\right)$.

**例.** 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x$.

**解.** 建立 $\left[0,\,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 分割 $\mathbb{P}:\left\{0,\dfrac{\pi}{2n},\dfrac{2\pi}{2n},\ldots,\dfrac{n\pi}{2n}\right\}$, 則 $\Delta x_k = \dfrac{\pi}{2n}\ \forall\,k=1,2,\ldots,n$ 且 $\|P\|\to 0$ 當 $n\to\infty$, 則積分為 $\lim_{n\to\infty}R(f,\mathbb{P}) = \sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\,\Delta x_k = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\cos\dfrac{k\pi}{2n}\cdot\dfrac{\pi}{2n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(k\left(\dfrac{\pi}{2n}\right)\right)\cdot\dfrac{\pi}{2n} = \lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2n}\right)}-1\right)\cdot\dfrac{\pi}{2n} = \lim_{n\to\infty}\dfrac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{2n}\right)\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2n}}{\sin\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2n}\right)} = \lim_{n\to\infty}\sin\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4n}\right)\pi\cdot\lim_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2n}}{\sin\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2n}\right)} = \sin\dfrac{\pi}{2}\cdot 1 = 1$.

## 微積分基本定理

**定理** (微積分基本定理 (Fundamental Theorem of Calculus, FTC) ).

1. 若 $f$ 在 $[a,\, b]$ 連續, 令 $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 且 $a \leqslant x \leqslant b$, 則 $F'(x) = f(x)\ \forall\, x \in [a,\, b]$.
2. 若 $G'(x) = f(x)\ \forall\, x \in [a,\, b]$, 則 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a) \equiv G(x)\Big|_a^b$.

**註.** 由 FTC, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 可由 $f$ 的反導函數 (不定積分) 得出, 不需繁複極限計算!

**證.**

1. WLOG 令 $h > 0$. 則 $\left|\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x)\right| = \left|\dfrac{1}{h}\displaystyle\int_x^{x+h}(f(\tau)-f(x))\,\mathrm{d}\tau\right| \leqslant \dfrac{1}{h}\displaystyle\int_x^{x+h}\big|f(\tau) - f(x)\big|\,\mathrm{d}\tau \leqslant \max_{x\leqslant\tau\leqslant x+h}\big|f(\tau)-f(x)\big| \to 0$, 當 $h \to 0$ 且 $f$ 為連續.
2. $(G(x)-F(x))' = f(x) - f(x) = 0\ \forall\, x \in [a,b]$, 故 $G(x)-F(x)$ 在 $[a,b]$ 為常數 $\implies G(a)-F(a) = G(b)-F(b) \implies G(b)-G(a) = F(b)-F(a) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

**例** (以 FTC 求定積分).

1. $x^2$ 之反導函數為 $\dfrac{x^3}{3}$, 故 $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$.
2. $e^x$ 之反導函數為 $e^x$, 故 $\displaystyle\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e^1 - e^0 = e - 1$.
3. $\cos x$ 之反導函數為 $\sin x$, 故 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x = \sin\frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$.

**結論** (定積分變數變換).

- 求反導函數後代入: $\displaystyle\int_a^b f'(g(x))\,g'(x)\,\mathrm{d}x = f(g(x))\Big|_{x=a}^{x=b} = f(g(b)) - f(g(a))$
- 變數變換並改變積分範圍: $\displaystyle\int_a^b f'(g(x))\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f'(g(x))\,\mathrm{d}g(x) = \int_{g(a)}^{g(b)} f'(u)\,\mathrm{d}u = f(u)\Big|_{u=g(a)}^{u=g(b)} = f(g(b)) - f(g(a))$

**例.** 求 $\displaystyle\int_0^1 x^3(1+x^4)^3\,\mathrm{d}x$.

**解.**

- 求反導函數後代入: 令 $u = 1 + x^4$, 則 $\mathrm{d}u = 4x^3\,\mathrm{d}x \implies x^3\,\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}u}{4}$, 故 $\displaystyle\int x^3(1+x^4)^3\,\mathrm{d}x = \int(1+x^4)^3\,x^3\,\mathrm{d}x = \int u^3\,\frac{\mathrm{d}u}{4} = \frac{u^4}{16} + c = \frac{(1+x^4)^4}{16} + c$. 故 $\displaystyle\int_0^1 x^3(1+x^4)^3\,\mathrm{d}x = \frac{(1+x^4)^4}{16}\Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{(1+1^4)^4 - (1+0^4)^4}{16} = \frac{15}{16}$.
- 變數變換並改變積分範圍: 令 $u = 1 + x^4$, 則 $\mathrm{d}u = 4x^3\,\mathrm{d}x \implies x^3\,\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}u}{4}$. 積分範圍 $x$ 由 $0$ 至 $1$, 則變數變換後 $u$ 由 $1 + 0^4 = 1$ 至 $1 + 1^4 = 2$, 故 $\displaystyle\int_0^1 x^3(1+x^4)^3\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (1+x^4)^3\,x^3\,\mathrm{d}x = \int_1^2 u^3\,\frac{\mathrm{d}u}{4} = \frac{1}{4}\int_1^2 u^3\,\mathrm{d}u = \frac{1}{16}u^4\Big|_{u=1}^{u=2} = \frac{2^4 - 1^4}{16} = \frac{15}{16}$.

**例.** 求 $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$.

**解.**

- 求反導函數後代入: 令 $u = 1+x^2$, 則 $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x \implies 4x\,\mathrm{d}x = 2\,\mathrm{d}u$, 故 $\displaystyle\int \frac{4x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{2}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = 4\sqrt{u} + c = 4\sqrt{1+x^2} + c$. 故 $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x = 4\sqrt{1+x^2}\Big|_{x=0}^{x=\sqrt{3}} = 4\sqrt{1+3} - 4\sqrt{1} = 4$.
- 變數變換並改變積分範圍: 令 $u = 1+x^2$, 則 $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x \implies 4x\,\mathrm{d}x = 2\,\mathrm{d}u$. 積分範圍 $x$ 由 $0$ 至 $\sqrt{3}$, 則變數變換後 $u$ 由 $1+0^2 = 1$ 至 $1+(\sqrt{3})^2 = 4$, 故 $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x = \int_1^4 \frac{2}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = 4\sqrt{u}\Big|_{u=1}^{u=4} = 4\left(\sqrt{4} - \sqrt{1}\right) = 4$.

**例.** 求 $\displaystyle\int_0^{\pi} 3\cos^2 x \sin x\,\mathrm{d}x$.

**解.**

- 求反導函數後代入: 令 $u = \cos x$, 則 $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x \implies \sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u$, 故 $\displaystyle\int 3\cos^2 x \sin x\,\mathrm{d}x = -3\int u^2\,\mathrm{d}u = -u^3 + c = -\cos^3 x + c$. 故 $\displaystyle\int_0^{\pi} 3\cos^2 x \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos^3 x\Big|_{x=0}^{x=\pi} = -(\cos^3\pi - \cos^3 0) = -((-1)^3 - 1^3) = 2$.
- 變數變換並改變積分範圍: 令 $u = \cos x$, 則 $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x \implies \sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u$. 積分範圍 $x$ 由 $0$ 至 $\pi$, 則變數變換後 $u$ 由 $\cos 0 = 1$ 至 $\cos\pi = -1$, 故 $\displaystyle\int_0^{\pi} 3\cos^2 x \sin x\,\mathrm{d}x = -\int_1^{-1} 3u^2\,\mathrm{d}u = -u^3\Big|_{u=1}^{u=-1} = -((-1)^3 - 1^3) = 2$.

**例.** 若 $f$ 在 $[a,b]$ 二次可微且 $f(a) = f(b) = 0$, 證明 $\displaystyle\int_a^b (x-a)(b-x)\,f''(x)\,\mathrm{d}x = -2\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\displaystyle\int_a^b (x-a)(b-x)\,f''(x)\,\mathrm{d}x = \big((x-a)(b-x)\,f'(x) - (a+b-2x)\,f(x)\big)\Big|_a^b - 2\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \big((b-a)(b-b)\,f'(b) - (a+b-2b)\,f(b)\big) - \big((a-a)(b-a)\,f'(a) - (a+b-2a)\,f(a)\big) - 2\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -2\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

| Diff | | Int |
|---|---|---|
| $(x-a)(b-x)$ | $+$ | $f''(x)$ |
| $a+b-2x$ | $-$ | $f'(x)$ |
| $-2$ | $+$ | $f(x)$ |
| $0$ | | $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ |

$$\int (x-a)(b-x)\,f''(x)\,\mathrm{d}x = \big((x-a)(b-x)\,f'(x) - (a+b-2x)\,f(x)\big) - 2\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

**性質.** 令 $\displaystyle F(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 則 $F'(x) = f(u(x))\cdot u'(x) - f(v(x))\cdot v'(x)$.

**證.** 令 $a \in \mathbb{R}$, $\displaystyle F(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \int_a^{u(x)} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau - \int_a^{v(x)} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$. 令 $\displaystyle G(x) \equiv \int_a^x f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 則 $G'(x) = f(x)$, $\displaystyle F(x) = \int_a^{u(x)} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau - \int_a^{v(x)} f(\tau)\,\mathrm{d}\tau = G(u(x)) - G(v(x))$; 故 $F'(x) = (G(u(x)) - G(v(x)))' = G'(u(x))\cdot u'(x) - G'(v(x))\cdot v'(x) = f(u(x))\cdot u'(x) - f(v(x))\cdot v'(x)$.

**例.**

1. $F(x)=\int_1^x \frac{1}{1+\tau^4}\,\mathrm{d}\tau \implies F'(x)=\frac{1}{1+x^4}$
2. $F(x)=\int_2^{\sqrt{x}} \sin\tau\,\mathrm{d}\tau \implies F'(x)=\sin\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$
3. $F(x)=\int_x^{2x} \tau^3\,\mathrm{d}\tau \implies F'(x)=(2x)^3\cdot 2-x^3\cdot 1=15x^3$
4. $F(x)=\int_{\sin x}^{\tan^{-1}x} e^{\tau^2}\,\mathrm{d}\tau \implies F'(x)=e^{(\tan^{-1}x)^2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-e^{\sin^2 x}\cdot\cos x$

**例.** 若 $g(x)=\int_0^{\cos x}(1+\sin(t^2)),\mathrm{d}t$, $f(x)=\int_0^{g(x)}\frac{1}{\sqrt{1+t^3}}\,\mathrm{d}t$, 求 $f'\big(\frac{\pi}{2}\big)$.

**解.** $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+g(x)^3}}\cdot g'(x)$, $g'(x)=(1+\sin(\cos^2 x))\cdot(-\sin x)$. 代入 $x=\frac{\pi}{2}$, $g\big(\frac{\pi}{2}\big)=0$, $g'\big(\frac{\pi}{2}\big)=-1$, 故 $f'\big(\frac{\pi}{2}\big)=-1$.

**例.** 若 $\int_0^{x^2} f(t)\,\mathrm{d}t=x\sin\pi x$, 求 $f'(9)$.

**解.** $\int_0^{x^2} f(t)\,\mathrm{d}t=x\sin\pi x$ 兩邊對 $x$ 微分得 $f(x^2)\cdot 2x=\sin\pi x+x\cdot\pi\cos\pi x$. 兩邊再對 $x$ 微分得 $(f'(x^2)\cdot 2x)\cdot 2x+f(x^2)\cdot 2=\pi\cos\pi x+\pi\cos\pi x-x\cdot\pi^2\sin\pi x$. 代入 $x=3$, 則 $(f'(9)\cdot 2\cdot 3)\cdot 2\cdot 3+f(9)\cdot 2=\pi\cos 3\pi+\pi\cos 3\pi-3\cdot\pi^2\sin 3\pi \implies f'(9)\cdot 36+f(9)\cdot 2=-2\pi$. 又 $f(3^2)\cdot(2\cdot 3)=\sin 3\pi+3\cdot\pi\cos 3\pi \implies f(9)=-\frac{\pi}{2}$, 故 $f'(9)=-\frac{\pi}{36}$.

**例.** 求函數 $f$ 與 $a\in\mathbb{R}$ 使 $6+\int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t=2\sqrt{x}$, $\forall\, x>0$.

**解.** $6+\int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t=2\sqrt{x}$ 兩邊對 $x$ 微分得 $\frac{f(x)}{x^2}=\frac{1}{\sqrt{x}} \implies f(x)=x^{\frac{3}{2}}$. 代入原式得 $6+\int_a^x \frac{t^{\frac{3}{2}}}{t^2}\,\mathrm{d}t=6+\int_a^x \frac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t=6+2\sqrt{t}\Big|_a^x=6+2\sqrt{x}-2\sqrt{a}=2\sqrt{x} \implies a=9$.

**例.** 求下列極限.

1. $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(\sec t-1)\,\mathrm{d}t}{x^3}$
2. $\lim_{x\to\infty}\frac{\int_{x^2}^0 e^{t-x^2}(2t^2+1)\,\mathrm{d}t}{x^4}$
3. $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^{\tan x} f(u)(\sin x-\cos u)\,\mathrm{d}u$, $f$ 為連續函數

**解.**

1. $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(\sec t-1)\,\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sec x-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sec x\tan x}{6x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sec x\tan x\cdot\tan x+\sec x\cdot\sec^2 x}{6}=\frac{1}{6}$.
2. $\lim_{x\to\infty}\frac{\int_{x^2}^0 e^{t-x^2}(2t^2+1)\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to\infty}\frac{\int_{x^2}^0 e^t(2t^2+1)\,\mathrm{d}t}{e^{x^2}x^4}=\lim_{x\to\infty}\frac{-e^{x^2}(2(x^2)^2+1)\cdot 2x}{e^{x^2}\,2x\cdot x^4+e^{x^2}\cdot 4x^3}=\lim_{x\to\infty}\frac{-(4x^5+2x)}{2x^5+4x^3}=-2$.

3. $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^{\tan x} f(u)(\sin x-\cos u)\,\mathrm{d}u=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\tan x} f(u)(\sin x-\cos u)\,\mathrm{d}u}{x}$
$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\int_0^{\tan x} f(u)\,\mathrm{d}u-\int_0^{\tan x} f(u)\cos u\,\mathrm{d}u}{x}$
$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\int_0^{\tan x} f(u)\,\mathrm{d}u+\sin x\cdot f(\tan x)\cdot\sec^2 x-f(\tan x)\cos(\tan x)\cdot\sec^2 x}{1}=-f(0)$

## 4.3 積分技巧

### 部份分式

**例** (動機)**.** 若 $a\neq 0$, 求 $\int\frac{1}{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x$.

**解.** 由 $\frac{1}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)$, $\int\frac{1}{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\big(\ln|x-a|-\ln|x+a|\big)$

**結論.**

- 實係數多項式可分解成不可約的一次及二次因式的乘積.
- 有理式可寫成多項式與真分式之和.
- 若 $\frac{p(x)}{q(x)}$ 為一真分式, $q(x)=(x+a_1)^{m_1}(x+a_2)^{m_2}\cdots(x+a_k)^{m_k}\cdot(x^2+b_1x+c_1)^{n_1}(x^2+b_2x+c_2)^{n_2}\cdots(x^2+b_lx+c_l)^{n_l}$, 其中 $(x+a_i)$, $(x^2+b_ix+c_i)$ 均相異, $(x^2+b_ix+c_i)$ 為不可分解之二次式 $(b_i^2-4c_i<0)$ , 則

$$\begin{aligned}\frac{p(x)}{q(x)}\ =&\frac{\alpha_{11}}{x+a_1}+\frac{\alpha_{12}}{(x+a_1)^2}+\cdots+\frac{\alpha_{1m_1}}{(x+a_1)^{m_1}}+\\&\frac{\alpha_{21}}{x+a_2}+\frac{\alpha_{22}}{(x+a_2)^2}+\cdots+\frac{\alpha_{2m_2}}{(x+a_2)^{m_2}}+\cdots+\\&\frac{\alpha_{k1}}{x+a_k}+\frac{\alpha_{k2}}{(x+a_k)^2}+\cdots+\frac{\alpha_{km_k}}{(x+a_k)^{m_k}}+\\&\frac{\beta_{11}x+\gamma_{11}}{x^2+b_1x+c_1}+\frac{\beta_{12}x+\gamma_{12}}{(x^2+b_1x+c_1)^2}+\cdots+\frac{\beta_{1n_1}x+\gamma_{1n_1}}{(x^2+b_1x+c_1)^{n_1}}+\\&\frac{\beta_{21}x+\gamma_{21}}{x^2+b_2x+c_2}+\frac{\beta_{22}x+\gamma_{22}}{(x^2+b_2x+c_2)^2}+\cdots+\frac{\beta_{2n_2}x+\gamma_{2n_2}}{(x^2+b_1x+c_1)^{n_2}}+\cdots+\\&\frac{\beta_{l1}x+\gamma_{l1}}{x^2+b_lx+c_l}+\frac{\beta_{l2}x+\gamma_{l2}}{(x^2+b_lx+c_l)^2}+\cdots+\frac{\beta_{ln_l}x+\gamma_{ln_l}}{(x^2+b_lx+c_l)^{n_l}}\end{aligned}$$

其中 $\alpha_{ij}$, $\beta_{ij}$, $\gamma_{ij}\in\mathbb{R}$.

**註.** 任一有理函數之積分可分解為多項式積分與以下型式積分:

- $\int\frac{1}{(x+a)^n}\,\mathrm{d}x$, $n\in\mathbb{N}$
- $\int\frac{f(x)}{(x^2+bx+c)^n}\,\mathrm{d}x$, $f(x)=1$ 或 $f(x)=x$; $b^2-4c<0$, $n\in\mathbb{N}$

**例.** 求 $\int\frac{x}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\frac{x}{x^2-5x+6}=\frac{x}{(x-3)(x-2)}=\frac{A}{x-3}+\frac{B}{x-2}\implies x=A\,(x-2)+B\,(x-3)$. 代入 $x=3\implies 3=A$; 代入 $x=2\implies 2=B(2-3)\implies B=-2$, 故 $\frac{x}{x^2-5x+6}=\frac{3}{x-3}-\frac{2}{x-2}$, $\int\frac{x}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x=\int\left(\frac{3}{x-3}-\frac{2}{x-2}\right)\mathrm{d}x=3\ln|x-3|-2\ln|x-2|$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{1}{x^3+1}\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\displaystyle\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} \implies 1 = A\left(x^2-x+1\right) + (Bx+C)\left(x+1\right)$. 代入 $x=-1 \implies 1 = A((-1)^2-(-1)+1) = 3A \implies A = \frac{1}{3}$; 代入 $x=0 \implies 1 = A+C \implies C = \frac{2}{3}$; 代入 $x=1 \implies 1 = A+(B+C)\cdot 2 \implies 1 = \frac{1}{3} + \left(B+\frac{2}{3}\right)\cdot 2 \implies B = -\frac{1}{3}$; 故 $\displaystyle\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{x-2}{x^2-x+1}\right)$, $\displaystyle\int \frac{1}{x^3+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{x-2}{x^2-x+1}\right)\mathrm{d}x = \int \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{\frac{1}{2}\left(2x-1\right) - \frac{3}{2}}{x^2-x+1}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{6}\int \frac{2x-1}{x^2-x+1}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2-x+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{2x-1}{\sqrt{3}}$

**例.** 求 $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^3 x}\,\mathrm{d}x$.

**解.** $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^3 x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{\cos^4 x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^2}\,\mathrm{d}x$. 令 $u = \sin x$, 則 $\mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$, 則 $\displaystyle\int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{(1-u^2)^2}\,\mathrm{d}u$. $\displaystyle\frac{1}{(1-u^2)^2} = \frac{1}{(u-1)^2(u+1)^2} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{(u-1)^2} + \frac{C}{u+1} + \frac{D}{(u+1)^2} \implies 1 = A\left(u-1\right)(u+1)^2 + B\left(u+1\right)^2 + C\left(u-1\right)^2(u+1) + D\left(u-1\right)^2$. 代入 $u=1 \implies 1 = 4B \implies B = \frac{1}{4}$; 代入 $u=-1 \implies 1 = 4D \implies D = \frac{1}{4}$; 代入 $u=0 \implies 1 = -A+B+C+D \implies 1 = -A+\frac{1}{4}+C+\frac{1}{4} \implies \frac{1}{2} = -A+C$; 代入 $u=2 \implies 1 = 9A+9B+3C+D \implies 1 = 9A+\frac{9}{4}+3C+\frac{1}{4} \implies A = -\frac{1}{4}$, $C = \frac{1}{4}$; 則 $\displaystyle\frac{1}{(1-u^2)^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{-1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2} + \frac{1}{u+1} + \frac{1}{(u+1)^2}\right)$, $\displaystyle\int \frac{1}{(1-u^2)^2}\,\mathrm{d}u = \int \frac{1}{4}\left(\frac{-1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2} + \frac{1}{u+1} + \frac{1}{(u+1)^2}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\left(-\ln|u-1| - \frac{1}{u-1} + \ln|u+1| - \frac{1}{u+1}\right) = \frac{1}{4}\left(-\ln|\sin x-1| - \frac{1}{\sin x-1} + \ln|\sin x+1| - \frac{1}{\sin x+1}\right)$.

部份分式另解: $\displaystyle\frac{1}{(1-u^2)^2} = \left(\frac{1}{u^2-1}\right)^2 = \left(\frac{1}{(u-1)(u+1)}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{(u-1)^2} - \frac{2}{(u-1)(u+1)} + \frac{1}{(u+1)^2}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{(u-1)^2} - \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1}\right) + \frac{1}{(u+1)^2}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{-1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2} + \frac{1}{u+1} + \frac{1}{(u+1)^2}\right)$.

## 三角函數代換

**結論.**

- 遇 $\sqrt{a^2-x^2}$, 考慮 $x = a\sin\theta \implies \theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$, $\mathrm{d}x = a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$
- 遇 $\sqrt{a^2+x^2}$, 考慮 $x = a\tan\theta \implies \theta = \tan^{-1}\frac{x}{a}$, $\mathrm{d}x = a\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$
- 遇 $\sqrt{x^2-a^2}$, 考慮 $x = a\sec\theta \implies \theta = \sec^{-1}\frac{x}{a}$, $\mathrm{d}x = a\sec\theta\,\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$
- 遇 $\sin x$, $\cos x$ 之有理式, 考慮 $u = \tan\frac{x}{2}$, 由以下化為 $u$ 之有理式:
  - $\displaystyle\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}\frac{1}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{2u}{1+u^2}$
  - $\displaystyle\cos x = 2\cos^2\frac{x}{2} - 1 = 2\cdot\frac{1}{1+u^2} - 1 = \frac{1-u^2}{1+u^2}$

$$-\ \mathrm{d}u = \frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x = \frac{2}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$$

**例.** 若 $a \neq 0$, 求下列不定積分.

1. $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}\,\mathrm{d}x$
4. $\displaystyle\int \sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x$
5. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x$
6. $\displaystyle\int \frac{1}{a+\sin x}\,\mathrm{d}x$, $a>1$

**解.**

1. 令 $x = a\sin\theta$, 則 $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{a^2-a^2\sin^2\theta}\,a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = a^2\int \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = a^2\int \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta$ $\displaystyle= \frac{a^2}{2}\theta + \frac{a^2}{4}\sin 2\theta = \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + \frac{a^2}{2}\frac{x}{a}\cdot\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a} = \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}$.
2. 令 $x = a\sec\theta$, 則 $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{a\sec\theta\tan\theta}{a^2\tan^2\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{a}\int \frac{1}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{a}\int \csc\theta\,\mathrm{d}\theta$ $\displaystyle= \frac{1}{a}\int \csc\theta\,\frac{\csc\theta+\cot\theta}{\csc\theta+\cot\theta}\,\mathrm{d}\theta = -\frac{1}{a}\int \frac{\mathrm{d}(\csc\theta+\cot\theta)}{\csc\theta+\cot\theta} = -\frac{1}{a}\ln|\csc\theta+\cot\theta| = -\frac{1}{a}\ln\left|\frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}} + \frac{a}{\sqrt{x^2-a^2}}\right| = -\frac{1}{a}\ln\left|\frac{\sqrt{x+a}}{\sqrt{x-a}}\right| = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$.
3. 令 $x = a\tan\theta$, 則 $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{a\sec^2\theta}{a^2\tan^2 x\cdot a\sec\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int \frac{\sec\theta}{a^2\tan^2\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int \frac{\cos\theta}{a^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$ $\displaystyle= -\frac{1}{a^2\sin\theta} = -\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a^2x}$.
4. 令 $x = a\tan\theta$, 則 $\displaystyle\int \sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = \int a\sec\theta\cdot a\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = a^2\int \sec^3\theta\,\mathrm{d}\theta$. 令 $u = \sec\theta$, 則 $\mathrm{d}u = \sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$; 令 $\mathrm{d}v = \sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$, 則 $v = \tan\theta$. 故 $\displaystyle\int \sec^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \sec\theta\cdot\tan\theta - \int \tan\theta\cdot\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta = \sec\theta\cdot\tan\theta - \int \sec\theta\cdot\tan^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \sec\theta\cdot\tan\theta - \int \sec\theta\cdot(\sec^2\theta-1)\,\mathrm{d}\theta = \sec\theta\cdot\tan\theta - \int \sec^3\theta\,\mathrm{d}\theta + \int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta \implies \int \sec^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\sec\theta\cdot\tan\theta + \int\sec\theta\,\mathrm{d}\theta}{2} = \frac{\sec\theta\cdot\tan\theta + \ln|\sec\theta+\tan\theta|}{2}$; $\displaystyle\int \sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = a^2\int \sec^3\theta\,\mathrm{d}\theta = a^2\frac{\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\cdot\frac{x}{a} + \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a} + \frac{x}{a}\right|}{2} = \frac{x\sqrt{x^2+a^2} + a^2\ln\left|\sqrt{x^2+a^2}+x\right| - a^2\ln|a|}{2}$
5. 令 $x = a\sec\theta$, 則 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{a\sec\theta\tan\theta}{a\tan\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta = \ln|\sec\theta+\tan\theta|$ $\displaystyle= \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right|$.
6. 令 $u = \tan\frac{x}{2}$, 則 $\displaystyle\int \frac{1}{a+\sin x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{a+\frac{2u}{1+u^2}}\,\frac{2}{1+u^2}\,\mathrm{d}u = 2\int \frac{1}{au^2+2u+a}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{a\sqrt{\frac{a^2-1}{a^2}}}\tan^{-1}\frac{u+\frac{1}{a}}{\sqrt{\frac{a^2-1}{a^2}}}$ $\displaystyle= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}}\tan^{-1}\frac{au+1}{\sqrt{a^2-1}} = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}}\tan^{-1}\frac{a\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{a^2-1}}$.

## 4.4 瑕積分

**定義** (瑕積分 (improper integral) ).

- 無限區間 (第一型) 瑕積分

- 若 $f(x)$ 在 $[a, \infty)$ 連續, 則 $\displaystyle\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
- 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 連續, 則 $\displaystyle\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
- 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 連續, 則任取 $c \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$.

- 不連續點 (第二型) 瑕積分
  - 若 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 連續, 則 $\displaystyle\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to a+}\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
  - 若 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 連續, 則 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to b-}\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$.
  - 令 $c \in (a, b)$. 若 $f(x)$ 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 連續且在 $x = c$ 不連續, 則 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

**例.** 1. $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$. 2. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$. 3. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

**解.**

1. $\displaystyle\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = 2\lim_{b\to\infty}\int_0^b \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = 2\lim_{b\to\infty}\tan^{-1} b = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi$.
2. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\big(-\frac{1}{b}+1\big) = 1$
3. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to 0+}\int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to 0+} 2\sqrt{x}\Big|_c^1 = \lim_{c\to 0+}(2-2\sqrt{c}) = 2$

**定理.** 給定 $0 < a < \infty$.

- $\displaystyle\int_a^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 當 $p > 1$ 收斂至 $\dfrac{a^{1-p}}{p-1}$, 當 $p \leqslant 1$ 發散至 $\infty$.
- $\displaystyle\int_0^a \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 當 $p < 1$ 收斂至 $\dfrac{a^{1-p}}{1-p}$, 當 $p \geqslant 1$ 發散至 $\infty$.

**定理.** 令 $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$, $f$, $g$ 在 $(a, b)$ 連續, 且 $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)\ \forall\, x$.

- 若 $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 收斂, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收斂.
- 若 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 發散, $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 發散.

**定理.** 令 $f$, $g$ 在 $[a, \infty)$, $a \in \mathbb{R}$ 連續, 均為正值, 且 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在, 則 $\displaystyle\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ 與 $\displaystyle\int_a^\infty g(x)\,\mathrm{d}x$ 同為收斂或發散.

**例.** 證明 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 收斂.

**解.** 由 $e^{-x^2} \leqslant 1\ \forall\, 0 \leqslant x < 1$ 及 $e^{-x^2} \leqslant e^{-x}\ \forall\, x \geqslant 1$, $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x + \int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 1\,\mathrm{d}x + \int_1^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1 + \frac{1}{e}$, 故 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 收斂.

**例** ($\Gamma$ 函數)**.** 已知 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

1. 證明 $\Gamma(x) \equiv \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收斂, $\forall\, x > 0$.
2. 證明 $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$, $\forall\, x > 0$.
3. 證明 $\Gamma(n+1) = n!$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.
4. 求 $\Gamma\Big(\dfrac{1}{2}\Big)$ 與 $\Gamma\Big(\dfrac{3}{2}\Big)$.
5. 求 $\int_0^\infty t\,e^{-\alpha\,t^2}\,\mathrm{d}t$ 與 $\int_0^\infty t^2\,e^{-\alpha\,t^2}\,\mathrm{d}t$, $\alpha > 0$.

**解.**

1. (證一) 由 $\lim\limits_{t\to\infty} t^{x-1}e^{-\frac{t}{2}} = 0$, $\exists\, T > 0$ 使 $t^{x-1}e^{-\frac{t}{2}} \leqslant 1\ \forall\, t \geqslant T$. $\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \int_0^T t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t + \int_T^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^T t^{x-1}\,\mathrm{d}t + \int_T^\infty 1\cdot e^{-\frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t = \dfrac{T^x}{x} + 2\,e^{-\frac{T}{2}}$. 故 $\forall\, x > 0$, $\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收斂.

   (證二) $\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t + \int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$. $\int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收斂, 因為

   - $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 t^{x-1}\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^x}{x}\Big|_{x=0}^{x=1} = \dfrac{1}{x}$, $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收斂.
   - $\int_1^\infty \dfrac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$ 收斂, $\lim\limits_{t\to\infty} \dfrac{t^{x-1}e^{-t}}{\frac{1}{t^2}} = \lim\limits_{t\to\infty} \dfrac{t^{x+1}}{e^t} = 0$, $\int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ 收斂.

2. $\Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \lim\limits_{\substack{a\to 0+\\ b\to\infty}} \int_a^b t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t$. 令 $u = t^x$, 則 $\mathrm{d}u = x t^{x-1}\,\mathrm{d}t$. 令 $\mathrm{d}v = e^{-t}\,\mathrm{d}t$, 則 $v = -e^{-t}$.
   故 $\lim\limits_{\substack{a\to 0+\\ b\to\infty}} \int_a^b t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \lim\limits_{\substack{a\to 0+\\ b\to\infty}} \Big( -t^x e^{-t}\Big|_a^b + \int_a^b e^{-t}\cdot x t^{x-1}\,\mathrm{d}t\Big) = 0 + x\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = x\,\Gamma(x)$.

3. 由上 $\Gamma(n+1) = n\,\Gamma(n) = n(n-1)\,\Gamma(n-2) = \cdots = n(n-1)\cdots 2\,\Gamma(1)$, 又 $\Gamma(1) = \lim\limits_{b\to\infty} \int_0^b e^{-t}\,\mathrm{d}t = \lim\limits_{b\to\infty} -e^{-t}\Big|_0^b = \lim\limits_{b\to\infty} 1 - e^{-b} = 1$, 得證.

4. (a) $\Gamma\Big(\dfrac{1}{2}\Big) = \int_0^\infty t^{-\frac{1}{2}}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \dfrac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$. 令 $u = \sqrt{t}$, 則 $t = u^2$, $\mathrm{d}u = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t \implies \dfrac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t = 2\,\mathrm{d}u$.
   積分範圍 $t$ 由 $0$ 至 $\infty$, 則變數變換後 $u$ 由 $\sqrt{0} = 0$ 至 $\sqrt{\infty} = \infty$, 故 $\Gamma\Big(\dfrac{1}{2}\Big) = \int_0^\infty \dfrac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t = 2\int_0^\infty e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = 2\cdot\dfrac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$.

   (b) 由 $\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x)$, $\Gamma\Big(\dfrac{3}{2}\Big) = \Gamma\Big(\dfrac{1}{2}+1\Big) = \dfrac{1}{2}\,\Gamma\Big(\dfrac{1}{2}\Big) = \dfrac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

5. (a) 令 $u = \alpha\,t^2$, 則 $\mathrm{d}u = 2\,\alpha\,t\,\mathrm{d}t \implies t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}u}{2\alpha}$. 積分範圍 $t$ 由 $0$ 至 $\infty$, 則變數變換後 $u$ 由 $\alpha\cdot 0^2 = 0$ 至 $\alpha\cdot\infty^2 = \infty$, 故 $\int_0^\infty t\,e^{-\alpha\,t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{-u}\,\dfrac{\mathrm{d}u}{2\,\alpha} = \dfrac{1}{2\,\alpha}\int_0^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u = \dfrac{1}{2\,\alpha}\Big( -e^{-u}\Big|_0^\infty\Big) = \dfrac{1}{2\,\alpha}$.

   (b) 令 $u = \alpha\,t^2$, 則 $t = \dfrac{\sqrt{u}}{\sqrt{\alpha}}$, $\mathrm{d}u = 2\,\alpha\,t\,\mathrm{d}t \implies t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}u}{2\,\alpha}$. 積分範圍 $t$ 由 $0$ 至 $\infty$, 則變數變換後 $u$ 由 $\alpha\cdot 0^2 = 0$ 至 $\alpha\cdot\infty^2 = \infty$, 故 $\int_0^\infty t^2\,e^{-\alpha\,t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty t\,e^{-\alpha\,t^2}\,t\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \dfrac{\sqrt{u}}{\sqrt{\alpha}}\,e^{-u}\,\dfrac{\mathrm{d}u}{2\,\alpha} = \dfrac{1}{2\,\alpha^{\frac{3}{2}}}\int_0^\infty u^{\frac{1}{2}}\,e^{-u}\,\mathrm{d}u = \dfrac{1}{2\,\alpha^{\frac{3}{2}}}\cdot\Gamma\Big(\dfrac{3}{2}\Big) = \dfrac{1}{2\,\alpha^{\frac{3}{2}}}\cdot\dfrac{1}{2}\sqrt{\pi} = \dfrac{\sqrt{\pi}}{4\,\alpha^{\frac{3}{2}}}$.