第三章 微分應用

3.1 均值定理

定理 (Rolle)**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微，且 $f(a)=f(b)$，則存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。



定理 (均值定理（mean-value theorem，MVT）)**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微，則存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。



註. 不滿足『$f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微』時的反例。

- 令 $a=0$，$b=2$，且

$$f(x)=\begin{cases}0 & 若\ x\leqslant 1\\ 1 & 若\ x>1\end{cases}$$



當 $x\neq 1$ 時 $f'(x)=0$，但連接 $(a,\ f(a))=(0,\ 0)$ 與 $(b,\ f(b))=(2,\ 1)$ 之割線斜率為 $\dfrac{1}{2}$。

- 令 $a=-1$，$b=1$, $f(x)=|x|$。

$$f'(x)=\begin{cases}-1 & 若\ x<0\\ \mathrm{DNE} & 若\ x=0\\ 1 & 若\ x>0\end{cases}$$



當 $x\neq 0$ 時 $f'(x)=\pm 1$，但連接 $(a,\ f(a))=(-1,\ 1)$ 與 $(b,\ f(b))=(1,\ 1)$ 之割線斜率為 0。

性質. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微。若

1. $\forall x\in(a,b)\ f'(x)>0$，則 f 在 $[a,b]$ 嚴格遞增。
2. $\forall x\in(a,b)\ f'(x)<0$，則 f 在 $[a,b]$ 嚴格遞減。
3. $\forall x\in(a,b)\ f'(x)\geqslant 0$，則 f 在 $[a,b]$ 遞增。
4. $\forall x\in(a,b)\ f'(x)\leqslant 0$，則 f 在 $[a,b]$ 遞減。

證. 令 x，$y \in [a,b]$，$x < y$。由 MVT $\exists\, c \in (x,y) \subseteq (a,b)$ 使 $f(y) - f(x) = f'(c)\,(y-x)$。又 $y - x > 0$，$f(y) - f(x)$ 與 $f'(c)$ 同號。

結論. 若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 (a,b) 可微，且 $f'(x) = g'(x)\ \forall x \in (a,b)$，則存在 $C \in \mathbb{R}$ 使 $f(x) = g(x) + C,\ \forall x \in [a,b]$。

例. 證明：$2x - 1 = \sin x$ 僅有唯一解。

解. 令 $f(x) = 2x - 1 - \sin x$，則 $\forall x\ (f'(x) = 2 - \cos x > 0)$，$f(0) = -1 < 0$，$f(1) = 1 - \sin 1 > 0$，故由 Bolzano 定理，存在 $c \in (0,1)$ 使 $f(c) = 0$。若存在另一 $c_0 \neq c$ 使 $f(c_0) = 0$，則由 Rolle 定理，存在 c_1 介於 c，c_0 間使 $f'(c_1) = 0$，與 $\forall x\ (f'(x) = 2 - \cos x > 0)$ 矛盾；得證。

例. 證明：$\ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) > \dfrac{1}{1+x}$，$\forall x > 0$。

解. 考慮 $\ln x$ 在 $[x, x+1]$，$x > 0$。由 MVT $\exists\, c \in (x, x+1)$ $\ln(x+1) - \ln x = \dfrac{1}{c} > \dfrac{1}{x+1}$。

例. 證明：$\tan x > x$，$\forall x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$。

解. $\forall x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，tan 在 $[0,x]$ 連續，在 $(0,x)$ 可微，故由 MVT $\exists\, c \in (0,x)$ $\tan x - \tan 0 = \sec^2 c \cdot x > x$。

例. 證明：$\dfrac{2}{\pi} < \dfrac{\sin x}{x} < 1$，$\forall x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$。

解. 令 $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{若 } x \neq 0 \\ 1 & \text{若 } x = 0 \end{cases}$，則 g 為連續，且 $\forall x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ $\quad g'(x) = \dfrac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \dfrac{\cos x}{x^2}(x - \tan x) < 0$

$\implies$ g 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 為嚴格遞減函數 $\implies \dfrac{2}{\pi} = g\left(\dfrac{\pi}{2}\right) < g(x) = \dfrac{\sin x}{x} < g(0) = 1$

例. 證明 $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \dfrac{\pi}{2}$，$-1 < x < 1$。

解. 令 $f(x) = \sin^{-1} x + \cos^{-1} x$，則 $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$，故 $f(x)$ 為常數；$f(x) \equiv f(0) = \dfrac{\pi}{2}$。

3.2 L'Hôpital 法則

定理 (L'Hôpital 法則（LHR）). 若 f 與 g 為實可微函數，且在 (a,b) 上 $g'(x) \neq 0$（$a,\, b \in \overline{\mathbb{R}}$）。假設

$$\lim_{x\to a+} f(x) = \lim_{x\to a+} g(x) = 0 \quad \left(\frac{0}{0}\text{ 型}\right) \qquad \text{或} \qquad \lim_{x\to a+} g(x) = \infty \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\text{ 型}\right)$$

若 $\displaystyle\lim_{x\to a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$，則 $\displaystyle\lim_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$。

不定型	$\dfrac{0}{0}$	$\dfrac{\infty}{\infty}$	$0 \cdot \infty$	$\infty - \infty$	0^0	∞^0	1^∞
範例	$\displaystyle\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$	$\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x}$	$\displaystyle\lim_{x\to 0+} x \ln\frac{1}{x}$	$\displaystyle\lim_{x\to 1+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right)$	$\displaystyle\lim_{x\to 0+} x^x$	$\displaystyle\lim_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}}$	$\displaystyle\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx}$

例 $(\frac{0}{0})$. 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$。

解. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin x}{1+\cos 2x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-\cos x}{-2\sin 2x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-1}{-4\sin x}=\dfrac{1}{4}$。

例 $(\frac{\infty}{\infty})$. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{e^x}$。

解. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{e^x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{e^x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{e^x}=0$。

例 $(0\cdot\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to 0+}x\ln\dfrac{1}{x}$。

解. $\lim\limits_{x\to 0+}x\ln\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\ln\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0+}x=0$。

例 $(\infty-\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to 1+}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$。

解. $\lim\limits_{x\to 1+}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)=\lim\limits_{x\to 1+}\dfrac{x\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x}=\lim\limits_{x\to 1+}\dfrac{1+\ln x-1}{(x-1)\frac{1}{x}+\ln x}=\lim\limits_{x\to 1+}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}}=\dfrac{1}{2}$。

例 (0^0). 求 $\lim\limits_{x\to 0+}x^x$。

解. 求 $\lim\limits_{x\to 0+}x^x=\lim\limits_{x\to 0+}\exp\{x\ln x\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0+}x\ln x\right\}=\exp\left\{-\lim\limits_{x\to 0+}x\ln\dfrac{1}{x}\right\}=e^0=1$。

例 (∞^0). 求 $\lim\limits_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}$。

解. $\lim\limits_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\exp\left\{\ln x^{\frac{1}{x}}\right\}=\lim\limits_{x\to\infty}\exp\left\{\dfrac{1}{x}\ln x\right\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln x}{x}\right\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{1}\right\}=e^0=1$。

例 (1^∞). 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}$, $a,\ b\in\mathbb{R}$。

解. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}=\lim\limits_{x\to\infty}\exp\left\{\ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}\right\}=\lim\limits_{x\to\infty}\exp\left\{bx\ \ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)\right\}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty}bx\ \ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)\right\}=\exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{a}{x})}{\frac{1}{x}}\right\}=\exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{1+\frac{a}{x}}\cdot\frac{-a}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}}\right\}=\exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a}{1+\frac{a}{x}}\right\}=e^{ba}$。

3.3 極值問題

定義. 給定 $f:I\to\mathbb{R}$, $B(x_i,h)\equiv\{x\mid |x-x_i|<h\}$。

- f 在 $x_{\mathrm{M}}\in I$ 有最大值（global maximum）$f(x_{\mathrm{M}})$: $f(x_{\mathrm{M}})\geqslant f(x),\ \forall x\in I$。
- f 在 $x_{\mathrm{m}}\in I$ 有最小值（global minimum）$f(x_{\mathrm{m}})$: $f(x_{\mathrm{m}})\leqslant f(x),\ \forall x\in I$。
- f 在 $x_0\in I$ 有極大值（local maximum）$f(x_0)$: $\exists h_0>0$ 使 $f(x_0)\geqslant f(x),\ \forall x\in B(x_0,h_0)\cap I$。
- f 在 $x_1\in I$ 有極小值（local minimum）$f(x_1)$: $\exists h_1>0$ 使 $f(x_1)\leqslant f(x),\ \forall x\in B(x_1,h_1)\cap I$。

例.

- $f(x)=\sin x$ 在 $I=\mathbb{R}$ 有最大值 1，最小值 -1。





- $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在 $I = \mathbb{R}$ 沒有最大值、最小值。
- $f(x) = x$ 在 $I = (0, 1)$ 沒有最大值、最小值。
- $f(x) = x$ 在 $I = [0, 1]$ 有最大值 1、最小值 0。
- 若 $I = [-3, 3]$，$f(x) = x^3 - 3x$ 在 $x = 3$ 有最大值 18、在 $x = -3$ 有最小值 -18、在 $x = -1$ 有極大值 2、在 $x = 1$ 有極小值 -2。

定理. 若函數在定義域為

- 有限閉區間，或
- 有限閉區間的有限聯集

連續，則函數在定義域上有最大值及最小值。

定理. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 連續，且 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = L$，$\lim\limits_{x\to b-} f(x) = M$。

1. 若 $\exists\, u \in (a, b)$ 使 $f(u) > L$ 且 $f(u) > M$，則 f 在 (a, b) 有最大值。
2. 若 $\exists\, u \in (a, b)$ 使 $f(u) < L$ 且 $f(u) < M$，則 f 在 (a, b) 有最小值。

a 可為 $-\infty$，b 可為 ∞，L、M 可為 $\pm\infty$。

定理. 若 f 在 $c \in \operatorname{dom} f$ 有極值，且 $f'(c)$ 存在，則 $f'(c) = 0$。

證.

- 若 f 在 c 有極大值，則 $\exists\, h_0 > 0$ 使 $f(c) \geqslant f(x)$, $\forall\, x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$。
  - 取 $x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x < c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x\to c-} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0$
  - 取 $x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x > c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x\to c+} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0$

  故 $f'(c) = 0$。
- 若 f 在 c 有極小值，則 $\exists\, h_1 > 0$ 使 $f(c) \leqslant f(x)$, $\forall\, x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$。
  - 取 $x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x < c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x\to c-} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0$
  - 取 $x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x > c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x\to c+} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0$

  故 $f'(c) = 0$。

結論. 設 $f : I \to \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in I$ 有極值，則 x_0 為以下三情形之一：

- 臨界點 (critical point)：$f'(x_0) = 0$。
- 奇異點 (singular point)：f 在 x_0 不可微。
- I 的邊界點。

例. 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 在 $[-2, 2]$ 的最大值與最小值。

解.

- f 在有限閉區間 $[-2, 2]$ 連續，故在 $[-2, 2]$ 有最大值、最小值。
-
  - $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$，在 $[-2, 2]$ 之臨界點為 -1：$f(-1) = 7$。
  - f 在 $[-2, 2]$ 可微，故無奇異點。
  - $[-2, 2]$ 的邊界點為 -2 與 2；$f(-2) = 0$，$f(2) = -20$。

  故最大值：$f(-1) = 7$，最小值：$f(2) = -20$。

例. 證明 $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ 在 $(0, \infty)$ 有最小值，並求其值。

解.

- 由 $\lim\limits_{x\to 0+} f(x) = \infty$，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$，$f(1) = 5 < \infty$，$f$ 在 $(0, \infty)$ 有最小值。
-
  - $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{(x+2)(x-2)}{x^2}$，臨界點為 2：$f(2) = 4$。
  - f 在 $(0, \infty)$ 可微，無奇異點。
  - $(0, \infty)$ 無邊界點。

  故 f 在 $(0, \infty)$ 之最小值為 $f(2) = 4$。

例. 求點 $(2, 0)$ 到 $y^2 = x^2 + 1$ 之最短距離。

解.

- 最小化距離平方 $\equiv$ 最小化距離。
- 令 ℓ 為 $(2, 0)$ 至 $y^2 = x^2 + 1$ 之距離：$\ell^2 = (x-2)^2 + y^2 = (x-2)^2 + (x^2+1)$。
- 由 $\ell^2(\pm\infty) = \infty$，$\ell^2(0) = 5 < \infty$，$\ell^2$ 在 $(-\infty, \infty)$ 有最小值。
-
  - $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ell^2(x) = 2(x-2) + 2x = 4(x-1)$，臨界點為 1；$\ell^2(1) = (1-2)^2 + (1+1) = 3 \implies \ell(1) = \sqrt{3}$。
  - ℓ^2 在 $(-\infty, \infty)$ 可微，無奇異點。
  - $(-\infty, \infty)$ 無邊界點。

  故最短距離為 $\ell(1) = \sqrt{3}$。

例. Fermat 原理：光的行進走需時最短路徑。如下圖，試由 Fermat 原理推導 Snell 法則：$\dfrac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \dfrac{c_a}{c_w}$，其中 c_a，c_w 分別為光在空氣與在水中之速度。





解.

- 令光從點 P 至 Q 需時為 T，則 $T(x)=\dfrac{1}{c_a}\sqrt{(X_P-x)^2+Y_P^2}+\dfrac{1}{c_w}\sqrt{(X_Q-x)^2+Y_Q^2}$ $\left(\text{時間}\equiv\dfrac{\text{距離}}{\text{速度}}\right)$
- $T(\pm\infty)=\infty$，$T(0)=\dfrac{1}{c_a}\sqrt{X_P^2+Y_P^2}+\dfrac{1}{c_w}\sqrt{X_Q^2+Y_Q^2}<\infty$，故 T 在 $(-\infty,\infty)$ 有最小值。
- T 在 $(-\infty,\infty)$ 可微，無奇異點，$(-\infty,\infty)$ 無邊界點；T 在 $(-\infty,\infty)$ 之最小值出現於臨界點。
- 解 $T'(x^\star)=0$；在臨界點 $x^\star$ 時

$$0=\frac{1}{c_a}\frac{X_P-x^\star}{\sqrt{(X_P-x^\star)^2+Y_P^2}}+\frac{1}{c_w}\frac{X_Q-x^\star}{\sqrt{(X_Q-x^\star)^2+Y_Q^2}}=\frac{-\sin\theta_i}{c_a}+\frac{\sin\theta_r}{c_w}\implies\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r}=\frac{c_a}{c_w}$$

例. 如圖，一支桿子從 3m 寬走廊水平移動並無彎折通過 2m 寬垂直走廊，求最大桿長。



解.

- 如圖，令桿與 3m 寬走廊內沿夾角為 θ，則總桿長為 $\ell(\theta)=\ell_1(\theta)+\ell_2(\theta)=\dfrac{3}{\sin\theta}+\dfrac{2}{\cos\theta}$，$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$。
- $\ell(\theta)$ 最小值 $\equiv$ 最大桿長
- $\lim\limits_{\theta\to0+}\ell(\theta)=\infty$，$\lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}-}\ell(\theta)=\infty$，$\ell\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{5}{\sqrt{2}}<\infty$，故 $\ell(\theta)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 有最小值。
- $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 無邊界點，$\ell(\theta)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 可微，無奇異點。
- 求臨界點,亦即 $\ell'(\theta)=0$ 之根 $\theta^\star$:$\ell'(\theta)=-\dfrac{3\cos\theta}{\sin^2\theta}+\dfrac{2\sin\theta}{\cos^2\theta}=\dfrac{-3\cos^3\theta+2\sin^3\theta}{\sin^2\theta\cos^2\theta}=0\implies\tan\theta^\star=\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$。
  則最大桿長為 $\ell(\theta^\star)=\dfrac{3}{\sin\theta^\star}+\dfrac{2}{\cos\theta^\star}=\dfrac{3}{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}}}}+\dfrac{2}{\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}}}}=\left(2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$ $(\approx 7.02\text{m})$

3.4 作圖



- 切線斜率遞增
- $f''(x)>0$
- 凹向上
- 切線在圖形下方



- 切線斜率遞減
- $f''(x)<0$
- 凹向下
- 切線在圖形上方

定義 (反曲點（inflection point）). x_0 為 $y = f(x)$ 的反曲點，若

- $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 有切線。
- f 的凹向在 x_0 的左右兩邊恰相反。

性質. 令 $f : I \to \mathbb{R}$ 為可微。

- 若 f' 在 I 嚴格遞增（$f'' > 0$ 在 I），f 在 I 凹向上（上凹）。
- 若 f' 在 I 嚴格遞減（$f'' < 0$ 在 I），f 在 I 凹向下（下凹）。
- 若 $f''(x_0) = 0$，則 $x_0 \in I$ 為 f 的反曲點。



	嚴格遞減（−）	嚴格遞增（+）
凹向上（+）		
凹向下（−）		

性質 (漸近線（asymptote）).

- 若 $\lim_{x \to a-} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \to a+} f(x) = \pm\infty$，$f$ 在 a 有垂直漸近線。
- 若 $\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$ 或 $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$，$f$ 有水平漸近線 $y = L$。
- 若 $\lim_{x \to -\infty} (f(x) - (mx + n)) = 0$ 或 $\lim_{x \to \infty} (f(x) - (mx + n)) = 0$，$m \neq 0$，則 f 有斜漸近線 $y = mx + n$：斜漸近線 $y = mx + n$ 由極限 $m = \lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 與 $n = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - mx)$ 之存在性決定。

結論 (作圖步驟).

- 觀察定義域、對稱性、週期性。
- 決定漸近線。
- 解 $f'(x)=0$、$f''(x)=0$ 並決定 f'、f'' 之正負區間；製表。
- 依表判斷 f 之升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點；作圖。

例. 決定 $f(x)=x^4-2x^3+1$ 的升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

解.

- $f'(x)=4x^3-6x^2=4x^2\left(x-\dfrac{3}{2}\right)$；$f''(x)=12x^2-12x=12x(x-1)$。
- 製表：

	$-$		$-$		$-$		$+$	f'
$+$	0	$-$	1	$+$	$\frac{3}{2}$	$+$	f''

- 臨界點（$f'=0$）：$x=0$ 與 $x=\dfrac{3}{2}$
- 嚴格遞增區間（$f'>0$）：$\left(\dfrac{3}{2},\infty\right)$
- 嚴格遞減區間（$f'<0$）：$\left(-\infty,\dfrac{3}{2}\right)$
- 反曲點（$f''=0$ 且前後 f'' 異號處）：$x=0$ 與 $x=1$
- 作圖：



例. 決定 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+3}$ 之升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

解.

- $f'(x)=\dfrac{3-x^2}{(x^2+3)^2}=\dfrac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{(x^2+3)^2}$；$f''(x)=\dfrac{2x(x+3)(x-3)}{(x^2+3)^3}$。
- 製表：

	$-$		$-$		$+$		$+$		$-$		$-$	f'
$-$	-3	$+$	$-\sqrt{3}$	$+$	0	$-$	$\sqrt{3}$	$-$	3	$+$	f''

- 水平漸近線：$y=0$，因 $\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x}{x^2+3}=0$

- 嚴格遞增區間（$f' > 0$）：$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$
- 嚴格遞減區間（$f' < 0$）：$(-\infty, -\sqrt{3})$ 與 $(\sqrt{3}, \infty)$
- 臨界點（$f' = 0$）：$x = \pm\sqrt{3}$
- 反曲點（$f'' = 0$ 且前後 f'' 異號處）：$x = -3$ 與 $x = 0$ 與 $x = 3$
- 作圖：



例. 決定 $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

解.

- $f'(x) = \dfrac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2} = \dfrac{x^2(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{(x^2-1)^2}$；$f''(x) = \dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$
- 製表：

	$+$		$-$		$-$		$-$		$-$		$+$	f'
$-$		$-\sqrt{3}$		-1		0		1		$\sqrt{3}$		$+$	f''

- 奇異點：$x^2 - 1 = 0 \implies x = \pm 1$，故垂直漸近線：$x = \pm 1$
- 斜漸近線：$y = x$，因 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2-1} - x\right) = 0$
- 嚴格遞增區間（$f' > 0$）：$(-\infty, -\sqrt{3})$ 與 $(\sqrt{3}, \infty)$
- 嚴格遞減區間（$f' < 0$）：$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$
- 臨界點（$f' = 0$）：$x = 0$ 與 $x = \pm\sqrt{3}$
- 反曲點（$f'' = 0$ 且前後 f'' 異號處）：$x = 0$
- 作圖：