

# 安徽大学 2024—2025 学年第一学期《数学分析（上）》B 卷参考答案

一、（4 分）分别写出数列  $\{a_n\}$  以  $a$  为极限，不以  $a$  为极限的定义。

解：  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  :  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 使得当  $n > N$  时有  $|a_n - a| < \varepsilon$ ; (2 分)

$\{a_n\}$  不以  $a$  为极限:  $\exists \varepsilon_0 > 0$ , 使得对任意  $N$ , 有  $n_0 > N$  使得  $|a_{n_0} - a| \geq \varepsilon_0$ . ; (2 分)

二、计算下列极限（每小题 5 分，共 30 分）

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2\sqrt{n} + 3}{4n^2 - 5n - 11}$ .

解：原式  $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2\sqrt{n} + 3}{4n^2 - 5n - 11} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2/n^2 + 2\sqrt{n}/n^2 + 3/n^2}{4n^2/n^2 - 5n/n^2 - 11/n^2} = \frac{1}{4}$ .

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{2}{2n+1} + \frac{3}{3n+1} + \dots + \frac{n}{nn+1} \right)$

解：由于  $\frac{n}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} + \frac{2}{2n+1} + \frac{3}{3n+1} + \dots + \frac{n}{nn+1} \leq \frac{n}{n} = 1$ .

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ , 夹逼原理知原式等于 1.

3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n+1)^2}{n^3}$ .

解：利用 Stolz 定理，原式  $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^2}{n^3 - (n-1)^3} = \frac{4}{3}$

4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 1 + \sin \frac{1}{x} \right)^{x^3} e^{-x^2}$ .

解：原式  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^3 \ln(1 + \sin \frac{1}{x}) - x^2} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) - x^2} = e^{-\frac{1}{3}}$ .

5.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$ .

解：原式

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^{\frac{2 \cdot x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + 2 \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} \right)^{\frac{x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \sin \frac{2}{x} \right)^{\frac{x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \sin \frac{2}{x} \right)^{\frac{\frac{\sin^2 \frac{2}{x}}{2}}{\frac{\sin^2 \frac{2}{x}}{x}}} = e$$

6.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (\sqrt{1+x \sin x} + \sqrt{\cos x})}{1+x \sin x - \cos x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1+x \sin x - \cos x} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x + x \cos x + \sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3 \cos x - x \sin x} = \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

三、 计算与求解 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设  $f(x)$  具有二阶连续导数,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$ , 求  $f(0), f'(0), f''(0)$ .

解: 由条件得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right) = 3$ , 首先由

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right) &= 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \\ \text{且 } f'(0) &= 0. \quad (3 \text{ 分})\end{aligned}$$

由 Taylor 公式  $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)$ , 代入

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right) &= 3 \text{ 得} \\ 3 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1+x+\frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1+(1+\frac{1}{2}f''(0))x + o(x)\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\frac{1}{2}f''(0))x + o(x)}{x} = 1 + \frac{1}{2}f''(0), \text{ 故 } f''(0) = 4. \quad (8 \text{ 分})\end{aligned}$$

综合得:  $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) = 4$ .

2. 设函数  $y = y(x)$  由关系式  $e^y + xy = e$  确定, 求  $y'(0)$  和  $y''(0)$ .

解: 方程两边对  $x$  求导得  $e^y y' + y + xy' = 0$  (3 分)

在求导得  $e^y y'^2 + (e^y + x)y'' + 2y' = 0$  (5 分)

注意到  $y(0) = 1$ , 代入  $x = 0, y = 1$ , 得  $y'(0) = -\frac{1}{e}, y''(0) = \frac{1}{e^2}$  (8 分)

3. 求常数  $a, b$  使  $f(x) = \begin{cases} x^2 + b & x > 2 \\ ax + 1, & x \leq 2 \end{cases}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上可导, 并求  $f'(2)$ .

解: 由  $f(x)$  连续得  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = f(2) = 4 + b = 2a + 1$ ; (2 分)

由于

$$\begin{aligned}f'_+(2) &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4, \\ f'_-(2) &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{ax - 2a}{x - 2} = a,\end{aligned}$$

由可导性知  $f'_+(2) = f'_-(2) \Rightarrow a = 4$ . (6 分)

故  $a = 4, b = 5$ . 且此时  $f'(2) = 4$ . (8 分)

四、分析与证明题(共 42 分).

1. (6 分) 设数列  $\{a_n\}$  由  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} (n \geq 1)$  定义, 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$  存在并求此极限.

证明: 首先由  $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$  知  $\{a_n\}$  单调增. 若  $\{a_n\}$  有界, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  存在, 在等式  $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$

两边令  $n \rightarrow \infty$  得  $a = a + \frac{1}{a} \Rightarrow a$  无解, 矛盾. 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ . (3 分)

由 Stolz 定理有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{n+1 - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 2 + \frac{1}{a_n^2} \right) = 2,$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{2}$ . (6 分)

2. (8 分) 证明  $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$ , 其中  $a, b, c$  均为正数.

证明: 设  $f(x) = x \ln x$ , 则  $f'(x) = \ln x + 1$ ,  $f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ , (3 分)

由  $f(x)$  在  $x > 0$  严格下凸的, 由詹森不等式可得

$$f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \leq \frac{1}{3}(f(a) + f(b) + f(c)) \quad (5 \text{ 分})$$

即有  $\frac{a+b+c}{3} \ln \frac{a+b+c}{3} \leq \frac{1}{3} \ln a^a b^b c^c$ . 从而有

$$\frac{a+b+c}{3} \ln \frac{a+b+c}{3} \leq \frac{1}{3} \ln a^a b^b c^c.$$

再由对数函数是严格增的, 可得  $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$ . (8 分)

3. (8 分) 设  $f(x)$  在  $[0, \pi]$  上连续, 在  $(0, \pi)$  内可导. 证明: 存在  $\xi \in (0, \pi)$  使得  $f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi$ .

证明: 构造辅助函数  $F(x) = f(x) \sin x$ , 容易验证  $F(x)$  在  $[0, \pi]$  上满足 (3 分)

Rolle 中值定理条件, 从而存在  $\xi \in (0, \pi)$  使得  $(f(x) \sin x)' \Big|_{x=\xi} = 0$ , 即

$$f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0. \quad (8 \text{ 分})$$

4. (10 分) 设函数  $f(x)$  在区间  $I$  上有定义, 令  $\omega_f(\delta) = \sup_{\substack{x, y \in I \\ |x-y| < \delta}} |f(x) - f(y)|$ .

证明: (a)  $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta)$  存在,

(b)  $f(x)$  在区间  $I$  上一致连续 等价于  $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta) = 0$ .

证: (a). 由定义知  $\omega_f(\delta) \geq 0$ , 并且关于  $\delta$  单调递增, 即  $\delta$  随着  $\delta$  趋于 0 而单调减少, 因此  $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta)$  存在.

(b) 必要性: 假设  $f(x)$  在  $I$  上一致连续, 因此  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta_1 > 0$  当  $x', x'' \in I$ ,  $|x' - x''| < \delta_1$  时有

$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 从而

$$\omega_f(\delta_1) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta_1}} |f(x') - f(x'')| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ 故 } 0 < \delta < \delta_1 \text{ 时, } 0 \leq \omega_f(\delta) \leq \omega_f(\delta_1) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以  $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta) = 0$ . (5 分)

充分性: 由  $\lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta) = 0$  知  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$  使得  $0 \leq \omega_f(\delta_1) < \varepsilon$ , 故对于任意的  $x', x'' \in I$ , 当  $|x' - x''| < \delta_1$  时有

$$|f(x') - f(x'')| \leq \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta_1}} |f(x') - f(x'')| = \omega_f(\delta_1) < \varepsilon,$$

所以  $f(x)$  在  $I$  上一致连续. (10 分)

5. (10 分) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导, 且在  $[0, 1]$  上满足  $|f(x)| \leq A, |f''| \leq B$  证明:

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{1}{2}B, x \in [0, 1].$$

证明:  $\forall c \in [0, 1], f$  在该点的 Taylor 公式为

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{1}{2!} f''(\xi)(x - c)^2, x \in [0, 1] \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } \xi \in [0, 1]. \text{ 分别代入 } x = 0, 1 \text{ 代入有 } \begin{cases} f(0) = f(c) + f'(c)(0 - c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - c)^2 \\ f(1) = f(c) + f'(c)(1 - c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - c)^2 \end{cases},$$

$$\text{两式相减得: } f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2} [f''(\xi_2)(1 - c)^2 - f''(\xi_1)c^2]. \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{从而有 } |f'(c)| \leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2} [|f''(\xi_2)|(1 - c)^2 + |f''(\xi_1)|c^2] \leq 2A + \frac{B}{2} [(1 - c)^2 + c^2].$$

$$\text{由于 } (1 - x)^2 + x^2 \leq 1, x \in [0, 1] \text{ 故 } |f'(c)| \leq 2A + \frac{B}{2}. \quad (10 \text{ 分})$$