

安徽大学 2024—2025 学年第一学期《数学分析（下）》 参考答案

一、 填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. 设 $u = xyz$, 则 $du|_{(1,2,3)} = \underline{6dx + 3dy + 2dz}$.

2. 平面 $x - y + z = 2$ 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在点 $(1, 1, 2)$ 处切线的参数方程为

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 3t + 1, t \in \mathbb{R}. \\ z = 4t + 2 \end{cases} \quad (\text{表示方式不唯一})$$

3. $f(x, y) = \frac{1}{1 - x - y + xy}$ 在点 $(0, 0)$ 处的 3 阶 Taylor 多项式为
 $\underline{1 + (x + y) + (x^2 + xy + y^2) + (x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)}.$

4. 设 $f(u, v)$ 一阶连续可偏导, $f(tx, ty) = t^3 f(x, y)$ 且 $\frac{\partial f}{\partial u}|_{(1,2)} = 1, \frac{\partial f}{\partial v}|_{(1,2)} = 4$, 则 $f(1, 2) = \underline{3}$.

5. 设 $F(\alpha) = \int_{\alpha}^{1+\alpha} e^{\alpha x^2} dx$, 则 $F'(\alpha) = \underline{e^{\alpha(1+\alpha)^2} - e^{\alpha^3} + \int_{\alpha}^{1+\alpha} x^2 e^{\alpha x^2} dx}$.

二、 计算题（共 60 分）

6. (8 分) 设 $u(x, y, z)$ 是由方程 $e^{z+u} - xy - yz - zu = 0$ 确定的隐函数, 求 $u(x, y, z)$ 在 $P(1, 1, 0)$ 处的方向导数的最大值.

解: 由 $e^{z+u} - xy - yz - zu = 0$ 可得
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{e^{z+u} - z} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x + z}{e^{z+u} - z} \\ \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{u + y - e^{z+u}}{e^{z+u} - z} \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

在 $P(1, 1, 0)$ 处 $u(1, 1, 0) = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}|_P = 1, \frac{\partial u}{\partial y}|_P = 1, \frac{\partial u}{\partial z}|_P = 0. \quad (6 \text{ 分})$

$u(x, y, z)$ 在 $P(1, 1, 0)$ 处的方向导数的最大值为 $u(x, y, z)$ 在 P 处梯度的模长, 故所求为

$$\left| \left(\frac{\partial u}{\partial x}|_P, \frac{\partial u}{\partial y}|_P, \frac{\partial u}{\partial z}|_P \right) \right| = |(1, 1, 0)| = \sqrt{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

7. (8 分) 求 $u = x - 2y + 2z$ 在约束 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值.

解: 令 $F(x, y, z, \lambda) = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$. 由 Lagrange 乘子法得

$$\begin{cases} F'_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = -2 + 2\lambda y = 0 \\ F'_z = 2 + 2\lambda z = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

可能的极值点为 $(x, y, z) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 或 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$. (6 分)

由于连续函数在有界闭集上必能取到最小值与最大值(或由问题的几何意义知), 上述两点即为最值点. 故最大值为 $u\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = 3$, 最小值为 $u\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = -3$. (8 分)

8. (8 分) 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 围成的区域.

解: 作变换 $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v \end{cases}$, 则

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy = \iint_{D'} e^{\frac{v}{u}} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \quad (4 \text{ 分})$$

$$\int_0^1 du \int_{-u}^u e^{\frac{v}{u}} dv = \frac{1}{2} \int_0^1 u \left(e - \frac{1}{e} \right) du = \frac{1}{4} \left(e - \frac{1}{e} \right). \quad (8 \text{ 分})$$

9. (8 分) 计算三重积分 $\iiint_V |ax+by+cz| dx dy dz$, 其中 V 为单位球体 $x^2+y^2+z^2 \leq 1$; a, b, c 为常数, 满足 $a^2+b^2+c^2=4$.

解: 作正交变换 $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(ax+by+cz) \\ v = a_2x+b_2y+c_2z \\ w = a_3x+b_3y+c_3z \end{cases}$,

$$\iiint_V |ax+by+cz| dx dy dz = 2 \iiint_V |u| du dv dw \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 r \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \pi. \quad (8 \text{ 分})$$

10. (8 分) 求 $\iint_{\Sigma} |y| \sqrt{z} dS$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$.

解: $\iint_{\Sigma} |y| \sqrt{z} dS = \iint_D |y| \sqrt{x^2+y^2} \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy \quad (4 \text{ 分})$

$$= 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r \sin \theta \cdot r \cdot \sqrt{1+4r^2} \cdot r dr \quad (6 \text{ 分})$$

$$= 4 \int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} dr = 2 \int_0^1 t \sqrt{1+4t} dt = \frac{25\sqrt{5}+1}{30}. \quad (8 \text{ 分})$$

11. (10 分) 求平面向量场 $(xy^2 + y^2e^x + x^2 + y, x^2y + 2ye^x - x + y^2)$ 沿曲线

$L: r(t) = (\cos t, 2\sin t) (0 \leq t \leq \pi)$ 的第二型曲线积分, 曲线正向为沿 t 增加的方向.

解: 在 L 上补上线段 $C: r(t) = (t, 0), -1 \leq t \leq 1$, 方向指向 x 轴正向. 则由 Green 公式得

$$I = \oint_{L+C} (xy^2 + y^2e^x + x^2 + y) dx + (x^2y + 2ye^x - x + y^2) dy = \iint_D (-2) dx dy = -2\pi. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{且 } I_1 = \oint_C (xy^2 + y^2e^x + x^2 + y) dx + (x^2y + 2ye^x - x + y^2) dy = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}. \quad (8 \text{ 分})$$

故所求积分为 $I - I_1 = -2\pi - \frac{2}{3}$. (10 分)

12. (10 分) 求第二型曲面积分

$\iint_{S^+} (f(x, y, z) + 2x) dydz + (2f(x, y, z) + y) dzdx + (f(x, y, z) + 2z) dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, S^+ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分 ($x > 0, y < 0, z > 0$ 区域) 的上侧.

解: 所求积分 = $\iint_{S^+} (f(x, y, z) + 2x, 2f(x, y, z) + y, f(x, y, z) + 2z) \cdot \vec{n} dS$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{S^+} (f(x, y, z) + 2x - 2f(x, y, z) - y + f(x, y, z) + 2z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{S^+} (2x - y + 2z) dS \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_D (y + 2) \cdot \sqrt{3} dxdy = \iint_D (y + 2) dxdy \quad (7 \text{ 分})$$

$$= \int_{-1}^0 dy \int_0^{y+1} (y + 2) dx = \int_0^1 y(y + 1) dy = \frac{5}{6}. \quad (10 \text{ 分})$$

三、 分析证明题 (共 20 分)

13. (6 分) 设 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 且 F 可微, 证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$.

证明:

$$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0 \Rightarrow F_1' \cdot \left(1 + \frac{1}{y} z_x'\right) + F_2' \cdot \left(\frac{1}{x} z_x' - \frac{z}{x^2}\right) = 0 \Rightarrow z_x' = \frac{yzF_2' - x^2yF_1'}{x^2F_1' + xyF_2'} = \frac{\frac{yz}{x^2}F_2' - yF_1'}{F_1' + \frac{y}{x}F_2'}.$$

(2 分)

同理得

$$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0 \Rightarrow F_1' \cdot \left(\frac{1}{y} z_y' - \frac{z}{y^2}\right) + F_2' \cdot \left(1 + \frac{1}{x} z_y'\right) = 0 \Rightarrow z_y' = \frac{xzF_1' - xy^2F_2'}{y^2F_2' + xyF_1'} = \frac{\frac{xz}{y^2}F_1' - yF_2'}{F_1' + \frac{y}{x}F_2'}.$$

(4 分)

$$\text{故 } x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \frac{\frac{yz}{x^2}F_2' - yF_1'}{F_1' + \frac{y}{x}F_2'} + y \cdot \frac{\frac{xz}{y^2}F_1' - yF_2'}{\frac{y}{x}F_2' + F_1'} = \frac{(\frac{yz}{x} - y^2)F_2' - (xy - z)F_1'}{\frac{y}{x}F_2' + F_1'} = z - xy. \quad (6 \text{ 分})$$

14. (8 分) 设 $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的某邻域内连续, 证明: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$.

证明: “ \Rightarrow ”: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则可偏导, 即

$$f_x'(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x, 0)}{\Delta x} \text{ 存在, 其相应的左右极限分别为 } -\varphi(0, 0) \text{ 和 } \varphi(0, 0), \text{ 两者必须相等, 故有 } \varphi(0, 0) = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

“ \Leftarrow ”: 同上有 $f_x'(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x, 0)}{\Delta x} = 0$, 同理有 $f_y'(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{|\Delta y|\varphi(0, \Delta y)}{\Delta y} = 0$. 设

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \text{ 则 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f_x'(0, 0)\Delta x - f_y'(0, 0)\Delta y}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|\Delta x - \Delta y|\varphi(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

$$\left(\frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \leq \sqrt{2}, \lim_{\rho \rightarrow 0} \varphi(\Delta x, \Delta y) = \varphi(0, 0) = 0 \right). \text{ 即有:}$$

$f(\Delta x, \Delta y) = f(0, 0) + f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y + o(\rho), \rho \rightarrow 0$. 故 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微. (8 分)

15. (6 分) 证明: $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx$ 在 $(1, 4)$ 上连续.

证明: $g(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} dx = I_1 + I_2$. 其中 0 是 I_1 的瑕点, 由

$\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-3}} \quad (x \rightarrow 0+)$, 知当 $\alpha < 4$ 时 I_1 收敛; 而当且仅当 $\alpha > 1$ 时 I_2 收敛, 故 $g(\alpha)$ 的定义域为 $(1, 4)$. (3 分)

又对于任意 $[a, b] \subset (1, 4)$, $\left| \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} \right| = \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} \leq \frac{\ln(1+x^3)}{x^b} \quad (x \in (0, 1], \alpha \in [a, b])$ 且

$\int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{x^b} dx$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法知 I_1 在 $[a, b]$ 上一致收敛; 同理, I_2 在 $[a, b]$ 上也一致收敛. 故 $g(\alpha)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 由 $[a, b]$ 的任意性知 $g(\alpha)$ 在 $(1, 4)$ 上连续. (6 分)