

安徽大学 2019—2020 学年第二学期

《高等代数（下）》考试 A 卷参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $x=2$; 2. $y=-2$; 3. $B=2\lambda^2-3\lambda+4$; 4. 个数为 1; 5. C_1 。

二、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

- 6、答：（1）有 n 个线性无关的特征向量；（2）有 n 个不同的特征值；（3）有 n 个特征值，且每个特征值的代数重数等于几何重数；（4）有 n 个特征值，且 σ 的最小多项式是互不相同的一次因式的乘积；（5）空间 V 可以分解成特征子空间的直和。
- 7、答：（1） A 的正惯性指数为 n ；（2）合同于单位矩阵；（3） A 的所有顺序主子式全大于 0；（4） A 的所有主子式全大于 0；（5）存在可逆矩阵 P 使得 $A=PP^T$ 。
- 8、答：（1）保持长度不变，即 $\|\sigma(\alpha)\|=\|\alpha\|$ ；（2）保持内积不变，即 $(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=(\alpha,\beta)$ ；（3）将标准正交基变为标准正交基；（4）在任意标准正交基下的矩阵是正交矩阵。

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

- 9、解：用辗转相除法得 $u(x)=-\frac{1}{3}(x-1)$ 和 $v(x)=\frac{1}{3}(2x^2-2x-3)$ ，……………5 分
并求得 $(f(x),g(x))=x-1$ 。……………10 分
注：省略的部分视具体步骤给分。

- 10、解：（1）先求出行列式因子： $D_1(\lambda)=D_2(\lambda)=D_3(\lambda)=1, D_4(\lambda)=(\lambda-1)^4$ ，
接着求出不变因子： $d_1(\lambda)=d_2(\lambda)=d_3(\lambda)=1, d_4(\lambda)=(\lambda-1)^4$ 。……………5 分
（2）写出初等因子组： $(\lambda-1)^4$ 。……………7 分

- （3）写出 Jordan 标准形为 $J=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 或 $J=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ……………10 分

注：没有过程，只写出 Jordan 标准形的给 3 分。

11、解：先求矩阵的特征值与特征向量。

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & -4 & 2 \\ 0 & \lambda-3 & 1 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=1$ (二重), $\lambda_2=2$ 。……………3 分

对于特征值 $\lambda_1=1$, 求解齐次线性方程组 $(I-A)X=0$, 解出两个线性无关的特征向量 $\alpha_1=(1,0,0)^T, \alpha_2=(0,1,2)^T$ 。

对于特征值 $\lambda_2=2$, 求解齐次线性方程组 $(2I-A)X=0$, 解出 $\alpha_3=(2,1,1)^T$ 为属于特征值 $\lambda_2=2$ 的特征向量。……………6 分

$$\text{令矩阵 } P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$A^n = P \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^n \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4+2^{n+2} & 2-2^{n+1} \\ 0 & -1+2^{n+1} & 1-2^n \\ 0 & -2+2^{n+1} & 2-2^n \end{bmatrix}. \quad \text{……………10 分}$$

$$12、\text{解：(1) 该二次型的矩阵为 } A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 特征多项式为 } |\lambda I_3 - A| = \lambda(\lambda-3)^2,$$

故 A 的特征多项式为 $\lambda_1=3$ (二重), $\lambda_2=0$ 。……………3 分

属于特征值 $\lambda_1=3$ 的线性无关特征向量为 $\alpha_1=(1,1,0)^T, \alpha_2=(1,0,1)^T$; 属于特征值 $\lambda_2=0$ 的特征向量为 $\alpha_3=(-1,1,1)^T$ 。……………6 分

对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作 Schmidt 正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1,1,0)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \frac{1}{2}(1, -1, 2)^T,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 = (-1, 1, 1)^T. \quad \text{一个特征值对应一类标准正交基}$$

再单位化得

$$\xi_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \xi_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T, \xi_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T.$$

令 $Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$, 作正交线性替换 $X = QY$, 则原二次型可化为

$$3y_1^2 + 3y_2^2. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

四、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

13、证明：先写出 n 元二次型的矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \cdots & \frac{1}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

它的顺序主子式为

$$D_1 = 1 > 0, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4} > 0, \dots, D_k = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \cdots & \frac{1}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}_k = \frac{k+1}{2^k} > 0, \quad k = 3, 4, \dots, n.$$

故 A 是正定矩阵。 \dots\dots\dots 10 分

14、证明：先令 $x = y - 1$ ，代入 $f(x) = x^p + px + 1$ \dots\dots\dots 3 分

得到 $g(y) = f(y - 1) = y^p - C_p^1 y^{p-1} + C_p^2 y^{p-2} - \cdots - C_p^{p-2} y^2 + (C_p^{p-1} + p)y - p$ 。 \dots\dots\dots 6 分

由于 p 为素数，(1) p 不能整除 1；(2) $p \mid C_p^1, p \mid C_p^2, \dots, p \mid C_p^{p-2}, p \mid (C_p^{p-1} + p), p \mid p$ ；

(3) p^2 不能整除 p ，故 $g(y)$ 在有理数域上不可约。 \dots\dots\dots 8 分

从而 $f(x)$ 在有理数域上不可约。 \dots\dots\dots 10 分

五、开放性试题（10 分）

15、答：（1）欧式空间内积的定义是，欧式空间上的一个二元正定的双线性函数称为内积；或欧式空间上的一个二元实值线性函数，满足对称性，齐次性，可加性和非负性，则该函数称为欧式空间的内积。……………4 分

（2）引入内积的意义主要体现在三个方面：（i）使得欧式空间的向量具有长度，夹角，距离等度量概念，弥补了一般线性空间中向量的度量性质的缺失；（ii）使得欧式空间具有标准正交基，从而为研究欧式空间提供了很多方便；（iii）可以在欧式空间中研究一些特殊的变换，如正交变换和对称变换，从而极大地丰富了欧式空间的研究内容，同时也拓宽了与其他一些问题的研究，如二次型，实对称矩阵等之间的联系。……………10 分