

安徽大学 2021—2022 学年第二学期

《 高等代数（下） 》期中考试试卷 (闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号、型	一、填空题	二、简答题	三、计算题	四、证明题	总分
得 分					
阅卷人					

一、填空题（共 35 分）

1 (5 分)、已知多项式 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$, $g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$, 那么 $(f(x), g(x)) =$ _____。

2 (20 分)、已知复矩阵 A 的特征多项式为 $|\lambda I - A| = \lambda^4 - 2\lambda^3 + \lambda^2$, 请写出与 A 相似的所有可能的 Jordan 标准形（不计较排列次序），并把下面表格填写完整（若列不够，可增加）。

与 A 相似的所有可能的 Jordan 标准形				
对应的初等因子组					
对应的不变因子					
对应的行列式因子					
对应的 A 的极小多项式					

3 (5 分)、已知线性变换 σ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_2$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 则 σ 在 V 的基

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_3$ 下的矩阵为_____。

4(5分)、已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 设 $B = A^3 - 2A^* - 2I$, 则 $|B| - \text{tr}(B) =$ _____。

二、简答题 (每小题 5 分, 共 10 分)

5、举例并说明理由: 在有理数域 \mathbb{Q} 上存在任意高次的不可约多项式。

6、设 $\sigma: V \rightarrow V$ 为线性变换且两个不同的特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2$, $\iota: V \rightarrow V$ 是恒等变换。已知 $\dim V = 6$ 且 $V = W_{\lambda_1} \oplus W_{\lambda_2}$, 其中 $W_{\lambda_1} = \ker \sigma^2$ 的维数为 2, $W_{\lambda_2} = \ker(\sigma + 2\iota)^2$ 的维数为 4。试写出 σ 在一些基下所有可能的 Jordan 标准形 (不计较排列次序)。

三、计算题 (每小题 10 分, 共 20 分)

7、求 $f(x) = x^7 + 2x^6 - 6x^5 - 8x^4 + 17x^3 + 6x^2 - 20x + 8$ 在实数 \mathbf{R} 上的典型分解式。

8、已知 $\dim V = 3$, 线性变换 $\sigma: V \rightarrow V$ 作用在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_2$ 下的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。

(1) 求一个非奇异矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$;

(2) 求 V 的一个基, 使得 σ 在该基下的矩阵为 Jordan 标准形 J ;

四、证明题 (共 35 分)

9 (10分)、证明: 若 $(f, g) = 1$, 则存在一对多项式 u, v 满足 $\deg u < \deg g, \deg v < \deg f$, 使得 $uf + vg = 1$ 成立。

10 (10分)、设 n 阶矩阵 A 有 k 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, 且可以对角化。证明: 存在 k 个 n 阶矩阵 $A_i (i=1, 2, \dots, k)$ 满足 $\sum_{i=1}^k A_i = I_n$ 且 $A = \sum_{i=1}^k \lambda_i A_i$ 成立。

11 (15分)、证明: n 阶矩阵 A 可以对角化的充分必要条件是下面每一条等价:

(1) A 有 n 个线性无关的特征向量;

(2) $F^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$, 其中 $V_{\lambda_i} = \{X \mid AX = \lambda_i X\}$;

(3) A 的每一个特征值的几何重数等于代数重数。