

Identification de paramètres et optimisation

Cours de Master 2 STIM

2014-2015

Sébastien Adam

10 décembre 2015

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récurrents
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 **Introduction**
- 3 Méthodes des moindres carrés
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récursifs
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés**
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récurrents
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif

Moindres carrés

Inversion

L'estimée θ_{MC} est donc la valeur de θ solution de l'équation :

$$X^T Y_S = X^T X \theta_{MC}$$

Deux cas de figure :

- $X^T X$ est inversible. On a alors $\theta_{MC} = (X^T X)^{-1} X^T Y_S$
- $X^T X$ n'est pas inversible. θ_{MC} n'est pas unique.

Cas pratiques de non inversibilité :

- Moins d'observations N que de paramètres K : $\text{rang}(X^T X) \leq N < K$ ($\text{rang}(AB) \leq \text{rang}(A) \leq \min(\dim(A))$).
- Dépendance linéaire entre les colonnes de X : on ne peut pas résoudre le système

Dans le cas pondéré, on aura : $\theta_{MC} = (X^T W X)^{-1} X^T W Y_S$

Moindres carrés

Propriétés de l'estimateur

- Modèle : $Y_M = X\theta$
- Minimum du critère $J_{MC}(\theta)$ atteint pour $\theta_{MC} = (X^T X)^{-1} X^T Y_S$
- On a alors $(Y_M)_{MC} = X (X^T X)^{-1} X^T Y_S = QY_S$
- L'erreur d'estimation vaut : $Y_S - Y_{MMC} = (1 - Q)Y_S$
- Démontrons quelques propriétés de Q :
 - ▶ Q est symétrique
 - ▶ $Q^2 = Q$
 - ▶ $(Y_S - QY_S)^T QY_S = 0$: $Y_S - (Y_M)_{MC}$ est orthogonal à $(Y_M)_{MC}$
- Retour sur l'interprétation géométrique

Moindres carrés

Interprétation stochastique

- On suppose :
 - ▶ $Y_S = Y_M(\theta_S) + b = X\theta_S + b$ où θ_S représente la vraie valeur (inconnue) des paramètres du système.
 - ▶ b est un bruit blanc (Gaussien, de moyenne nulle et de variance σ^2) indépendant des x_i
- On appelle erreur d'estimation le vecteur $e_\theta = \theta_{MC} - \theta_S$
- On a $e_\theta = (X^T X)^{-1} X^T (Y_S - X\theta_S) = (X^T X)^{-1} X^T b$
- Donc : $E[e_\theta] = (X^T X)^{-1} X^T E[b] = 0$
- Et $\text{var}(e_\theta) = E[e_\theta e_\theta^T] = (X^T X)^{-1} X^T E[bb^T] X (X^T X)^{-1} = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$

Moindres carrés

Bilan moindre carrés

- Modèle linéaire par rapport aux paramètres : $Y_M(\theta) = X\theta$
- Critère erreur quadratique : $J_{MC}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i (y_{Si} - y_{mi})^2$
- Si $X^T X$ est inversible : $\theta_{MC} = (X^T X)^{-1} X^T Y_S$
- Remarque : en pratique $(X^T X)$ sera calculé par des méthodes QR
- Estimateur non biaisé le moins dispersé (Gauss-Markov) si la contrainte de linéarité est respectée.
- Modèle généralisable :
 - ▶ Si les θ apparaissent dans des expressions telles que $\cos(\theta_1)$, $\theta_1^2 \dots$: on change de paramètres.
 - ▶ Pour certains cas où Y_M n'est pas linéaire par rapport aux paramètres. Exemple : $Y_M = \theta_1^{\alpha_1} \theta_2^{\alpha_2} \rightarrow \ln(Y_M) = \alpha_1 \ln(\theta_1) + \alpha_2 \ln(\theta_2)$: on change de paramètres et de critère.
- Comment mettre à jour une estimation ?

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés**
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récurrents
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif

Moindres carrés récursifs (1)

Principes

- Objectif : calculer l'estimée $\theta_{MC,n}$ obtenue avec n observations à partir $\theta_{MC,n-1}$ obtenue avec $n-1$ observations
- On connaît $\theta_{MC,n-1}$, x_n et y_{s_n} . Que vaut $\theta_{MC,n}$?

Méthodologie

- On a par définition $\theta_{MC,n} = (X_n^T X_n)^{-1} X_n^T Y_{S_n}$
- On pose :
 - ▶ $P_n = (X_n^T X_n)^{-1}$
 - ▶ $Q_n = X_n^T Y_{S_n}$
 - ▶ D'où $\theta_{MC,n} = P_n Q_n$
- Objectif pour mettre à jour une estimation : exprimer P_n et Q_n en fonction de P_{n-1} , Q_{n-1} , x_n et y_{s_n}

Moindres carrés récursifs (2)

Vision par bloc des matrices

$$X_n = \begin{pmatrix} \vdots \\ X_{n-1} \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} \quad X_n^T = (...X_{n-1}..., x_n) \quad Y_{S_n} = \begin{pmatrix} \vdots \\ Y_{n-1} \\ \vdots \\ y_{S_n} \end{pmatrix}$$

Conséquences

- $Q_n = X_n^T Y_{S_n} =$

Moindres carrés récursifs (2)

Vision par bloc des matrices

$$X_n = \begin{pmatrix} \vdots \\ X_{n-1} \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} \quad X_n^T = (...X_{n-1}..., x_n) \quad Y_{S_n} = \begin{pmatrix} \vdots \\ Y_{n-1} \\ \vdots \\ y_{S_n} \end{pmatrix}$$

Conséquences

- $Q_n = X_n^T Y_{S_n} = X_{n-1}^T Y_{S_{n-1}} + x_n y_{S_n} = Q_{n-1} + x_n y_{S_n}$

Moindres carrés récursifs (2)

Vision par bloc des matrices

$$X_n = \begin{pmatrix} \vdots \\ X_{n-1} \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} \quad X_n^T = (...X_{n-1}..., x_n) \quad Y_{S_n} = \begin{pmatrix} \vdots \\ Y_{n-1} \\ \vdots \\ y_{S_n} \end{pmatrix}$$

Conséquences

- $Q_n = X_n^T Y_{S_n} = X_{n-1}^T Y_{S_{n-1}} + x_n y_{S_n} = Q_{n-1} + x_n y_{S_n}$
- $P_n^{-1} =$

Moindres carrés récursifs (2)

Vision par bloc des matrices

$$X_n = \begin{pmatrix} \vdots \\ X_{n-1} \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} \quad X_n^T = (...X_{n-1}..., x_n) \quad Y_{S_n} = \begin{pmatrix} \vdots \\ Y_{n-1} \\ \vdots \\ y_{S_n} \end{pmatrix}$$

Conséquences

- $Q_n = X_n^T Y_{S_n} = X_{n-1}^T Y_{S_{n-1}} + x_n y_{S_n} = Q_{n-1} + x_n y_{S_n}$
- $P_n^{-1} = X_n^T X_n = X_{n-1}^T X_{n-1} + x_n x_n^T = P_{n-1}^{-1} + x_n x_n^T \rightarrow P_n?$

Problème

- Comment calculer P_n avec : $P_n^{-1} = P_{n-1}^{-1} + x_n x_n^T$

Moindres carrés récursifs (3)

Problème : inversion difficile

- $P_n = (P_n^{-1})^{-1}$ avec : $P_n^{-1} = P_{n-1}^{-1} + x_n x_n^T$

Moindres carrés récursifs (3)

Problème : inversion difficile

- $P_n = (P_n^{-1})^{-1}$ avec : $P_n^{-1} = P_{n-1}^{-1} + x_n x_n^T$

Solution : Lemme de Sherman-Morrison-Woodburg

$$(A + BCD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B [C^{-1} + DA^{-1}B]^{-1} DA^{-1}$$

Conséquences du lemme

$$P_n = P_{n-1} - k_n * x_n^T P_{n-1}$$

Avec

$$k_n = P_{n-1} x_n (1 + x_n^T P_{n-1} x_n)^{-1}$$

Moindres carrés récursifs (4)

Conséquences du lemme (2)

- On a obtenu :

- ▶ $P_n = P_{n-1} - k_n * x_n^T P_{n-1}$
- ▶ $k_n = P_{n-1} x_n (1 + x_n^T P_{n-1} x_n)^{-1} (**)$
- ▶ $Q_n = Q_{n-1} + x_n y_{S_n}$

- On cherche $\theta_n = P_n Q_n$

$$\theta_n = P_{n-1} Q_n - k_n * x_n^T P_{n-1} Q_n$$

- Après quelques simplifications : on obtient :

$$\theta_n = \theta_{n-1} + k_n (y_{S_n} - x_n^T \theta_{n-1})$$

Moindres carrés récursifs (5)

Bilan : 3 équations

$$\theta_n = \theta_{n-1} + k_n(Y_{S_n} - x_n^T \theta_{n-1})$$


$$k_n = P_{n-1} x_n \left(1 + x_n^T P_{n-1} x_n\right)^{-1}$$

$$P_n = P_{n-1} - k_n * x_n^T P_{n-1}$$

Remarques

- L'estimée θ_n est une correction de θ_{n-1} de k_n fois la différence entre l'observation Y_{S_n} et la prédiction Y_{M_n} faite avec θ_{n-1} .

Ordre des calculs



Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récursifs
- 4 Méthodes de descente locale**
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récurrents
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récursifs
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales**
- 7 Optimisation multi-objectif

Plan du Cours

- 1 Présentation de l'enseign(ant)ement
- 2 Introduction
- 3 Méthodes des moindres carrés
 - Ecriture matricielle
 - Moindres carrés récursifs
- 4 Méthodes de descente locale
- 5 Réseaux de neurones
- 6 Méthodes itératives globales
- 7 Optimisation multi-objectif