

PATIENTENINFORMATION

Sichere Arzneimitteltherapie

KÖNNEN IHRE MEDIKAMENTE DAS
RISIKO FÜR GASTROINTESTINALE
BLUTUNGEN ERHÖHEN?



TARGET-ADE



Was ist eine Magen-Darm-Blutung?

Eine Magen-Darm-Blutung entsteht im Verdauungstrakt. Sie ist kein eigenes Krankheitsbild, sondern ein Zeichen oder eine Folge einer Erkrankung. Sie kann auch durch Medikamente verursacht werden.

Welche Arten gibt es und welche Symptome können auftreten?

1 Chronische Magen-Darm-Blutung

Bei einer chronischen Blutung kommt es über einen längeren Zeitraum zu einem geringen, oft unbemerkten Blutverlust (versteckte Blutung).

Mögliche Anzeichen:

- Geringe Blutbeimengungen im Stuhl (schwarz-teerig oder rot)
- Beschwerden treten oft wechselnd auf

2 Akute Magen-Darm-Blutung

Eine akute Blutung kommt plötzlich und kann stark sein.

Mögliche Anzeichen:

- Schwarzer, teerartiger Stuhl
- Dunkles oder rotes Blut im Stuhl
- Rotes Blut beim Erbrechen
- Erbrochenes wie Kaffeesatz

3 Weitere Symptome

In *Kombination* können auch weitere Symptome auftreten, wie:

- Bauchkrämpfe oder –schmerzen
- Schwindel
- Benommenheit oder Ohnmacht
- Müdigkeit
- Kurzatmigkeit



Wenn Sie Symptome bemerken, die auf eine Magen-Darm-Blutung hinweisen, sollten Sie möglichst bald **ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen**.

Sichere Arzneimitteltherapie



TARGET-ADE

Ursachen

- 1** Eine Ursache kann die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medikamente sein (Multimedikation).
- 2** **Besonders wichtig:** Schmerz- und Entzündungsmedikamente wie Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen oder Etoricoxib (NSAR) können die Schleimhaut im Magen und Darm reizen und das Risiko für eine Magen-Darm-Blutung erhöhen – vor allem bei höherer Dosierung und längerer Einnahme.
- 3** Blutverdünner und andere Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen (z. B. Apixaban, Rivaroxaban, Warfarin, Aspirin oder Clopidogrel), können das Risiko für Magen-Darm-Blutungen erhöhen und dazu führen, dass eine Blutungen stärker ausfallen oder länger andauern.
- 4** Auch Kortison (z. B. Prednisolon) und bestimmte Antidepressiva, insbesondere SSRI (z. B. Citalopram, Sertralin, Escitalopram), können das Risiko erhöhen.
- 5** Wenn mehrere dieser Medikamente gleichzeitig eingenommen werden, steigt das Risiko weiter - besonders, wenn kein Magenschutz eingenommen wird.



Weitere Medikamente, die Ihr Risiko für eine Magen-Darm-Blutung erhöhen:




Sichere Arzneimitteltherapie

WANN SOLLTEN SIE ÜBER EINEN MAGENSCHUTZ SPRECHEN?

Wenn Sie Schmerzmittel und Blutverdünner einnehmen

Sprechen Sie bei Ihrem nächsten Besuch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über Ihre Medikamente. Das gilt besonders, wenn Sie:

- **älter als 65 Jahre** sind
- **zusätzlich NSAR** (z. B. **Ibuprofen, Diclofenac**), **Blutverdünner, Aspirin, Kortison** oder **Antidepressiva** einnehmen
- schon einmal eine **Magen- oder Darmblutung** hatten
- **keinen Magenschutz** (z. B. **Pantoprazol, Omeprazol**) einnehmen



**Bringen Sie alle Ihre Medikamente zum
Besuch bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt mit**
– auch die ohne Rezept.