

Nehmen Sie regelmäßig Schmerzmittel ein?

Möchten Sie Ihre Medikamente noch sicherer machen?

UNIVERSITÄT BIELEFELD
Medizinische Fakultät OWL

Liebe Patientin, lieber Patient:

Einige Medikamente können das Risiko für Magen- oder Darmblutungen erhöhen. Haben Sie in den **letzten 3 Monaten** oder aktuell eines oder mehrere der folgenden Medikamente über längere Zeit eingenommen?

- **Ibuprofen** (z. B. Ibuflam, Dolormin)
- **Diclofenac** (z. B. Voltaren, Diclac)
- **Naproxen** (z. B. Dolormin für Frauen)
- **Etoricoxib** (z. B. Arcoxia)
- **Celecoxib** (z. B. Celebrex)
- **Acetylsalicylsäure** (z. B. Aspirin)

Es ist egal, ob Sie die Medikamente von uns verschrieben bekommen oder selbst rezeptfrei in der Apotheke gekauft haben.

Warum ist das wichtig?

Wir möchten die Sicherheit bei der Einnahme dieser Medikamente im Alltag genau im Blick behalten und optimieren.

Was müssen Sie tun?

Wenn Sie eines dieser Medikamente regelmäßig oder über längere Zeit nehmen oder genommen haben, **sprechen Sie bitte heute unser Praxispersonal an der Anmeldung oder im Sprechzimmer darauf an.**

Für eine aktuelle Studie in unserer Praxis suchen wir Patientinnen und Patienten, die bestimmte Schmerzmittel einnehmen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!