

Rappels : Analyse Univariée et Bivariée

Paul Chapron ¹ & Yann Ménéroux ¹

2021-2022

¹IGN-ENSG-UGE

ENSG
Géomatique

ÉCOLE NATIONALE
DES SCIENCES
GÉOGRAPHIQUES

Introduction

Notions pour manipuler les **variables aléatoires**, et estimer certains descripteurs

- co-variance
- intervalle de confiance
- bootstrap
- ...

L'analyse **univariée** permet de **décrire la forme** et de **quantifier** les caractéristiques de la **répartition des valeurs** d'une variable.



- Notion de distribution
- Visualisation (Histogramme, densité, boxplots, ...)
- Moments, Quantiles, CV

Analyse Univariée

Histogramme d'une variable

Représentation graphique des **effectifs** associés à des **classes de valeurs** d'une variable numérique


Le nombre de classes peut varier !



Synonymes: distribution empirique, distribution des fréquences, distribution statistique

Tableau ou graphique qui associe les (classes de) valeurs à leur fréquence d'apparition

≈ « Histogramme des fréquences en continu »




La distribution peut être définie comme une **fonction** qui donne la probabilité qu'un individu x pris au hasard ait la valeur V_x pour la variable V :

$$distribution(V) \equiv P(V = V_x), \forall V_x \in \Omega_V$$

Avec Ω_V l'ensemble des valeurs que peut prendre V : l'univers de V

Lorsque la variable prend des valeurs réelles, on parle de **densité de probabilité**, c'est pourquoi on retrouve ce terme "density" sur les axes des ordonnées dans les graphiques de distribution.



N.B. En toute rigueur, représenter une courbe de distribution de probabilité par dessus un histogramme est impropre : il faudrait deux graphiques distincts, ou au moins deux axes des ordonnées: un pour l'histogramme, représentant un effectif, l'autre pour la distribution , représentant une probabilité


Parfois , les distributions empiriques ressemblent à celles de lois de probabilités connues.

→ on peut alors **modéliser** la variable par une variable aléatoire de loi fixée

→ les paramètres de cette loi doivent être déterminés (ajustement).

La forme d'une distribution donne beaucoup d'informations :

- "pics" : valeurs les plus représentées dans la population
- présence de **valeurs extrêmes** : la courbe de la distribution est tirée à gauche ou à droite du graphique
- **symétrie** : les individus se répartissent équitablement de part et d'autre du pic
- **aplatissement** : la population est plus ou moins resserrée, ou autour de certaines valeurs
- ...



Décrire une distribution : mesures
de **tendance centrale**

La tendance centrale est **une** valeur qui **résume** une série de valeurs (quantitative)

- Moyenne
- Médiane
- Mode

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n x_i$$

Avantage : chaque valeur compte

Inconvénients :

- sensibilité aux valeurs extrêmes
- pas de signification sur les valeurs discrètes (e.g. 2.5 enfants par foyer)

Pour y remédier (parfois):

→ exclure les outliers

→ utiliser un autre estimateur (médiane)

→ étudier la distribution des valeurs (e.g. cas bimodal) et opérer une classification

$$\bar{x}_{geom} = \sqrt[n]{\prod_{i=0}^n x_i}$$

Moins sensible que la moyenne classique aux valeurs extrêmes.

Le **mode** d'une variable est la valeur la plus **fréquente** (d'effectif maximum) d'une variable.

Avantages :

- peu sensible aux valeurs extrêmes
- interprétation simple : cas le plus fréquent

Inconvénient : la valeur du mode ne dépend pas de toutes les observations, la modification d'une valeur n'entraîne pas la modification du mode (ce qui explique sa robustesse aux valeurs extrêmes)

Si la variable est quantitative et continue :


- découper l'étendue de la variable ($max - min$) en intervalle égaux
- compter les effectifs de chaque intervalle
- le mode est la moyenne des valeurs des bornes de l'intervalle de plus grand effectif.

(C'est exactement ce que fait un histogramme graphiquement !)

Par définition, le mode est unique, mais on peut appeler modes les valeurs des autres pics d'une distribution.

On parle de distribution **bi-modale** ou **tri-modale** lorsqu'une distribution présente deux ou trois pics.

Les **valeurs modales** d'une distribution sont les valeurs correspondant à ces pics.



La **médiane** est la valeur qui sépare une population en **deux** classes d'égal effectif.

C'est la valeur la plus proche de toutes les autres.

Avantages :

- Souvent plus pertinente que la moyenne
- les valeurs extrêmes ne modifient pas sa valeur
- interprétation facile: un individu sur deux a une valeur inférieure (respectivement supérieure) à la médiane.

Inconvénient : Comme le mode , la médiane ne dépend pas de toutes les observations

N.B. la robustesse de la médiane est bien utile dans le cas de distribution particulièrement asymétriques, où la moyenne est dégradée par les valeurs extrêmes, à droite (valeurs très élevées) ou à gauche (valeurs très faibles).

Que peut on dire d'une population dont la médiane est inférieure à la moyenne ?

Exemple : revenus mensuels en équivalent temps plein en France en 2016.

Revenu mensuel net moyen 2 238 €

Revenu mensuel net médian 1 789 €

source <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277680?sommaire=4318291>

Un salaire mensuel net équivalent temps plein de 2000€ est-il un bon salaire ?

- $2000\text{€} < \text{moyenne}$: on peut le considérer comme trop bas pour être «bon»
- $2000\text{€} > \text{médiane}$: supérieur à (au moins) la moitié des salaires du pays, on peut le considérer comme un «bon» salaire.

Double interprétation & «instinctivement» on imagine une dispersion symétrique, où la moyenne est proche de la médiane

Décrire une distribution : mesures de **dispersion**

La **dispersion** décrit la tendance des valeurs d'une variable à se disperser plus ou moins largement autour des valeurs des tendances centrales.

La **variance** est la somme des écarts carrés à la moyenne rapporté à l'effectif

$$var_X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Avec :

- X une variable
- x_i les valeurs de la variables
- \bar{x} la moyenne de X
- n l'effectif

L'**écart type** est la racine carrée de la variance

$$\sigma_X = \sqrt{\text{var}_X}$$

Variance et écart-type sont sensibles aux valeurs extrêmes et toujours positifs.

Si $\text{var}_X = 0$ ou $\sigma_X = 0$, alors X est **constante**.

Un écart-type faible indique que les valeurs sont réparties de façon **homogène** autour de la moyenne.

La **médiane** sépare une population en **deux** classes d'égale effectif
Les **quantiles** séparent une population en **n** classes d'égale effectif.

Les **quartiles** d'une population selon une variable X sont trois valeurs, Q_1 , Q_2 , Q_3 qui séparent la population en **quatre** classes d'égale effectif.

- 25% des valeurs de X sont strictement inférieures à Q_1
- 50% des valeurs de X sont strictement inférieures à Q_2 (médiane)
- 75% des valeurs de X sont strictement inférieures à Q_3

Les déciles sont les 9 quantiles Q_1, Q_2, \dots, Q_9 qui séparent une population 10 classes d'égale effectif.

Écart inter-quartile: $Q_3 - Q_1$, capture 50% des valeurs de la population les plus proches de la médiane

Écart inter-décile: $Q_9 - Q_1$, capture 80% des valeurs de la population les plus proches de la médiane

Avantages

Peu sensibles aux distributions aplaties et aux valeurs extrêmes


L'écart inter-quantile est plus robuste que l'écart-type

Inconvénients

Parfois délicat pour les variables quantitatives discrètes

Les écarts inter-quantiles négligent l'influence des valeurs extrêmes sur la distribution

Représentation courante de la dispersion d'une variable à l'aide de **quartiles**



- La **marque centrale** de la boîte est la **médiane**
- Les **bords** de la boîte sont les **quartiles Q_1 et Q_3**
- Les moustaches vont jusqu'à la plus grande (resp. la plus petite) valeur inférieure (resp. supérieure) à **1.5 fois l'écart interquartile**
- Les valeurs qui dépassent les moustaches sont affichées sous formes de points

Le **coefficient** de variation (CV) est une autre mesure de dispersion.

C'est le ratio entre l'écart-type σ_x et la moyenne \bar{x} d'une variable quantitative X .

$$CV(X) = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$$

Plus il est important , plus la dispersion est grande.

Plus il est proche de 0, plus les données sont homogènes.

Inconvénients similaires à ceux de \bar{x} et σ_x : sensibilité aux valeurs extrêmes.

Exemple : deux communes versent des aides aux entreprises locales, qu'on suppose distribuées suivant une loi normale.

Commune A : moyenne = 390 euros, $\sigma = 30$ euros

Commune B : moyenne = 152 euros, $\sigma = 8$ euros

Pour quelle commune les aides sont les plus homogènes?

Décrire une distribution :
asymétrie et **aplatissement**

