# LATVIJAS UNIVERSITĀTE FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE FIZIKAS NODAĻA

# SAULES PANEĻU EFEKTIVITĀTE LATVIJAS KLIMATĀ

#### **BAKALAURA DARBS**

Autors: Viktorija Leimane

Studenta apliecības Nr.: vl16047

Darba vadītājs: Dr. Phys. Andris Jakovičs

**ANOTĀCIJA** 

Darba mērķis ir noteikt efektīvāko saules paneļu izvietojuma veidu Latvijai tipiskos me-

teoroloģiskajos apstākļos. Balstoties uz divu veidu saules paneļiem, kas novietoti piecās dažādās

telpiskajās orientācijās Latvijas Universitātes Botāniskā dārza teritorijā, tiks noteikta solāro pa-

neļu efektivitātes atkarība no mainīgiem parametriem: 1) meteoroloģiskie apstākļi 2) telpiskā

orientācija 3) gada mēnesis 4) solāro paneļu tips.

Iegūtie monitoringa rezultāti tiks analizēti kontekstā ar šo paneļu efektivitātes fizikālo novērtēju-

mu.

Atslēgas vārdi: Saules enerģijas paneļi, atjaunojamo energoresursu enerģija, vides monitorings

1

**ABSTRACT** 

The aim of this thesis is to determine the most efficient way of solar panel arrangement for

typical weather conditions in Latvia. Based on two types of solar panels placed in five different

spatial orientations in the University of Latvia Botanical Garden area, the dependency of the ef-

ficiency of solar panels on following variable parameters will be established: 1) meteorological

conditions 2) spatial orientation 3) month of year 4) type of solar panels.

The results of monitoring will be analyzed in the context of a physics based assessment of the

effectiveness of these panels.

**Keywords:** Solar panels, renewable energy, environmental monitoring

2

# **SATURS**

| AF         | ZĪMĪ                                  | EJUMU SARAKSTS      | 4  |  |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------|----|--|--|
| ΙE         | VADS                                  |                     | 5  |  |  |
| 1          | LITERATŪRAS APSKATS                   |                     |    |  |  |
|            | 1.1                                   | Definīcijas         | 6  |  |  |
|            | 1.2                                   | Saules apstarojums  | 6  |  |  |
|            | 1.3                                   | Klimats Latvijā     | 10 |  |  |
|            | 1.4                                   | Saules paneļi       | 1( |  |  |
| 2          |                                       | ULTĀTI UN DISKUSIJA |    |  |  |
| SECINĀJUMI |                                       |                     |    |  |  |
| PA         | PATEICĪBAS                            |                     |    |  |  |
| 17         | ΙΖΜΑΝΤΟΤΆ DARRA I ITERATŪRA IIN AVOTI |                     |    |  |  |

### APZĪMĒJUMU SARAKSTS

TSI - Kopējais saules apstarojums, Wm<sup>-2</sup>

SSI - Saules spektrālais apstarojums, Wm<sup>-2</sup>nm<sup>-1</sup>

 $G_{sc}$  - Solārā konstante,  $\mathrm{Wm}^{-2}$ 

PV - Saules fotoelements

PVOUT - Saules fotoelementa potenciālā jauda, kWh/kWp

GHI – Globālais horizontālais apstarojums, kWh/m<sup>2</sup>

DIF – Difūzais horizontālais apstarojums kWh/m<sup>2</sup>

GTI – Globālais apstarojums virsmai optimālā slīpumā, kWh/m²

OPTA – Optimālais slīpums enerģijas ieguves maksimizēšanai gada griezumā, °

DNI – Direct normal irradiation, kWh/m<sup>2</sup>

#### radiometri

ACRIM - Aktīvā Dobuma Radiometrs Apstarojuma Monitoringam (Active Cavity Radiometer for Irradiance Monitoring) ACRIMSAT - Aktīvā Dobuma Radiometera Apstarojuma Monitoringa Satelīts (Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite) VIRGO - Saules apstarojuma variabilitāte un gravitācijas oscilācijas (Variability of solar Irradiance and Gravity Oscillations) organizācijas NOAA - Okeanoloģijas un atmosfēras valsts pārvalde (National Oceanic and Atmospheric Administration) NASA - Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (National Aeronautics and Space Administration)

## **IEVADS**

Vispirms tiek aplūkota Saules emitētā starojuma daba un ģeometriskie apsvērumi - virziens, no kura staru kūlis sasniedz virsmu, leņķis uz virsmas un laika gaitā saņemtais starojuma daudzums. Tiek apskatīta atmosfēras ietekme uz virsmas saņemto saules starojumu, un tās praktiskā nozīme, apstrādājot pieejamos Saules starojuma datus, lai aprakstītu radiācijas gadījumus uz virsmas dažādās orientācijās.

#### 1. LITERATŪRAS APSKATS

#### 1.1. Definīcijas

**Saules plankums** - magnētiskās plūsmas koncentrācija bipolāros klāsteros vai grupās, kas novērojama kā tumšs plankums uz Saules fotosfēras.

**Saules plankumu cikls** - aptuveni 11 gadus ilga kvaziperiodiska variācija saules plankuma skaitlī. Magnētiskā lauka polaritātes modelis mainās ar katru ciklu.

Saules plankuma skaitlis - Dienas saules plankuma aktivitātes indekss (R), definēts kā  $R = k(10 \cdot g + s)$ , kur s - individuālo plankumu skaits; g - saules plankumu grupu skaits; k - observatorijas faktors.

**SSI** - saules spektrālais starojums vai spektra enerģijas blīvums - saules jaudas izkliede uz virsmas laukuma vienību.

**TSI** - Saules starojuma absolūtās intensitātes mērījums integrēts visā saules enerģijas diskā un visā saules enerģijas spektrā.

Beam Radiation - the solar radiation received from the sun without having been scattered by the atmosphere (also known as direct solar radiation) Diffuse Radiation - the solar radiation received from the sun after its direction has been changed by scattering by the atmosphere


Irradiance - the rate at which radiant energy is incident on a surface per unit area of surface, W/m2

ātrums kurā starojuma enerģija ir

#### 1.2. Saules apstarojums

Lielākā daļa Saules emitētās enerģijas tiek saražota kodolreakcijās fotosfērā. Kopējais saules apstarojums (TSI) ir saņemtā enerģija laika vienībā uz laukuma vienības perpendikulāri starojuma izplatīšanās virzienam 1 AU attālumā integrēta pa visiem viļņu garumiem.[1] Kopējā saules apstarojuma vērtība mainās laikā, korelē ar Saules plankumu ciklu 1.1 un norāda uz solārās radiācijas izmaiņām, kas ietekmē solārās enerģijas apjomu uz Zemes atmosfēras augšējiem slāņiem. Papildus ir noderīgi zināt saņemtā starojuma spektrālo sadalījumu — 1.2 redzams, ka aptuveni puse starojuma tiek saņemta 380 — 780 nm diapazonā, kas padara iespējumu no tā iegūt enerģiju ar saules paneļu paņēmienu.

TSI novērojumi no kosmosa tiek veikti kopš 1978. gada un instrumentu specifikas dēļ iegūtas dažādas absolūtās vērtības 1.1, tāpēc šī fizikālā lieluma tikai daļēji pārkājušos novērojumu laikrindu apvienošana kompozītā ir gan zinātnisks, gan statistisks izaicinājums un neviens kompozīts (piemēram, PMOD, ACRIM, IRBM) līdz šim nav guvis konsensu solārā apstarojuma pētnieku kopienā. 1.1




1.1. att. Salīdzinājums dienā vidējotiem saules kopējā apstarojuma datiem no dažādām misijām un Saules plankuma skaitlis, lai ilustrētu solārās aktivitātes variabilitāti trīs ciklos. [2]

Par labāko saules apstarojuma mērījumu reprezentāciju tiek uzskatīti TIM instrumenta dati mēraparāta uzbūves (atšķirībā no citiem radiometriem TIM precizitātes apertūra atrodas tuvu dobumam un redzeslauku bloķējošā apertūra ir pie instrumenta ieejas) un augstās precizitātes – nenoteiktība tiek novērtēta esam mazāk nekā  $0.014 \mathrm{Wm}^{-2} \mathrm{yr}^{-1}$  un precizitāte ar  $0.48 \mathrm{Wm}^{-2}$  [3] – dēļ, tāpēc šajā darbā grafiki balstās uz šiem mērījumiem, pēc kuriem absolūtā kopējā saules apstarojuma vērtība ir  $1360.8 \pm 0.5 \mathrm{Wm}^{-2}$ .[2]


1.1. tabula

# TSI mērījumu vēsture


| radiometrs     | misija  | darbības laiks |
|----------------|---|----------------|
| Hickey-Frieden | NIMBUS-7  | 1978–1992      |
| ACRIM I        | Solārā Maksimuma Misija (SMM)                     | 1980–1989      |
| ACRIM          | Zemes Radiācijas Budžeta Satelīts (ERBS)          | 1984–2003      |
| ACRIM II       | Augšējās Atmosfēras Izpētes Satelīts (UARS)       | 1991–2001      |
| VIRGO          | Solārā un Heliosfēras observatorija (SOHO)        | 1996–pašlaik   |
| ACRIM III      | ACRIMSAT  | 2000–pašlaik   |
| TIM            | Saules Radiācijas un Klimata Eksperiments (SORCE) | 2003–pašlaik   |



1.2. att. SSI 1AU attālumā (24 h vidējā vērtība) [4]



1.3. att. TSI 24. saules ciklā 1AU attālumā (24 h vidējā vērtība)[3]




1.4. att. TSI izmaiņas solāro paneļu datu ieguves laikā 1AU attālumā (24 h vidējā vērtība)[3]

# 1.3. Klimats Latvijā

Enter antagonists. Mākoņi. Bloķē daudz saules apstarojuma. Cik LV mākoņainu dienu? Izanalizēt VTPMML meteo datus no 2013. Pajautāt Stasim kļūdas.

# 1.4. Saules paneļi



1.5. att. Saules paneļa shēma. Tas sastāv no fotoelementiem, kuru augšējais slānis veidots no p-tipa pusvadītāja, bet apakšējais — no n-tipa pusvadītāja.

# 2. REZULTĀTI UN DISKUSIJA

# **SECINĀJUMI**

# **PATEICĪBAS**

Pateicos paroksetīnam, xanax, GNU/Linux, Pētera Draguna dzejas krājumam 'Tumšās stundas', Tarvi Verro for teaching me git, Valtam Krūmiņam un Annai Bulei par emocionālo atbalstu, Paulīnai Lodbrukai un Pēterim Ratniekam par ticību maniem spēkiem, Žeņam par kucēnu video, Solvitai par maģiju un Cilvēkam par pacietību. Paldies Aleksandrai Elbakjanai par sci-hub. Paldies "Puratos Latvia" un Asjas un Berndta Everts piemiņas fondam par stipendiju studiju laikā.

Darbs veikts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonta projekta "Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos" Nr ESS2017/209 1.1.1.1/16/A/192 finansiālo atbalstu.

#### IZMANTOTĀ DARBA LITERATŪRA UN AVOTI

- [1] John A. Duffie; William A. Beckman. Solar Engineering of Thermal Processes. 4. izdev. Wiley, 2013. ISBN: 9780470873663. URL: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php? md5=84481e599cbed1e3c70f82b3c1379d1c.
- [2] Claus Fröhlich. "Total Solar Irradiance Observations". *Surveys in Geophysics* 33.3 (2012), lpp. 453—473. ISSN: 1573-0956. DOI: 10.1007/s10712-011-9168-5. URL: https://doi.org/10.1007/s10712-011-9168-5.
- [3] Greg Kopp. SORCE Level 3 Total Solar Irradiance Daily Means, version 018. Tehn. ziņ. Skatīts: 2019-05-22. Greenbelt, MD, USA: NASA Goddard Earth Science Data un Information Services Center (GES DISC), 2019. Doi: doi: 10.5067/D959YZ53XQ4C. url: http://lasp.colorado.edu/data/sorce/tsi\_data/daily/sorce\_tsi\_L3\_c24h\_latest.txt.
- [4] Erik Richard. SORCE Level 3 Solar Spectral Irradiance Daily Means V001. Tehn. ziņ. Skatīts: 2019-05-23. Greenbelt, MD, USA: NASA Goddard Earth Science Data un Information Services Center (GES DISC), 2018. DOI: doi:10.5067/TSIS/SIM/DATA302. URL: http://lasp.colorado.edu/home/tsis/data/ssi-data/?doing\_wp\_cron=1558640803.1350839138031005859375.

Bakalaura darbs "Saules paneļu efektivitāte Latvijas klimatā" izstrādāts Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie in-

| ormācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. |  |
|--|--|
| Autors:/author/  |  |
| Rekomendēju/nerekomendēju darbu aizstāvēšanai                            |  |
| Vadītājs: Dr. Phys. Andris Jakovičs                                      |  |
| Recenzents: Dr. Phys.Aivars Vembris                                      |  |
| Darbs iesniegts Fizikas nodaļā .   |  |
| Dekāna pilnvarotā persona:   |  |
|  |  |
| Darbs aizstāvēts bakalaura gala pārbaudījuma komisijas sēdē              |  |
| , vērtējums  |  |
| Komisijas sekretārs:   |  |