

Contrat Été 2024

RAPPORT HEBDOMADAIRE

RÉALISÉ DANS LE CADRE
D'UN PROJET POUR

ISMER-UQAR

09/08/2024

Rédaction
Charles-Édouard Lizotte
charles-edouard.lizotte@uqar.ca
ISMER-UQAR
Police d'écriture : CMU Serif Roman

Table des matières

1	Notes sur la programmation du modèle WIM en Julia	2
1.1	Opérateur linéaire de Lax-Wendroff	2
1.2	La vitesse d'une onde	2
1.3	Lien entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase	2
1.4	Lax-Wendroff aux murs	3
2	Débriefing réunion Dany (16 aout 2024)	3
2.1	Théorie linéaire des vagues dans la glace ?	3
2.2	Modélisation des vagues en 1 dimension	3
2.3	Planification	3

1 Notes sur la programmation du modèle WIM en Julia

1.1 Opérateur linéaire de Lax-Wendroff

La méthode de Lax-Wendroff peut aussi être exprimée selon le formalisme d'un opérateur linéaire, de telle sorte que

$$\underset{nx \times nx}{\mathbf{A}} \cdot \underset{nx \times nf}{\mathbf{E}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,nx} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,nx} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ a_{nx,1} & a_{nx,2} & \cdots & a_{nx,nx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{1,1} & E_{1,2} & \cdots & E_{1,nf} \\ E_{2,1} & E_{1,2} & \cdots & E_{2,nf} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ E_{nx,1} & E_{1,2} & \cdots & E_{2,nf} \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

L'advection avec Lax-Wendroff est défini comme

$$E_i^{n+1} = E_i^n - \left(\frac{\Delta t}{2\Delta x} \right) c_g(E_{i+1}^n - E_{i-1}^n) + \left(\frac{\Delta t^2}{2\Delta x^2} \right) c_g^2(E_{i+1}^n - 2E_i^n + E_{i-1}^n). \quad (1.2)$$

On isole les variables,

$$\Delta E_i(\omega) = \underbrace{-\lambda^2 c_g(\omega) E_i^n}_{\boxed{A}} + \underbrace{\frac{\lambda c_g(\omega)}{2} (1 + \lambda c_g(\omega)) E_{i-1}^n}_{\boxed{B}} + \underbrace{\frac{\lambda c_g(\omega)}{2} (\lambda c_g(\omega) - 1) E_{i+1}^n}_{\boxed{C}}. \quad (1.3)$$

Puis finalement,

$$\Delta \mathbf{E}(\omega) = \mathbf{A}(\omega) \cdot \mathbf{E} = \begin{pmatrix} A & C & 0 & \cdots & 0 \\ B & A & C & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E(\omega, x_1) \\ E(\omega, x_2) \\ \vdots \\ E(\omega, x_{nf}) \end{pmatrix}, \quad (1.4)$$

et comme la matrice \mathbf{A} est différente pour chaque fréquence, il faut donc recalculer \mathbf{A} pour chaque fréquence. Notons que dans la maîtrise de Bismuth, on assumait une vitesse de groupe identique pour tous les fréquences, ce que je trouve très ordinaire, personnellement.

1.2 La vitesse d'une onde

Quelques rappels techniques rapides,

$$\omega = 2\pi \cdot f \qquad k = 2\pi/\lambda \qquad \omega = \sigma + \mathbf{k} \cdot \mathbf{u} \quad (1.5)$$

La relation de dispersion des ondes de surfaces est aussi exprimée par

$$\sigma = (gk \cdot \tanh(kd))^{1/2} \quad (1.6)$$

Selon Wiki, la vitesse de phase est donnée par

$$v_p = \frac{\omega}{\mathbb{R}\{k\}}, \quad (1.7)$$

donc

$$\boxed{c_p(\omega) = \sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{g}{\omega}}. \quad (1.8)$$

1.3 Lien entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase

Toujours selon Wiki, on définit la vitesse de groupe à l'aide de

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (1.9)$$

Donc, à l'aide de la relation de dispersion et sachant que $\mathbf{u} = 0$, on obtient

$$\begin{aligned}\frac{d\omega}{dk} &= \sqrt{g} \cdot \frac{1}{2} k^{-1/2}, \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}},\end{aligned}\tag{1.10}$$

ainsi on peut mettre en relation la vitesse de groupe et de phase, soit

$$\boxed{c_p = \frac{g}{\omega} \quad ; \quad c_g = \frac{c_p}{2}.}\tag{1.11}$$

Mentionnons aussi que le vecteur $\mathbf{c}_g(\omega)$ est fixe dans le temps, il n'y a pas de dispersion temporelle.

1.4 Lax-Wendroff aux murs

À la case initiale, on assume une condition frontière, donc pas besoin de Lax-Wendroff là. Puis à la case finale, on assume une frontière ouverte de sorte que

$$\left(\frac{\partial E}{\partial x} = 0 \right) \Big|_{x=x_f + \Delta x/2}\tag{1.12}$$

2 Débriefing réunion Dany (16 aout 2024)

2.1 Théorie linéaire des vagues dans la glace ?

Actuellement, il n'existe pas vraiment de théorie linéaire des vagues ou de formalisme des vagues à l'intérieur de la glace comme dans J. W. MILES (1957). Mentionnons qu'il y a un article de J. MILES (1996) décrivant les vagues dans un milieu visco-élastique, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire.

Peut-être qu'il y a un moyen simple de faire ça, mais considérant les mathématiques assez avancées de J. W. MILES (1957), j'en doute. Faudrait peut-être revisiter de manière plus claire ces trucs-là.

2.2 Modélisation des vagues en 1 dimension

Très difficile de représenter les interactions entre les vagues dans un «set-up» en 1 dimension :

- ⇒ Le *spreading* dans les fréquences est mal défini. Quand on fait références aux interactions vagues-vagues, c'est à ça qu'on fait référence (triplette et quadruplètes, aussi). Il devrait statistiquement y avoir un transfert d'énergie des hautes vers les basses fréquences.
- ⇒ Dany mentionnait que dans le modèle Wavewatch III, c'était précisément la *switch* NL4 que Sébastien Dugas avait réussi dans une version de WIM subséquente à intégrer les interactions en 1 dimension, mais les termes de son expansion polynomiale étaient très obscurs. Selon Dany, c'est basé sur les travaux de Hasselmann, mais je pense qu'on parle plus de NL2, dans ce cas.
- ⇒ Le *spreading* dans les directions est inexistant en 1 dimension. Par contre, Dany avait amené l'argument aux reviewers que l'on peut voir une front d'onde comme la propagation de multiples cercles, précisément comme dans l'explication des fentes de Young.

2.3 Planification

Grossièrement, comment ferions nous pour définir un coefficient d'hétérogénéité associé à la glace. Au premier ordre, la glace n'est qu'un filtre et on a tout intérêt à la considérer comme telle. S'il y a de la glace, on filtre des ondes. Déjà, on peut comparer l'effet de mettre de la glace à haute résolution (50% de glace par exemple, avec des

concentrations de glace de 1) et de voir si l'on peut comparer ça avec un modèle à basse résolution (Concentration de glace de 0.5).

Le motif principal est qu'on ne connaît pas du tout les paramétrisations qui ont été faites avec les autres termes sources pour la glace, si c'étaient des *patch* de glace ou de grandes étendues, par exemple. Dany a amené un argument intéressant :

C'est jamais du tout ou rien, s'il y a de la glace, ça ne veut pas dire que les vagues peuvent ne pas croître dans une certaine mesure. Justement, dans la maîtrise d'Eliot Bismuth, c'est ce qu'on a tenté de faire. La relation entre la concentration et le couvert de glace ne devrait pas du tout être linéaire.