

Contrat Été 2024

RAPPORT HEBDOMADAIRE

RÉALISÉ DANS LE CADRE
D'UN PROJET POUR

ISMER-UQAR

23/08/2024

Rédaction
Charles-Édouard Lizotte
charles-edouard.lizotte@uqar.ca
ISMER-UQAR
Police d'écriture : **CMU Serif Roman**

Table des matières

1	Coefficient d'atténuation	2
1.1	Article de AUCLAIR et al. (2022)	2
1.1.1	Atténuation des vagues par la glace	2
2	Recherche d'une métrique sur l'hétérogénéité des paquets de glace	2

1 Coefficient d'atténuation

Dany mentionnait l'article de AUCLAIR et al. (2022) qui offre un coefficient d'atténuation qui avait été proposé par SUTHERLAND et al. (2019).

1.1 Article de Auclair et al. (2022)

1.1.1 Atténuation des vagues par la glace

Grossièrement, on s'éloigne de la méthode de KOHOUT et al. (2011), ce qui est une bonne nouvelle. L'article de SUTHERLAND et al. (2019) semble empiriquement meilleur pour obtenir un coefficient d'atténuation physique α [m^{-1}]. Dans l'article, on illustre le terme source de l'atténuation par la glace par

$$S_{Ice} = -\beta(A, h, f) E_{Waves}. \quad (1.1)$$

Le coefficient d'atténuation temporel β [s^{-1}] est donné par

$$\beta = \frac{\nu \omega^2 \Delta_0}{2g\epsilon h}, \quad (1.2)$$

où

$$\nu = \frac{1}{2} \epsilon^2 \omega h^2, \quad (1.3)$$

est l'épaisseur relative d'une couche perméable de glace recouvrant notre eau et Δ_0 est un paramètre relié à l'amplitude du mouvement des vagues à l'intérieur de cette même couche. Il est donc suggéré de mettre ensemble ces deux équations pour obtenir,

$$\beta = \frac{\epsilon \Delta_0 h \omega^3}{4g}. \quad (1.4)$$

Les deux paramètres libres ϵ et Δ_0 peuvent être combinés. Selon les données de SUTHERLAND et al. (2019), on devrait avoir une relation empirique du genre

$$\epsilon \Delta_0 = 0.5. \quad (1.5)$$

Mentionnons qu'on peut aussi obtenir le taux d'atténuation par floe a – comme utilisé par KOHOUT et al. (2011) – et le mettre en relation avec le taux d'atténuation physique par distance α . La relation est donnée par

$$\alpha = \frac{Aa}{D}, \quad (1.6)$$

où D est le diamètre du floe et A est la concentration de glace.

2 Recherche d'une métrique sur l'hétérogénéité des paquets de glace

On pourrait commencer à regarder du côté de l'entropie. CLairement, il faudrait voir si on peut relier une *mesure du désordre* avec l'atténuation d'énergie dans un domaine de glace.

Mais comment représenter une mesure du désordre ?

Références

- KOHOUT, A. L., MEYLAN, M. H., & PLEW, D. R. (2011). Wave attenuation in a marginal ice zone due to the bottom roughness of ice floes. *Annals of Glaciology*, 52(57), 118–122. <https://doi.org/10.3189/172756411795931525>
- SUTHERLAND, G., RABAULT, J., CHRISTENSEN, K. H., & JENSEN, A. (2019). A two layer model for wave dissipation in sea ice. *Applied Ocean Research*, 88, 111–118. <https://doi.org/10.1016/j.apor.2019.03.023>
- AUCLAIR, J.-P., DUMONT, D., LEMIEUX, J.-F., & RITCHIE, H. (2022). A model study of convergent dynamics in the marginal ice zone. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 380(20210261). <https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0261>