



« Claustrophobie : la  
méthode pour ne plus  
paniquer en espace  
clos, gérer votre  
anxiété et retrouver  
votre liberté de  
mouvement »



Lise Genest

« Claustrophobie : la  
méthode pour ne plus  
paniquer en espace  
clos, gérer votre  
anxiété et retrouver  
votre liberté de  
mouvement »

Editions Bellus



# Sommaire

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Introduction                                                 | 7  |
| Chapitre 1 - Reconnaître les mécanismes de la claustrophobie | 14 |
| Chapitre 2 - Cartographier ses déclencheurs personnels       | 26 |
| Chapitre 3 - Techniques immédiates pour désamorcer une crise | 38 |
| Chapitre 4 - Construire un plan d'exposition progressive     | 52 |
| Chapitre 5 - Pérenniser ses progrès et prévenir les rechutes | 66 |
| Conclusion                                                   | 80 |



# Introduction

La claustrophobie se définit comme la peur irrationnelle et intense des espaces confinés, qu'il s'agisse d'ascenseurs, de transports en commun bondés, de salles d'examen médical ou de parkings souterrains. Cette anxiété spécifique touche près de cinq à dix pour cent de la population adulte, bien que de nombreux cas restent sous-estimés parce que les personnes concernées développent des stratégies d'évitement qui masquent l'ampleur réelle de leur souffrance. Contrairement à l'anxiété généralisée qui se manifeste de manière diffuse dans divers contextes, la claustrophobie réagit à des déclencheurs précis liés à l'enfermement physique, l'impossibilité perçue de fuir immédiatement ou la sensation de perte de contrôle totale sur son environnement. Chez les personnes atteintes, cette peur se traduit par des symptômes physiques marquants : accélération du rythme cardiaque appelée tachycardie, sudation excessive, sensation d'oppression thoracique ou d'étouffement, vertiges et parfois crise de panique complète avec dépersonnalisation. Sans intervention



appropriée, ces manifestations peuvent évoluer vers une invalidité progressive où l'individu restreint de plus en plus son périmètre de vie pour éviter tout contact avec les situations déclencheuses.

À l'ère des espaces urbains densifiés et des infrastructures modernes, maîtriser cette phobie représente un enjeu majeur de liberté personnelle et de santé publique. Les exigences professionnelles imposent fréquemment des déplacements nécessitant l'usage d'ascenseurs ou de transports collectifs, tandis que la médecine contemporaine repose de plus en plus sur des examens d'imagerie comme l'IRM qui requièrent un isolement prolongé dans un cylindre étroit. Pour nombre d'adultes, la claustrophobie n'est pas une simple gêne occasionnelle mais une barrière quotidienne qui limite l'accès aux soins, restreint les opportunités professionnelles et érode la qualité de vie sociale. Thomas, trente-quatre ans et cadre commercial, illustre parfaitement cette réalité. Depuis un incident survenu dans un parking souterrain il y a cinq ans, il évite systématiquement les ascenseurs, préférant gravir douze étages à pied même épuisé par une journée de travail. Il reporte depuis deux ans ses examens d'IRM annuels pour son dos problématique, annule ses déplacements professionnels dès qu'un hôtel sans escalier est prévu, et endure les transports bondés dans une anxiété

grandissante. Au-delà de la contrainte physique, il vit une souffrance psychologique lourde, culpabilisant de ce qu'il perçoit comme du cinéma devant ses collègues qui ne comprennent pas l'ampleur réelle de sa peur. Son cas n'est pas isolé et reflète des milliers de situations où la claustrophobie devient un fardeau invisible mais paralysant.

Ce livre s'adresse avant tout aux adultes qui, comme Thomas, font face à une claustrophobie invalidante dans leur vie quotidienne et cherchent des outils concrets pour réduire leurs crises sans dépendre exclusivement d'un thérapeute. Il s'adresse également à leur entourage, famille, amis ou collègues, qui souhaitent comprendre les mécanismes de cette anxiété spécifique et apprendre à soutenir sans tomber dans la surprotection ou la minimisation des symptômes. L'ouvrage se destine à des lecteurs débutants, sans connaissance préalable en psychologie ou neurosciences, et qui n'ont pas nécessairement accès à un suivi psychothérapeutique régulier soit par manque de ressources, soit par difficulté à consulter en raison même de leur phobie. Il convient de préciser immédiatement que ce guide ne se substitue en aucun cas à un suivi médical ou psychologique professionnel, notamment dans les cas où la claustrophobie s'inscrit dans un tableau de trouble anxieux généralisé ou résulte d'un traumatisme complexe

nécessitant des thérapies spécialisées comme l'EMDR ou les thérapies cognitivo-comportementales encadrées. Les outils d'auto-évaluation proposés restent descriptifs et informatifs, sans valeur diagnostique, et tout lecteur reconnaissant des symptômes alarmants doit impérativement consulter un professionnel pour confirmation et accompagnement adapté.

Structuré en cinq étapes progressives, ce guide alterne explications théoriques accessibles, protocoles pratiques immédiatement applicables et mises en garde nécessaires pour une approche sécurisée et personnalisable. Le premier chapitre pose les bases indispensables en expliquant les mécanismes neurobiologiques et comportementaux de la claustrophobie, notamment le cycle de la peur-évitement-renforcement qui maintient et aggrave le trouble au fil du temps. Le deuxième chapitre propose une méthode rigoureuse pour cartographier vos déclencheurs personnels, car sans cette identification précise, toute technique d'exposition risquerait de rester générique et inefficace. Le troisième chapitre répond à l'urgence en détaillant quatre techniques validées scientifiquement pour désamorcer une crise en cours, avec leurs erreurs d'application fréquentes à éviter absolument. Le quatrième chapitre constitue le cœur de la méthode en vous guidant dans la construction d'un plan d'exposition graduée sur mesure, avec des paliers

réalistes et mesurables. Enfin, le cinquième chapitre aborde la pérennisation des acquis, la gestion des rechutes normales et inévitables, ainsi que les signes indiquant qu'un retour vers un professionnel s'impose. Chaque étape intègre des rappels sur les risques liés aux techniques d'exposition non encadrées, la variabilité individuelle des réponses aux méthodes proposées, et l'importance d'un engagement actif et progressif plutôt que d'une recherche de résultats immédiats.

En suivant ce parcours structuré, vous allez apprendre à identifier avec précision vos déclencheurs uniques, qu'il s'agisse de la peur de l'étouffement comme chez Thomas, de l'impossibilité de fuite, ou du jugement d'autrui en cas de crise visible. Vous maîtriserez des techniques concrètes pour désamorcer une crise de panique en temps réel dans des espaces clos, adaptées selon que vous vous trouvez dans un ascenseur bloqué, un métro surchargé ou une machine d'IRM. Vous construirez progressivement un plan d'exposition personnalisé qui élargira votre zone de confort sans risque de rechute brutale, en apprenant à distinguer entre exposition thérapeutique contrôlée et simple exposition traumatisante. Vous comprendrez également pourquoi l'évitement systématique, bien que rassurant à court terme, constitue l'erreur la plus fréquente et la plus néfaste qui renforce paradoxalement la phobie. Ce livre ne promet

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

pas de guérison miraculeuse ni de disparition instantanée de l'anxiété, mais vous offre les moyens de transformer une peur paralysante en une série d'étapes maîtrisables, concrètes et progressives, pour retrouver une mobilité apaisée et une autonomie retrouvée dans vos espaces de vie quotidiens.



# Chapitre 1

-----

## Reconnaître les mécanismes de la claustrophobie

Pourquoi votre corps réagit-il comme s'il  
était en danger ?

Votre corps réagit instinctivement face à un danger perçu, qu'il soit réel ou imaginaire. Dans le cas d'une situation confinante, votre système nerveux active une réponse de survie ancestrale. Ce mécanisme, conçu pour nous protéger des menaces physiques comme les prédateurs, se manifeste par trois réactions physiologiques majeures : l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la tension musculaire et une respiration plus rapide et superficielle. L'augmentation du rythme cardiaque vise à acheminer plus rapidement le sang oxygéné vers vos muscles, vous préparant à fuir ou à combattre. La tension musculaire accrue vous met également en état d'alerte,

prêt à réagir. Enfin, votre respiration s'accélère pour augmenter l'apport en oxygène.

Le souffle d'une machine de ventilation, invisible et pourtant si présent, se mit à résonner dans la petite cabine, amplifié par le silence soudain. Une légère oppression naquit dans la poitrine de Claire, une sensation familière et redoutée, même si elle savait que les parois de l'ascenseur étaient solides et que les portes allaient bientôt s'ouvrir. Son cœur commença à battre un peu plus vite, un signal que son corps envoyait, celui d'une alerte sans objet concret. Elle sentait déjà la légère transpiration perler à ses tempes. Ce n'était pas le danger qui la menaçait, mais sa propre réaction physiologique, réactivée par la simple fermeture des portes.

Ces réactions, bien qu'automatiques, peuvent devenir très inconfortables et même effrayantes lorsqu'elles sont déclenchées dans un ascenseur, une cabine d'essayage ou un tunnel. Votre cerveau, face à l'espace restreint, la porte fermée ou l'impossibilité de fuite immédiate, interprète ces éléments comme une menace. Il déploie alors sa panoplie de défense, même si votre intellect sait pertinemment que vous n'êtes pas en danger réel. Comprendre que ces manifestations sont une réaction d'alarme involontaire, et non le signe d'une défaillance ou d'une faiblesse, est la première étape pour désamorcer



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
leur emprise.

L'utilité évolutive de cette réponse réside dans sa capacité à vous sauver la vie face à un péril immédiat. Un individu poursuivi par un animal sauvage devait pouvoir courir ou se cacher efficacement. La réponse de lutte, de fuite ou d'immobilisation, qu'elle soit volontaire ou involontaire, est le socle de cette protection. Lorsque vous ressentez votre cœur battre à tout rompre dans un espace clos, votre corps se prépare à une éventualité qui ne se réalisera pas. Le défi pour vous consiste donc à apprendre à distinguer une véritable menace d'une alarme mal calibrée. Ces sensations physiques intenses, bien que désagréables, sont la preuve que votre organisme fonctionne, même s'il le fait de manière inappropriée dans ce contexte.

Il est crucial de noter que ces réactions physiologiques ne sont pas un signe que vous êtes en train de perdre le contrôle. Elles sont une manifestation de votre corps se préparant à une situation de danger. Ce chapitre vous aide à identifier ces signaux, mais les stratégies concrètes pour les calmer et les réduire seront abordées ultérieurement. Pour l'instant, l'objectif est de reconnaître ces manifestations comme des indicateurs d'une réponse de survie déclenchée à tort par votre cerveau, sans sombrer dans la peur de ces sensations elles-mêmes.

## Claustrophobie ou simple inconfort : où se situe votre seuil ?

Votre corps interprète les espaces confinés comme une menace potentielle, même si votre esprit sait qu'il n'y a pas de danger immédiat. Cette interprétation déclenche une cascade de réactions physiologiques destinées à vous préparer à une confrontation ou à une fuite, un héritage de notre évolution. Le rythme cardiaque s'accélère pour acheminer plus rapidement le sang vers vos muscles, prêt à l'action. Votre respiration devient plus rapide et superficielle pour augmenter l'apport en oxygène, bien que paradoxalement cela puisse engendrer une sensation d'étouffement lors d'une crise. La tension musculaire augmente, vous rendant plus alerte et prêt à réagir.

Dans le train bondé, serrée entre deux inconnus, Claire sentit une vague de chaleur monter. Ses mains devinrent moites. Elle chercha instinctivement à prendre un peu plus d'espace, à respirer plus profondément, mais l'air semblait lourd et stagnant. Les visages autour d'elle, absorbés par leurs téléphones ou le paysage défilant, ne lui offraient aucun regard qui pourrait la rassurer. L'impossibilité de s'éloigner de la foule, cette proximité forcée, déclencha cette réponse familière de tension nerveuse.

Ces manifestations physiologiques sont une réponse

d'alarme involontaire du système nerveux. Elles ne sont pas le signe que vous êtes faible ou que vous perdez le contrôle, mais plutôt que votre cerveau a identifié un environnement comme potentiellement dangereux. Le problème de la claustrophobie réside dans le fait que cette alarme se déclenche dans des situations où le danger est absent ou très faible, comme dans un ascenseur moderne ou une cabine d'IRM. Votre organisme réagit comme s'il faisait face à un prédateur, alors que vous êtes simplement dans un espace délimité.

Il est crucial de comprendre que ces réactions sont automatiques et échappent à votre contrôle volontaire dans l'instant présent de la crise. Vous ne pouvez pas simplement décider d'arrêter votre cœur de battre plus vite ou de détendre vos muscles par la seule force de la volonté lorsque l'alarme est déclenchée. Reconnaître ces signaux comme des manifestations physiologiques de votre système de survie, plutôt que comme une preuve d'un danger réel, est la première étape pour commencer à les désamorcer. Cette compréhension vous permet de prendre du recul par rapport à l'intensité des sensations.

Distinguer une véritable menace, comme un feu ou un effondrement, d'une alarme mal calibrée est essentiel. Dans une situation de danger réel, l'accélération cardiaque et la tension musculaire sont des outils précieux pour votre

survie. Avec la claustrophobie, ces mêmes mécanismes se mettent en place pour une situation qui ne présente pas de péril imminent. La sensation d'oppression, la peur de manquer d'air, ou la panique de ne pas pouvoir sortir sont des interprétations de ces signaux corporels, amplifiées par l'anxiété, et non des réalités objectives de l'espace confiné lui-même. Votre seuil personnel détermine à quel moment ces sensations passent du statut d'inconfort à celui d'une détresse intense, transformant une simple perception d'enfermement en une expérience de panique.

### Le cercle vicieux qui aggrave votre phobie sans que vous le sachiez

Votre système nerveux interprète les espaces confinés comme une menace imminente, déclenchant une cascade de réactions physiologiques destinées à vous préparer à un danger. L'accélération de votre rythme cardiaque, par exemple, n'est pas un signe de faiblesse, mais une réponse orchestrée pour envoyer plus de sang et d'oxygène vers vos muscles, vous préparant ainsi à une potentielle fuite ou à un affrontement. De même, votre respiration devient plus rapide et superficielle afin d'augmenter l'apport en oxygène, carburant essentiel pour une action physique intense.

Ces changements ne sont pas le fruit d'une mauvaise

pensée ou d'un manque de volonté. Il s'agit de mécanismes de survie hérités de nos ancêtres, dont le rôle était de nous protéger face aux dangers réels de leur environnement. Face à une situation perçue comme dangereuse, votre corps réagit instinctivement. La sensation de tension musculaire accrue, par exemple, vous rend plus alerte et prêt à réagir. Ces réactions automatiques constituent une sorte d'alarme interne, dont l'objectif est de vous maintenir en sécurité.

Cependant, dans le contexte de la claustrophobie, cette alarme se déclenche de manière inappropriée. Votre cerveau interprète des situations objectivement sûres, comme un ascenseur en bon état de fonctionnement, comme une menace vitale. Il ne distingue pas le danger réel du danger perçu. Les symptômes que vous ressentez alors – palpitations, souffle court, sueurs – sont les manifestations concrètes de cette réponse d'urgence. Vous ne contrôlez pas consciemment ces manifestations ; elles sont générées par une partie de votre cerveau archaïque qui tente de vous protéger.

La porte du petit bureau de l'administration se referma derrière elle avec un clic doux, mais pour Claire, ce son résonna comme un sceau. Elle était seule dans cet espace exigu, le dossier qu'elle devait consulter sur la table. L'air parut soudain plus épais, et une légère nausée

s'empara d'elle. Son corps se tendit, prêt à l'action, même si la seule action possible était de lire quelques documents. Ce sentiment d'être prise au piège, de ne pouvoir échapper à la situation, était le déclencheur principal.

Cette activation systématique du système d'alarme, même en l'absence de danger réel, est la pierre angulaire de votre difficulté à tolérer les espaces confinés. Ce qui peut sembler être une réaction excessive est en réalité le fonctionnement d'un système de défense qui s'est dérégulé. Comprendre que votre corps réagit à une perception de danger, et non à un danger avéré, est la première étape pour commencer à désamorcer ces réactions automatiques. Ces manifestations physiologiques sont une réponse du système nerveux, pas un choix délibéré de votre part.

Le sentiment que vous éprouvez dans ces situations, comme une détresse intense ou une envie irrésistible de fuir, découle directement de ces réactions physiologiques. Votre corps est en état d'alerte maximale, et votre esprit le perçoit comme une confirmation du danger. Reconnaître ces manifestations comme des signaux de votre système nerveux, plutôt que comme des preuves tangibles de la dangerosité de la situation, est fondamental. C'est seulement en comprenant cette dynamique que vous

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

pourrez commencer à envisager des stratégies pour modifier cette réponse automatique. Les réactions physiologiques, bien que désagréables, sont des indicateurs d'un système qui tente de vous protéger, même maladroitement.

## Les trois déclencheurs universels que votre cerveau confond avec un danger mortel

Votre cerveau est programmé pour réagir à ce qu'il perçoit comme une menace imminente, et les espaces confinés peuvent déclencher cette alarme interne. Face à une situation perçue comme dangereuse, votre organisme active un ensemble de réactions physiologiques orchestrées par le système nerveux. L'une des réponses les plus fondamentales est le mécanisme de lutte ou de fuite, souvent accompagné de la possibilité d'immobilisation. Il s'agit d'une réponse d'urgence héritée de nos ancêtres, conçue pour nous aider à survivre face à un danger concret, comme un prédateur ou un effondrement.

Dans le contexte de la claustrophobie, ce système d'alerte se déclenche de manière inappropriée. L'espace confiné, l'impossibilité de fuir ou la sensation de perte de contrôle sont interprétés par votre cerveau comme des menaces réelles. Cette interprétation erronée conduit à une cascade

de réactions physiques conçues pour vous préparer à l'action. Votre rythme cardiaque s'accélère pour pomper plus de sang vers vos muscles, votre respiration devient plus rapide et superficielle pour augmenter l'apport en oxygène, et vous pouvez ressentir une tension musculaire généralisée.

Ces manifestations physiques, bien qu'inconfortables et parfois terrifiantes, ne sont pas le signe d'une faiblesse ou d'un manque de contrôle. Elles sont l'expression d'un mécanisme de survie activé. La sensation de suffocation que vous pouvez éprouver n'est pas due à un manque d'air, mais à l'hyperventilation qui altère l'équilibre de votre corps. De même, les tremblements ou la sensation de tête légère sont des conséquences directes de ces ajustements physiologiques rapides. Comprendre que ces réactions sont une réponse automatique et non une défaillance personnelle est une première étape cruciale pour commencer à les désamorcer.

Il est important de reconnaître que ces déclencheurs existent chez la plupart des individus qui souffrent de cette peur, même si l'intensité de la réaction varie considérablement. L'enfermement strict, comme dans un ascenseur en panne, active directement la sensation de piégeage. L'impossibilité de fuir, comme dans un tunnel ou une salle sans issue, renforce l'idée d'être acculé. Enfin, la



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

perte de contrôle, par exemple lors d'un examen médical nécessitant de rester immobile, peut déclencher l'alarme car vous n'avez plus la capacité d'agir sur votre environnement immédiat. Ces trois éléments, souvent présents simultanément, constituent un cocktail potentiellement explosif pour votre système nerveux.

Lorsqu'elle s'installa dans la cabine d'IRM, le technicien lui souriant et lui expliquant les consignes, un frisson parcourut le dos de Claire. Le tunnel métallique s'annonçait long et étroit. Bien qu'elle sût que c'était pour sa santé et qu'elle serait sous surveillance, l'idée même d'y rester immobile, confinée, réactiva son système d'alarme. La sensation d'enfermement, l'impossibilité de bouger librement et le sentiment de dépendance totale face au bon vouloir de la machine provoquèrent cette montée d'angoisse. Son corps anticipait une menace qui n'existait pas réellement.



## Chapitre 2

-----

### Cartographier ses déclencheurs personnels

Comment repérer les situations qui vous font paniquer sans même vous en rendre compte ?

Comment repérer les situations qui vous font paniquer sans même vous en rendre compte ? L'anxiété associée aux espaces clos ne se manifeste pas toujours par une panique immédiate et évidente. Souvent, votre corps envoie des signaux subtils qui précèdent le pic de détresse, mais que vous ignorez ou minimisez, considérant ces manifestations comme insignifiantes ou même normales dans certaines circonstances. Reconnaître ces signaux avant qu'ils ne s'intensifient est la première étape pour reprendre le contrôle. Ces manifestations peuvent inclure une légère sensation de

serrement dans la poitrine, une augmentation discrète du rythme cardiaque, une fine sueur sur le front, ou une tension inhabituelle dans les mâchoires ou les épaules.

Dans la file d'attente pour le distributeur automatique, derrière trois personnes, Claire commença à sentir cette légère crispation dans les épaules. Une sensation presque imperceptible, loin de la panique qu'elle redoutait. Elle avait remarqué que, plus l'attente s'étirait et plus la proximité devenait pressante, plus cette tension s'installait insidieusement. Si elle y prêtait attention dès les premiers signes, elle pouvait encore reprendre le contrôle avant que les sensations ne s'intensifient.

Vous apprendrez à observer vos réactions en temps réel pour identifier vos déclencheurs cachés, même ceux que vous minimisez. Il s'agit d'une démarche d'auto-observation active, un entraînement à devenir le détective de vos propres réactions physiologiques et cognitives. Cela implique de porter une attention particulière aux pensées qui traversent votre esprit au moment où vous entrez dans un espace potentiellement anxiogène, qu'il s'agisse d'un ascenseur, d'un train, d'une cabine d'essayage, ou même d'une pièce avec la porte fermée. Notez la nature de ces pensées : sont-elles des craintes concrètes, des scénarios catastrophes imaginés, ou des sensations physiques désagréables que vous

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
interprétez comme dangereuses ?

Thomas découvre que sa peur des ascenseurs est liée à l'odeur de renfermé, pas seulement à l'enfermement. Cette observation peut sembler anodine, mais elle révèle une dimension sensorielle insoupçonnée de sa réaction. L'odeur, par le biais du système olfactif, peut directement activer des zones cérébrales associées aux émotions et aux souvenirs, déclenchant ainsi une réponse de peur sans que vous ayez consciemment identifié le danger. En prêtant attention à ces détails, vous commencez à déconstruire la réaction globale de panique pour en isoler les composantes spécifiques, rendant ainsi la gestion de cette peur plus ciblée et donc plus efficace.

Ne pas agir sur ces signaux avant qu'ils ne déclenchent une crise véritablement invalidante est une erreur qui maintient le cycle de la peur. Si vous attendez que la tachycardie s'emballe ou que l'oppression thoracique devienne insoutenable, votre capacité à réagir calmement est considérablement réduite. En revanche, identifier ces prémices d'anxiété vous donne une marge de manœuvre précieuse pour intervenir avec des techniques de régulation, comme celles que nous aborderons ultérieurement. Cette vigilance accrue permet de désamorcer la réaction avant qu'elle ne prenne le contrôle, transformant une expérience potentiellement terrifiante en

une simple gêne passagère.

## Le journal des crises : votre allié pour décrypter vos peurs

Dans votre parcours de compréhension de la claustrophobie, la phase d'auto-observation rigoureuse constitue une étape charnière. Il ne s'agit pas simplement de noter les moments où vous ressentez une forte anxiété, mais de déployer une attention fine aux signaux discrets qui précèdent et accompagnent ces moments. Votre corps peut vous envoyer des messages subtils bien avant que la panique ne devienne manifeste : une légère tension dans les épaules, une respiration qui s'accélère à peine, une sensation de chaleur diffuse, ou même une pensée furtive que vous écarterez rapidement. Apprendre à reconnaître ces signaux, même lorsqu'ils paraissent insignifiants, est fondamental car ils constituent vos premières opportunités d'intervention.

Le journal des crises se révèle être un outil précieux pour cette auto-observation active. Ce n'est pas un simple registre d'événements, mais un espace dédié à l'exploration détaillée de vos expériences. Pour chaque situation vécue, notez avec précision le lieu, le contexte, la durée, mais surtout, les sensations physiques ressenties, les pensées qui traversent votre esprit, et l'intensité de

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

vosre anxiété sur une échelle de 0 à 10. Ne négligez aucun détail, aussi anodin semble-t-il. L'odeur spécifique d'un ascenseur, la texture d'un siège dans un train, le bruit d'une porte qui se ferme, ou même la couleur des murs peuvent agir comme des déclencheurs subtils qui, une fois identifiés, peuvent être gérés plus efficacement.

Claire ouvrit son carnet et griffonna rapidement. 'Mardi, 15h. Entrée dans le parking souterrain. Porte de l'ascenseur fermée. Palpitations douces, une légère chaleur dans la nuque. Pensée : "Je ne veux pas descendre". Durée : 1 min avant de rebrousser chemin.' Elle nota ensuite son humeur juste avant et juste après : 'Calme, puis irritée.' Ce simple enregistrement des faits, des sensations et des pensées, lui permettait de démêler le nœud de ses réactions.

Au fil des entrées, vous commencerez à discerner des motifs récurrents dans vos réactions. Par exemple, vous pourriez réaliser que votre anxiété dans les transports en commun augmente de manière significative lorsqu'il y a beaucoup de monde, pas seulement à cause de la promiscuité, mais peut-être en raison d'une sensation d'étouffement que vous n'aviez pas clairement identifiée auparavant. Ce journal vous permet d'objectiver vos peurs, de passer du ressenti diffus à une analyse concrète, et de révéler les déclencheurs cachés qui, jusque-là, agissaient sans que vous en compreniez la

cause profonde. Cette objectivation est une étape cruciale pour reprendre le contrôle, car ce qui est identifié peut être abordé.

Ces observations vous aideront également à repérer les exceptions à vos schémas habituels. Peut-être qu'un jour, dans une situation qui vous angoisse normalement, vous vous sentez relativement calme. Chercher à comprendre pourquoi, en analysant les conditions particulières de cette journée, peut vous fournir des indices précieux sur les facteurs qui atténuent votre anxiété et que vous pourrez ensuite tenter de reproduire ou d'intégrer dans vos stratégies. Le journal est donc un outil de traçabilité essentiel qui vous permet de comprendre le fonctionnement intime de votre claustrophobie, bien au-delà des manifestations évidentes de la panique.

### Classer vos déclencheurs du moins au plus angoissant : la méthode des petits pas

Pour rendre votre parcours de guérison concret et réalisable, il est essentiel de hiérarchiser les situations qui déclenchent votre anxiété. Cette démarche, souvent appelée construction d'une échelle d'anxiété personnelle, consiste à ordonner les contextes redoutés, de ceux qui provoquent une légère appréhension à ceux qui entraînent une panique intense. En attribuant à chaque situation un



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

niveau sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l'absence totale d'angoisse et 10 une crise de panique insurmontable, vous vous dotez d'un outil d'évaluation objectif. Cette classification vous permet d'aborder vos peurs de manière stratégique, en commençant par les défis les moins intimidants, ce qui renforce votre confiance et votre motivation à chaque étape franchie.

Cette hiérarchisation vous offre une feuille de route claire pour vos exercices futurs. Plutôt que de vous confronter d'emblée aux situations les plus terrifiantes, vous progressez par paliers. Par exemple, si l'idée d'être dans un ascenseur bondé vous place à 9/10 sur votre échelle, vous ne chercherez pas à l'affronter immédiatement. Vous commencerez par des situations moins intenses, peut-être rester à proximité d'un ascenseur portes ouvertes (2/10), puis monter dans un ascenseur vide avec un ami (4/10), et ainsi de suite. Chaque palier réussi vous prépare mentalement et physiologiquement à affronter le suivant, transformant une montagne insurmontable en une série de petites collines abordables.

Debout devant un ascenseur, le cœur battant à un rythme un peu plus vif, Claire se demanda si elle devait monter. Le chiffre 6 sur le panneau semblait déjà trop haut. Elle s'imagina dans la cabine, l'espace confiné, et une appréhension sourde monta. Elle la plaça mentalement à

4 sur son échelle. C'était gérable, mais juste assez pour lui dicter de chercher une alternative, comme prendre les escaliers. Elle se félicita de pouvoir évaluer ce sentiment sans être submergée.

Cette approche graduelle est fondamentale pour éviter la surcharge émotionnelle, qui peut être contre-productive et mener à l'abandon. En travaillant sur des situations jugées gérables, vous habituez progressivement votre système nerveux à réagir différemment face aux contextes autrefois redoutés. Votre cerveau apprend que ces situations, bien que désagréables, ne représentent pas un danger réel et qu'il peut maintenir un niveau d'anxiété supportable, voire faible, une fois que les techniques de gestion sont appliquées. L'objectif n'est pas de ne plus ressentir aucune émotion, mais de moduler l'intensité de la réaction anxieuse pour qu'elle ne devienne plus invalidante.

L'élaboration de votre échelle d'anxiété personnelle représente une étape décisive pour personnaliser votre parcours. Elle vous amène à reconnaître que votre vécu est unique et que votre progression doit l'être tout autant. Elle transforme une peur diffuse et globale en une série de défis précis et quantifiables, rendant ainsi la démarche moins intimidante et plus engageante. Cet outil devient votre boussole, vous guidant vers une reconquête progressive de votre liberté de mouvement, sans

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
précipitation ni risque de rechute due à une exposition trop  
rapide.

## Peurs primaires vs. peurs secondaires : ce qui vous bloque vraiment

La classification des situations qui provoquent votre anxiété selon leur intensité constitue une étape fondamentale dans la compréhension et la maîtrise de votre claustrophobie. Elle permet de passer d'une appréhension diffuse et globale à une appréhension précise des éléments déclencheurs, facilitant ainsi leur traitement. Cette démarche rend le processus d'affronter vos peurs concret et gérable, évitant de vous sentir submergé par l'ampleur de votre condition. L'identification et la hiérarchisation des situations anxiogènes vous fournissent une feuille de route claire, vous guidant vers une progression maîtrisée.

Pour dresser cette carte de vos réactions, vous allez construire une échelle personnelle d'anxiété, généralement graduée de 0 à 10. Le chiffre 0 représentera une absence totale de peur ou d'inconfort, tandis que 10 symbolisera le pic de votre anxiété, le moment où la panique s'installe. L'objectif est de placer chaque situation redoutée sur cette échelle, de celle qui ne provoque qu'une légère appréhension à celle qui déclenche une

réaction intense. Ce travail d'évaluation subjective est crucial car il reflète votre vécu propre, vos ressentis profonds, et non une appréhension générale ou médicale.

Prenez le temps de noter toutes les situations qui vous mettent mal à l'aise, même celles qui vous semblent mineures. Il peut s'agir de rester dans une pièce où la porte est fermée, de monter dans un petit ascenseur, ou de vous trouver dans un tunnel. Pour chaque situation, attribuez un chiffre correspondant à l'intensité de votre malaise. Par exemple, se tenir juste devant la porte d'un ascenseur pourrait correspondre à un 2/10, tandis que monter dans cet ascenseur avec la porte qui se ferme serait un 5/10, et se retrouver seul dans un ascenseur à plusieurs étages pourrait atteindre un 7 ou 8/10.

**FIL ROUGE :** Claire avait dressé une liste mentale des situations qui la mettaient mal à l'aise. La salle d'attente du dentiste était un 7, la montée en téléphérique lors de ses dernières vacances un 8, et l'idée d'un tunnel autoroutier sans issue immédiate, un bon 9. Elle savait maintenant que se confronter directement au 9 ou au 8 serait contre-productif. L'objectif était de cibler le 7, ou même le 5, pour commencer, en s'assurant que l'anxiété reste à un niveau qui permette de réfléchir et d'agir.

Cette hiérarchisation vous permet ensuite d'aborder vos

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

peurs de manière stratégique. Vous commencerez par vous confronter aux situations qui se situent en bas de votre échelle, celles qui vous causent le moins d'anxiété. En parvenant à gérer ces situations, vous accumulerez des expériences positives et renforcerez votre confiance en votre capacité à surmonter votre claustrophobie. Cette approche par petits pas, où chaque succès vient valider votre progression, est essentielle pour éviter la surcharge émotionnelle et pour construire une résilience durable.

Il est important de noter que cette échelle est dynamique et peut évoluer au fur et à mesure de vos progrès. Ce qui était un 7/10 un jour peut devenir un 4/10 quelques semaines plus tard. L'utilisation régulière de cette échelle, notamment lors de vos exercices d'exposition, vous permettra de suivre vos avancées de manière objective et de savoir précisément quand il est judicieux d'augmenter le niveau de difficulté. Elle constitue ainsi un outil d'auto-évaluation précieux, vous rendant acteur de votre rétablissement.



## Chapitre 3

-----

### Techniques immédiates pour désamorcer une crise

Respirer pour reprendre le contrôle : la technique qui calme votre système nerveux en 30 secondes

Pourquoi votre corps réagit-il comme s'il était en danger ?

Votre corps possède un système d'alarme sophistiqué, conçu pour vous protéger des menaces réelles. Face à un danger perçu, qu'il soit physique ou psychologique, ce système se déclenche automatiquement. C'est ce qui se passe lorsque vous ressentez de la claustrophobie. Votre cerveau interprète à tort un espace clos, comme un ascenseur ou une cabine d'IRM, comme une situation potentiellement dangereuse, similaire à une agression ou une chute. Cette perception erronée active alors une

cascade de réactions physiologiques destinées à vous préparer à l'action : soit combattre, soit fuir, soit vous immobiliser si l'action est impossible.

Ces réactions sont connues sous le nom de réponse de lutte-fuite-immobilisation. Vos poumons se dilatent pour absorber plus d'oxygène, votre rythme cardiaque s'accélère pour pomper le sang plus efficacement vers vos muscles, et votre système digestif se met en pause, redirigeant son énergie. Vous pouvez ressentir une tension musculaire généralisée, des tremblements, des sueurs, et une sensation d'étouffement ou de suffocation. Ces manifestations physiques, bien que désagréables, sont en réalité des signaux d'alerte, vestiges de mécanismes évolutifs conçus pour la survie face à des dangers physiques concrets.

Comprendre que ces symptômes sont une réaction physiologique, et non un signe que vous êtes réellement en train de mourir ou de suffoquer, est une première étape cruciale. Votre système nerveux autonome, qui contrôle ces réactions involontaires, fonctionne de manière automatique. Il ne fait pas la distinction entre un prédateur féroce et une cabine d'ascenseur. C'est cette confusion de votre système nerveux qui engendre la panique. Sans cette compréhension, il est facile de croire que l'espace clos est objectivement dangereux, renforçant ainsi le cycle



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
de la peur.

Alors que la porte du petit local de stockage se refermait derrière elle pour retrouver une étagère en hauteur, Claire sentit son souffle se bloquer un instant. Un simple réflexe, son corps se préparant à un effort qui n'était pas nécessaire. Elle se rappela immédiatement que ce n'était qu'une alarme, une réaction automatique à un espace perçu comme restreint. Elle inspira lentement, se concentrant sur l'air entrant dans ses poumons, cherchant à calmer cette alerte inutile.

Il est essentiel de noter que ces réactions ne sont pas de votre faute ; elles sont le résultat d'un programme de survie qui s'est activé de manière inappropriée. Le fait de les reconnaître comme des manifestations du système d'alarme peut déjà commencer à réduire leur intensité. Savoir que votre corps tente de vous protéger, même si son interprétation est erronée, peut vous aider à prendre un certain recul face aux sensations physiques. L'objectif n'est pas de supprimer ces réactions, car elles sont une part intégrante de votre physiologie, mais d'apprendre à les gérer et à les désamorcer.

Les situations qui déclenchent cette réaction sont celles où vous avez l'impression d'être piégé, de ne pas pouvoir échapper à un danger perçu. C'est le cœur de la

claustrophobie : une alarme de danger qui se déclenche sans qu'il y ait de menace réelle. Comprendre l'origine de cette réaction physiologique permet de poser les bases de votre rétablissement, en abordant les outils de régulation dès le chapitre suivant. Le fait que votre corps réagisse intensément ne signifie pas que la menace est réelle, mais plutôt que votre système de sécurité est particulièrement sensible dans ces contextes.

### Cohérence cardiaque : le protocole en 5 étapes pour stabiliser votre rythme en situation de stress

La cohérence cardiaque est une méthode qui consiste à synchroniser votre rythme respiratoire avec votre rythme cardiaque. Ce protocole spécifique, souvent résumé par la séquence 3-6-5, vise à induire un état de calme et de régulation physiologique en un temps record. Il repose sur le principe que lorsqu'on respire à un rythme régulier, le cœur suit ce rythme, ce qui envoie des signaux apaisants au cerveau. Cette technique a été validée pour son efficacité dans la réduction du stress et de l'anxiété.

Pour appliquer la méthode 3-6-5, vous devez effectuer des cycles respiratoires qui durent chacun six secondes pour l'inspiration et six secondes pour l'expiration. Cela signifie que vous inspirez pendant six secondes, puis expirez

pendant six secondes, ce qui établit une fréquence respiratoire de dix respirations par minute. Cette cadence lente et régulière est optimale pour atteindre un état de cohérence physiologique. En pratiquant ceci, vous facilitez la transition de votre système nerveux vers un état de repos.

L'objectif de cette pratique est de stabiliser votre rythme cardiaque, qui a tendance à s'accélérer et à devenir irrégulier lorsque vous êtes anxieux ou paniqué. En induisant une respiration régulière, vous aidez votre cœur à retrouver une cadence plus stable et moins réactive aux déclencheurs de votre claustrophobie. Cela peut effectivement contribuer à prévenir une crise ou à en atténuer l'intensité si elle commence à se manifester. L'effet ressenti est souvent celui d'un retour au calme mental et physique.

Dans l'ascenseur qui commençait sa lente ascension, Claire ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Elle inspira par le nez en comptant jusqu'à trois, retint l'air un instant, puis expira longuement par la bouche en comptant jusqu'à six. Elle répéta ce cycle plusieurs fois. Le rythme régulier de son souffle ralentissait son cœur qui commençait à s'emballer. La sensation d'étouffement s'estompa peu à peu, remplacée par une forme de calme mesuré.

Ce protocole doit être répété pendant au moins cinq minutes pour en observer les bénéfices. La régularité est la clé : l'intégrer dans votre routine, par exemple une fois le matin, une fois le soir, ou dès que vous sentez une montée d'anxiété, renforce son efficacité à long terme. Même si vous ne pouvez pas réaliser l'exercice complet dans une situation d'urgence, quelques cycles de respiration profonde et lente peuvent déjà commencer à modifier votre réponse physiologique. L'important est de s'entraîner à retrouver ce rythme.

Vous pouvez utiliser cette technique comme une mesure préventive avant d'entrer dans une situation potentiellement anxiogène, comme un ascenseur, un examen médical ou un trajet en transport public. En vous préparant ainsi, vous renforcez votre capacité à rester calme et à mieux gérer les sensations d'oppression ou d'étouffement que vous pourriez ressentir. Elle vous permet de reprendre une forme de contrôle sur vos réactions physiques, même lorsque vous ne pouvez pas contrôler la situation extérieure. L'application régulière de ce protocole peut grandement améliorer votre résilience face aux déclencheurs de votre claustrophobie.

## Ancrage sensoriel : comment utiliser vos 5

## sens pour sortir de la spirale de la panique

Utiliser vos cinq sens pour ramener votre esprit à la réalité immédiate représente une stratégie efficace pour court-circuiter le flot de pensées anxieuses qui accompagnent souvent une crise. Cette approche, souvent appelée ancrage sensoriel, vous invite à vous focaliser sur ce que vous percevez concrètement autour de vous, détournant ainsi votre attention des scénarios catastrophiques imaginés. En mobilisant intentionnellement votre ouïe, votre vue, votre toucher, votre odorat et même votre goût, vous obligez votre cerveau à traiter des informations présentes et tangibles, créant ainsi une ancre dans le réel.

Par exemple, si vous vous trouvez dans un wagon de métro bondé et que l'anxiété monte, vous pouvez commencer par identifier mentalement cinq choses que vous pouvez voir : la couleur des sièges, la texture du mur, la lumière, le visage d'une personne au loin, une publicité. Ensuite, concentrez-vous sur quatre choses que vous pouvez toucher : la texture de vos vêtements, la surface du siège sous vos mains, la température de l'air sur votre peau, le poids de votre sac. Ces observations concrètes et détaillées vous ramènent au moment présent.

Assise dans la file d'attente du cinéma, le bourdonnement de la foule la submergeait. Elle commença à sentir cette

appréhension monter. Levant les yeux, elle remarqua le motif répétitif des sièges en velours rouge devant elle. Puis elle porta son attention sur la texture rugueuse du dossier de son fauteuil, et sur la légère odeur de pop-corn dans l'air. En se concentrant sur ces perceptions concrètes, l'emprise des pensées envahissantes diminua, la ramenant à l'instant présent.

Poursuivez en identifiant trois choses que vous pouvez entendre : le bruit du train, les conversations des autres passagers, une musique lointaine. Puis, deux choses que vous pouvez sentir : l'odeur de l'air, un parfum passager. Enfin, terminez par une chose que vous pouvez goûter : le goût résiduel d'un café bu plus tôt, ou simplement la sensation dans votre bouche. L'intensité et la précision de ces observations sont cruciales pour déconstruire le sentiment de détresse.

Cette technique de recentrage est particulièrement utile lorsque les autres méthodes, comme la respiration, sont difficiles à appliquer en raison du contexte ou de l'intensité de la sensation. L'ancrage sensoriel offre une alternative pratique, accessible à tout moment, pour interrompre la spirale de la panique. Il permet de reprendre une forme de contrôle en se réappropriant son environnement immédiat, étape par étape, à travers des sensations palpables et vérifiables.

Il est cependant important de noter que cette méthode ne traite pas directement les pensées irrationnelles elles-mêmes. Son objectif est de créer une diversion sensorielle efficace pour désamorcer la réaction physique et psychologique immédiate, permettant ainsi de penser plus clairement ensuite. Si les pensées erronées persistent et vous submergent, d'autres stratégies seront nécessaires. Ce point est approfondi ailleurs. L'efficacité de l'ancrage sensoriel réside dans sa capacité à vous reconnecter au présent, offrant un répit bienvenu lors d'un épisode anxieux.

## Restructuration cognitive en temps réel : transformer vos pensées catastrophiques en 3 questions

Pendant une crise de panique, votre esprit peut être submergé par des pensées négatives et irrationnelles qui alimentent la peur. La restructuration cognitive vous offre un moyen efficace de les identifier et de les modifier sur le moment, même lorsque vous vous sentez dépassé. L'objectif est de remplacer les scénarios catastrophiques par des réflexions plus réalistes et constructives, vous permettant ainsi de retrouver une perspective plus équilibrée. Il s'agit d'une approche active qui vous redonne un sentiment de contrôle sur vos réactions émotionnelles.

Pour appliquer cette technique, posez-vous systématiquement trois questions clés dès que vous sentez une pensée anxieuse s'installer. La première est : « Quelle est la preuve concrète de cette pensée ? » Cherchez des faits tangibles qui soutiennent ou réfutent votre peur. La deuxième question est : « Quelle est la probabilité réelle que ce que je redoute arrive ? » Évaluez objectivement le risque, en tenant compte de votre expérience et du contexte. La troisième interrogation consiste à vous demander : « Si le pire devait arriver, comment pourrais-je y faire face ? » Cette question vous pousse à envisager des solutions et à réaliser que vous possédez des ressources pour gérer une situation difficile, même si elle se produit.

Il est important de noter que cette méthode vise à modifier la \*manière\* dont vous interprétez vos pensées, pas nécessairement à supprimer la pensée elle-même d'un coup. L'efficacité réside dans la répétition et la constance de ces questionnements. Par exemple, si vous pensez « Je vais suffoquer dans cet ascenseur », vous pouvez vous demander : « Est-ce que j'ai déjà suffoqué dans un ascenseur ? Non. Les portes sont conçues pour laisser passer l'air. Quelle est la probabilité réelle ? Très faible. Si je commençais à avoir du mal à respirer, je pourrais me concentrer sur ma respiration lente ou appuyer sur le



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

bouton d'alarme. » Cette démarche active vous permet de sortir de la spirale de l'anticipation négative.

Alors qu'elle anticipait le passage dans le couloir étroit du musée, Claire se dit : 'Je vais me sentir enfermée, c'est sûr.' Immédiatement, elle se reprit : 'Est-ce vraiment un danger ? Non, c'est juste un couloir. Je peux sortir quand je veux. Et je suis avec des amis.' Ce petit dialogue intérieur lui permit de dégonfler l'ampleur catastrophique qu'elle donnait à la situation, remplaçant la peur anticipée par une évaluation plus juste de la réalité.

Cette technique se révèle particulièrement utile lorsque les autres méthodes, comme l'ancrage sensoriel, ne suffisent pas à calmer l'intensité de vos pensées ou lorsque les éléments extérieurs ne sont pas propices à leur application. Elle vous permet de travailler directement sur les mécanismes psychologiques qui entretiennent la peur. Le fait de remettre en question vos propres pensées, même lorsque vous êtes anxieux, renforce votre capacité à réguler vos émotions et à prendre du recul face à vos angoisses. Il est essentiel de pratiquer ces questions régulièrement, même en dehors des situations de crise, afin de les intégrer comme une réponse automatique face à vos pensées inquiétantes.

**Adapter les techniques à votre contexte :**

## ascenseur, IRM ou transports, quelle méthode choisir ?

Pour une efficacité maximale dans un contexte de confinement, il est essentiel d'adapter les techniques de gestion de crise à la situation spécifique que vous rencontrez. Dans un métro bondé, où les interactions physiques sont inévitables et où l'espace est restreint, l'ancrage sensoriel peut s'avérer particulièrement utile. Concentrez-vous sur la texture de vos vêtements, le poids de vos affaires dans vos mains, ou le son distinctif d'une annonce dans la rame. Cette focalisation sur des sensations concrètes et immédiates détourne votre attention des pensées anxieuses relatives à l'espace lui-même. L'objectif est de ramener votre esprit dans le présent immédiat, loin des scénarios catastrophes imaginés.

Lorsque vous vous trouvez dans un examen médical comme une imagerie par résonance magnétique (IRM), les contraintes sont différentes et souvent plus restrictives. L'immobilité forcée et le bruit généré par l'appareil peuvent amplifier le sentiment d'être prisonnier. Dans ce cas, la respiration diaphragmatique devient votre outil principal. Concentrez-vous sur le mouvement lent et régulier de votre abdomen, en inspirant par le nez et en expirant doucement par la bouche. La cohérence cardiaque peut

également être une alliée précieuse avant et pendant l'examen, si le praticien vous y autorise. Ces méthodes sont adaptées car elles ne nécessitent pas de manipulation d'objets ou de mouvements externes, et peuvent être pratiquées discrètement.

Il est important de noter que ces techniques ne visent pas à supprimer la pensée d'un danger, mais à réduire l'intensité de la réaction émotionnelle associée. Par exemple, dans le métro, reconnaître votre peur de l'étouffement est acceptable, mais l'objectif est de ne pas la laisser gouverner vos pensées au point de déclencher une panique généralisée. De même, dans un IRM, vous pouvez accepter la sensation d'être confiné, tout en utilisant la respiration pour maintenir votre système nerveux dans un état de calme relatif. L'idée n'est pas d'éliminer la peur, mais de la rendre gérable.

Évitez de vous focaliser sur des pensées répétitives comme "Je vais suffoquer" ou "Je ne peux pas sortir". Ces pensées automatiques amplifient la réaction de stress. Au lieu de cela, appliquez la restructuration cognitive mentionnée précédemment : demandez-vous si ces pensées sont factuellement prouvées dans l'instant présent, ou si elles relèvent de l'anticipation négative. Par exemple, dans le métro, il est probable que vous puissiez respirer normalement et que les portes s'ouvriront à la

prochaine station. Dans un IRM, vous savez qu'il y a des soignants à proximité et que la durée de l'examen est limitée.

Claire se retrouva dans une petite pièce sans fenêtre pour un entretien. L'angoisse monta doucement. Elle commença sa respiration diaphragmatique. Puis, remarquant que le mur devant elle était orné d'un tableau abstrait coloré, elle se concentra sur les formes et les nuances, essayant d'y trouver une logique visuelle. Si l'envie de fuir se faisait sentir, elle savait qu'elle pouvait recourir à ce dialogue intérieur pour contrer les pensées catastrophiques qui affleuraient, s'assurant une gestion plus complète de son malaise.

Chaque situation demande une approche spécifique. L'efficacité réside dans la flexibilité et la capacité à choisir l'outil le plus approprié au contexte. Ne vous découragez pas si une technique semble moins performante dans une situation donnée. L'important est d'avoir une palette d'options à disposition et de savoir comment les déployer efficacement pour reprendre le contrôle de votre réaction face à l'inconfort des espaces confinés. L'exploration de ces différentes méthodes vous permettra de développer votre résilience.

## Chapitre 4

-----

### Construire un plan d'exposition progressive

#### Pourquoi l'exposition brutale aggrave votre phobie (et comment faire autrement)

Vous comprenez les risques de l'exposition non graduée et les principes de l'exposition progressive pour des résultats durables. L'idée que s'exposer à une situation redoutée de manière intense et soudaine puisse guérir une phobie est une illusion dangereuse qui peut avoir l'effet inverse. Au lieu de réduire votre peur, une confrontation brutale et mal préparée risque de la renforcer de manière significative, créant une association encore plus négative avec l'espace confiné. Votre cerveau enregistre alors cette expérience comme une confirmation supplémentaire de la dangerosité de la situation, rendant les tentatives futures encore plus difficiles.

La méthode éprouvée pour surmonter la claustrophobie repose sur le principe de l'exposition progressive. Il s'agit d'une approche graduelle qui consiste à vous confronter à des situations anxiogènes par étapes successives, en commençant par celles qui suscitent une réaction de peur minimale et en progressant lentement vers celles qui sont plus intimidantes. Ce processus permet à votre système nerveux de s'habituer progressivement à la stimulation perçue comme menaçante, sans être submergé par elle. En contrôlant le rythme et l'intensité de l'exposition, vous donnez à votre cerveau le temps d'apprendre que la situation n'est pas réellement dangereuse, ce qui conduit à une diminution durable de la réponse anxieuse.

Cette méthode, souvent appelée désensibilisation systématique, agit en vous permettant de revivre des situations redoutées dans un environnement sûr et contrôlé. À chaque palier franchi, votre corps et votre esprit apprennent que la réaction de panique n'est pas nécessaire et que vous pouvez gérer la situation. Les techniques que vous avez apprises pour désamorcer une crise, comme la respiration diaphragmatique ou l'ancrage sensoriel, jouent un rôle crucial dans ce processus. Elles vous fournissent des outils immédiats pour vous aider à traverser chaque étape avec plus de sérénité, évitant ainsi de laisser l'anxiété prendre le dessus et saboter votre

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
progression.

Il est essentiel de comprendre que cette approche demande de la patience et de la persévérance. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur d'un coup, mais plutôt de la transformer progressivement en un inconfort gérable. En évitant l'exposition brutale, vous protégez votre bien-être émotionnel et vous augmentez vos chances de succès à long terme. Le risque est de penser qu'une confrontation directe et intense va résoudre le problème, alors qu'elle ne fait souvent que le cristalliser. L'exposition progressive, quant à elle, est la voie la plus sûre et la plus efficace pour déconstruire durablement les mécanismes de la claustrophobie. Cette stratégie vous permet de reprendre le contrôle, pas à pas, sur les situations qui vous enferment.

L'idée d'entrer volontairement dans un ascenseur bondé pour 'voir ce qui se passe' lui parut une folie. Elle se souvint des conseils : l'exposition progressive, pas la confrontation brutale. Si elle essayait d'affronter directement les situations les plus difficiles, elle risquait de renforcer sa peur et de confirmer à son cerveau que les espaces clos étaient une menace intolérable. Il fallait plutôt construire patiemment sa tolérance, une étape à la fois.

## Créer votre échelle d'anxiété personnelle : de 0 à 10, où se situent vos limites ?

Vous allez construire une échelle personnelle d'anxiété pour évaluer vos progrès et ajuster vos paliers d'exposition. Cette échelle, allant de 0 à 10, vous permettra de quantifier objectivement votre ressenti face à chaque situation redoutée. Zéro représente l'absence totale de peur ou d'inconfort, tandis que dix symbolise le pic de votre anxiété, le moment où vous ressentirez le besoin irréprensible de fuir. L'objectif est d'apprendre à associer des niveaux d'anxiété spécifiques à des situations précises, rendant ainsi le processus d'exposition plus concret et mesurable.

Pour créer cette échelle, commencez par lister les situations liées à votre claustrophobie que vous avez identifiées précédemment. Pour chaque situation, attribuez un chiffre de 0 à 10 en fonction de l'intensité de la peur ou de l'inconfort qu'elle vous procure. Par exemple, passer devant un ascenseur sans le prendre pourrait correspondre à un niveau 1 ou 2. Rester immobile devant les portes ouvertes d'un ascenseur pourrait être un 3 ou 4. Monter dans un ascenseur vide avec les portes qui se referment pourrait atteindre un 5 ou 6. Il est crucial que cette évaluation soit honnête et reflète fidèlement vos sensations.



Utilisez cette échelle pour débiter votre plan d'exposition. Vous commencerez par des situations associées aux niveaux d'anxiété les plus bas, généralement entre 1 et 3. Ces premiers paliers doivent être suffisamment confortables pour que vous puissiez les réaliser sans déclencher une réponse de panique intense. L'idée est de vous habituer progressivement à l'idée d'affronter la situation, en vous concentrant sur votre respiration et en utilisant les techniques de gestion du stress apprises précédemment. L'objectif n'est pas de supprimer complètement l'anxiété, mais de la maintenir à un niveau gérable.

Thomas utilise cette échelle pour hiérarchiser ses expositions. Il note que regarder les photos d'ascenseurs le place à un 2/10, monter à pied jusqu'au troisième étage d'un immeuble se situe à 3/10, et rester devant les portes d'un ascenseur fermé est un 4/10. Il utilise cette gradation pour construire une série d'étapes d'exposition courtes et réalisables, débutant systématiquement par les niveaux les plus bas pour ne pas le submerger. Cette méthode lui permet de suivre objectivement ses progrès et de célébrer chaque petite victoire. En utilisant des chiffres concrets, il rend son parcours moins abstrait et plus motivant, facilitant l'adaptation de son exposition à mesure qu'il gagne en assurance.

Pour l'exercice du jour, Claire devait rester trente secondes dans la salle de bain, porte fermée, mais non verrouillée. Elle s'était noté une anxiété de 3/10 avant d'entrer. Elle inspira profondément, se concentrant sur la sensation de l'air frais sur sa peau. Les trente secondes passèrent, et à sa sortie, elle se nota 2/10. Ce petit succès, cette descente d'un point sur son échelle personnelle, était la preuve concrète que sa réaction était maîtrisable.

### Concevoir vos paliers : comment passer de "je panique" à "je gère" sans sauter d'étapes

Vous élaborerez des paliers réalistes et progressifs pour élargir votre zone de confort sans risque de rechute. Ces étapes doivent être conçues pour maintenir votre niveau d'anxiété à un seuil gérable, idéalement entre 3 et 5 sur votre échelle personnelle. L'objectif n'est pas de provoquer une panique intense, mais de confronter votre corps et votre esprit à des situations légèrement inconfortables, de manière répétée, jusqu'à ce qu'elles ne suscitent plus de réaction d'alerte. Un palier réussi est une situation que vous pouvez endurer pendant plusieurs minutes sans être submergé, en utilisant éventuellement les techniques de respiration ou d'ancrage apprises précédemment.

La conception de ces paliers commence par l'identification de petites variations d'une situation déclencheuse. Par exemple, si votre déclencheur principal est l'ascenseur, un premier palier pourrait consister à vous tenir juste devant la porte ouverte pendant quelques secondes, en vous concentrant sur votre respiration. Une fois que cette étape ne provoque plus qu'une légère appréhension (un 2 ou 3 sur votre échelle), vous pouvez passer au suivant : entrer dans la cabine avec les portes ouvertes, puis fermer les portes sans que l'ascenseur ne bouge, et ainsi de suite. Chaque progression doit être graduée, en introduisant un seul nouvel élément de difficulté à la fois.

Le prochain palier consistait à rester dans l'ascenseur, avec la porte qui se ferme, mais sans monter. Claire s'était fixé une limite d'anxiété à 4/10. Elle entra, la porte se referma. Son cœur accéléra légèrement. Elle se concentra sur sa respiration, se rappelant que la porte était prête à s'ouvrir. Quand elle sentit l'anxiété monter à 4, elle sortit. Ce n'était pas une défaite, mais une étape validée. L'important était de rester dans la zone de malaise contrôlé pour apprendre la sérénité.

Il est crucial de ne pas brûler les étapes. Si un palier vous semble trop difficile ou provoque une anxiété excessive, n'hésitez pas à revenir à un niveau inférieur ou à passer

plus de temps à consolider l'étape actuelle. L'important est la régularité et la constance, plutôt que la rapidité. Les situations que vous choisirez pour vos paliers doivent être accessibles et contrôlables dans un premier temps. Par exemple, rester quelques instants dans une cabine d'ascenseur vide au rez-de-chaussée est un excellent point de départ avant d'envisager un trajet en étage avec plusieurs personnes.

Chaque fois que vous atteignez un nouveau palier et parvenez à y rester sans paniquer, cela renforce la conviction de votre cerveau que ces situations ne représentent pas un danger réel. Ce processus graduel permet de modifier les associations neurales qui sous-tendent votre peur, remplaçant l'alerte par une sensation de maîtrise et de sécurité progressive. Pensez à célébrer chaque petite victoire, car elles construisent la confiance nécessaire pour affronter les défis plus importants. L'exposition est un marathon, pas un sprint ; la patience et la persévérance sont vos meilleurs atouts.

### Gérer les rechutes : pourquoi elles sont normales et comment les surmonter sans abandonner

Gérer les rechutes : pourquoi elles sont normales et comment les surmonter sans abandonner.

Une rechute dans les manifestations de votre anxiété n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une partie intégrante du processus d'apprentissage et d'adaptation. Le cerveau, habitué à réagir par la peur face à certains environnements, peut momentanément réactiver ces schémas appris, même après une période de succès. Comprendre que ces régressions temporaires sont normales vous permettra de ne pas vous décourager et de maintenir votre engagement dans votre plan.

Lorsque vous rencontrez une situation qui réactive votre anxiété, la première étape consiste à reconnaître que cela fait partie du parcours. Au lieu de vous critiquer ou de penser que tout est perdu, accueillez cette réaction comme une information utile. Elle peut indiquer qu'un palier particulier doit être abordé avec plus de douceur, ou que vous avez peut-être été trop vite dans votre progression. L'important est de ne pas voir cela comme une preuve de votre incapacité, mais comme une invitation à ajuster votre approche.

L'une des stratégies clés pour surmonter une rechute consiste à revenir à des techniques familières qui vous ont aidé par le passé. Si vous avez appris à utiliser des exercices de respiration ou des techniques d'ancrage, réappliquez-les immédiatement lorsque vous sentez l'anxiété monter. Ces outils vous aideront à réguler votre

système nerveux et à retrouver un état de calme relatif, même si la situation initiale vous paraît toujours aussi difficile.

Surprise par un retard de train inattendu, Claire se retrouva dans un wagon particulièrement bondé. Les anciennes sensations de panique commencèrent à refaire surface, son anxiété remontant à 7/10. Au lieu de céder à la panique, elle s'autorisa à revenir mentalement au palier précédent où elle se sentait plus à l'aise. Elle se rappela que ce n'était qu'un contretemps, et qu'elle avait les outils pour gérer cette montée, même si cela impliquait de ne pas atteindre son objectif du jour.

Si une rechute survient, il est souvent bénéfique de revenir au palier d'exposition précédent qui était bien maîtrisé. Cela ne signifie pas que vous recommencez tout à zéro, mais plutôt que vous consolidez les acquis avant de vous engager à nouveau sur des étapes plus difficiles. Ce retour en arrière est une mesure de prudence qui permet de retrouver la confiance et de prouver à votre cerveau que vous gardez le contrôle de la situation.

Il est également essentiel de vous rappeler les raisons pour lesquelles vous avez entrepris ce cheminement. Reconnaître les bénéfices que vous avez déjà obtenus et la liberté que vous avez gagnée renforcera votre

motivation à persévérer. Une rechute peut être l'occasion de réaffirmer votre engagement envers vos objectifs, en considérant ce moment difficile comme une étape temporaire et non comme un retour définitif à votre état précédent.

## Intégrer les techniques de crise dans votre plan : comment ne pas dépendre d'un seul outil

Vous apprendrez à combiner les outils du chapitre 3 avec vos paliers d'exposition pour une approche globale et résiliente. Intégrer les techniques de gestion de crise dans votre plan d'exposition signifie non pas compter sur un seul outil, mais savoir mobiliser plusieurs ressources simultanément ou alternativement, selon les contraintes de chaque situation anxiogène. Par exemple, si vous êtes dans un ascenseur et que vous commencez à ressentir une tension, votre première réaction peut être de vous concentrer sur votre respiration diaphragmatique. Si cette tension persiste malgré vos efforts, vous pouvez ensuite faire appel à l'ancrage sensoriel en identifiant cinq objets que vous pouvez voir dans l'habitacle, en touchant la texture de votre vêtement, ou en écoutant les sons ambiants sans jugement. Cette combinaison renforce votre capacité à rester présent dans la situation et à éviter la montée de la panique.

Ce matin, avant de prendre le bus, Claire fit quelques exercices de cohérence cardiaque. Arrivée à l'arrêt, elle s'assura de pouvoir attraper le premier bus qui arrivait sans devoir courir. Une fois dedans, elle remarqua la proximité des passagers. Elle activa sa respiration diaphragmatique, puis s'ancra en observant le paysage défiler par la fenêtre. Si une pensée anxiogène surgissait, elle savait qu'elle pouvait la restructurer, combinant ainsi plusieurs outils pour naviguer sereinement dans cette situation.

Cette stratégie multifacette est particulièrement efficace lorsque vous êtes confronté à des environnements où l'une des techniques pourrait être limitée. Dans un IRM, par exemple, où la mobilité est restreinte et le champ visuel limité, la respiration et la cohérence cardiaque deviennent vos alliées principales, complétées par la restructuration cognitive pour contrer les pensées envahissantes. Dans un train bondé, où l'espace est limité mais où vous pouvez observer, toucher et entendre votre environnement, vous avez une plus grande latitude pour utiliser l'ancrage sensoriel. Savoir naviguer entre ces différentes méthodes vous donne une confiance accrue, car vous disposez d'un répertoire d'actions plutôt que d'une seule parade. Cette polyvalence vous permet de réagir de manière appropriée et graduée, en escaladant



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
ou en utilisant les techniques adéquates en fonction de  
l'intensité de votre ressenti.

Lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui déclenche votre anxiété, plutôt que de vous concentrer uniquement sur l'absence de la peur, adoptez une approche proactive. Cela peut signifier que vous vous engagez consciemment dans une respiration profonde avant même d'entrer dans l'ascenseur, puis, une fois à l'intérieur, vous utilisez une technique d'ancrage pour vous connecter à votre environnement immédiat. Si vous sentez une montée d'angoisse, engagez votre dialogue intérieur pour évaluer vos pensées et les restructurer. Cette approche intégrée transforme les outils de gestion de crise en une composante essentielle de votre exposition, transformant le passage d'une situation redoutée en une expérience où vous êtes actif dans la régulation de votre état. Vous ne subissez plus la peur, vous la gérez en mobilisant un ensemble de stratégies apprises.



## Chapitre 5

-----

### Pérenniser ses progrès et prévenir les rechutes

Pourquoi vos progrès peuvent s'estomper  
(et comment les ancrer dans la durée)

Vos progrès dans la gestion de la claustrophobie ne sont pas définitifs par nature, mais le résultat d'un engagement continu. Il est fréquent que les acquis s'estompent si les exercices et les nouvelles habitudes ne sont pas entretenus. Le cerveau, habitué à associer certains espaces à un danger, peut réactiver cette association si l'exposition régulière cesse. Pour ancrer vos acquis sur le long terme, il est donc essentiel de continuer à intégrer des situations qui sollicitent vos compétences nouvellement acquises, même lorsqu'elles ne provoquent plus de détresse intense. Cette pratique assidue permet de créer de nouvelles associations plus positives et moins

dangereuses, délogeant ainsi les anciennes réponses de survie.

L'extinction de la peur est un processus qui demande un entretien régulier. Si vous cessez d'utiliser les techniques acquises, l'association initiale entre l'espace confiné et le danger peut refaire surface, surtout si des situations de stress ou d'anxiété plus générales surviennent. Maintenir une pratique régulière, même légère, est la clé pour que ces nouvelles réponses deviennent automatiques et stables. L'acquisition d'une nouvelle réponse plus adaptée est comparable à l'apprentissage d'une nouvelle langue : sans pratique, elle risque de s'effacer.

Pour intégrer cet entretien dans votre quotidien, vous pouvez continuer à vous exposer régulièrement à des situations autrefois redoutées, mais désormais gérables. Il ne s'agit pas de provoquer la panique, mais de maintenir une familiarité avec ces environnements. Par exemple, prenez régulièrement l'ascenseur, même pour un seul étage, ou empruntez des transports en commun à des heures moins fréquentées. Ces petites actions régulières renforcent votre sentiment de sécurité et consolident les nouvelles connexions neuronales créées lors de votre phase d'exposition.

Claire avait depuis longtemps dépassé la peur des

ascenseurs. Pourtant, elle continua de prendre l'escalier une fois par semaine, juste pour maintenir cette aisance nouvelle. Elle savait que si elle cessait complètement de s'exposer, même à des situations anodines, les anciennes associations de peur pourraient resurgir. La répétition douce et régulière était son assurance contre le retour de l'ancienne détresse, un entretien discret de sa liberté retrouvée.

L'entretien de vos acquis demande une vigilance active. Le cerveau humain a une tendance naturelle à conserver les associations anciennes, car elles étaient perçues comme des mécanismes de survie. Votre rôle consiste donc à créer et renforcer activement de nouvelles associations, plus positives et moins menaçantes, par une pratique assidue. Cela peut impliquer, par exemple, de pratiquer des exercices de respiration ou d'ancrage sensoriel avant d'entrer dans un espace potentiellement anxiogène, même lorsque vous vous sentez calme. Le maintien d'une routine de ces pratiques préventives est aussi important que l'application des techniques lors d'une crise.

## La fréquence idéale pour vos exercices : comment éviter l'abandon prématuré

Maintenir des progrès dans la gestion de votre

claustrophobie demande un équilibre subtil entre la régularité des expositions et le risque de surmenage. Il ne s'agit pas de revenir aux situations les plus anxiogènes de manière trop fréquente, ce qui pourrait réactiver votre tension, ni de les espacer trop pour que les nouvelles associations positives ne s'ancrent pas. La clé réside dans une fréquence qui vous permet de réaffirmer votre nouvelle relation avec les espaces confinés sans que cela ne devienne une corvée ou une source d'épuisement.

Il est essentiel de trouver un rythme qui maintienne l'efficacité de vos exercices sans compromettre votre bien-être général. Pensez à cela comme à l'entretien d'une nouvelle habitude. Si vous cessez de l'entretenir, elle risque de s'éroder. Les nouvelles connexions neuronales que vous avez patiemment construites ont besoin d'être renforcées pour devenir automatiques et durables, remplaçant ainsi les anciennes voies neuronales associées à la panique.

Pour la plupart des personnes, une exposition courte mais régulière est plus bénéfique qu'une longue exposition occasionnelle. Cela signifie que répéter une expérience qui vous rendait anxieux il y a quelques mois, mais qui est maintenant gérable pour vous, une ou deux fois par semaine peut suffire à consolider vos acquis. L'important est de ne pas laisser trop de temps s'écouler entre ces

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

moments de réaffirmation de votre capacité à gérer la situation.

Elle s'autorisa désormais à monter dans des ascenseurs jusqu'au cinquième étage, un niveau d'anxiété autour de 2/10. Mais elle ne cherchait pas à aller plus loin chaque jour. Parfois, elle se contentait de monter au troisième. Cette constance, cette régularité dans l'exposition à des niveaux d'anxiété bas et maîtrisables, était la clé. Elle solidifiait les nouvelles voies neuronales, rendant l'expérience de l'ascenseur de plus en plus neutre, plutôt que de viser un exploit ponctuel qui aurait pu créer de la pression inutile.

L'objectif n'est pas de provoquer une forte anxiété à chaque fois, mais plutôt de maintenir une exposition à des niveaux d'anxiété faibles à modérés. Cela vous permet de continuer à pratiquer les techniques apprises en chapitre 3 et de renforcer votre sentiment de contrôle et de sécurité dans ces contextes. Une exposition réussie, même courte, crée une association positive qui contrecarre les anciennes réactions de peur.

En résumé, visez une fréquence qui vous permet de pratiquer vos expositions sans vous sentir submergé. Cela pourrait signifier quelques minutes dans un ascenseur chaque semaine, ou une brève période dans une voiture

avec les portes fermées. L'assiduité est votre meilleure alliée pour pérenniser les progrès accomplis et éviter de retomber dans les schémas d'évitement qui ont alimenté votre phobie par le passé.

### Ajuster vos paliers : quand et comment monter en difficulté sans risque

Vous saurez évaluer objectivement votre niveau d'aisance face à une situation autrefois redoutée, ce qui vous permettra d'ajuster la difficulté de vos exercices. La progression doit rester constante, mais sans précipitation excessive pour ne pas fragiliser vos acquis. Il s'agit de consolider les nouvelles connexions neuronales qui remplacent progressivement les schémas de peur anciens par des associations plus sereines. Ignorer cette étape ou, à l'inverse, vouloir aller trop vite, peut conduire à un sentiment de découragement ou à une rechute, car le cerveau aura du mal à intégrer les changements attendus.

L'ajustement consiste à observer attentivement votre ressenti avant, pendant et après chaque exposition. Si une situation devient routinière et ne génère plus qu'une anxiété minime, c'est le signe qu'il est temps de légèrement augmenter la difficulté. Cela peut se traduire par une durée plus longue, une distance plus courte avec le déclencheur, ou l'ajout d'un élément précédemment



e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

redouté, mais mineur. L'objectif n'est pas de rechercher l'inconfort, mais de maintenir un léger défi qui stimule l'apprentissage et renforce votre confiance en votre capacité à gérer la situation.

L'augmentation de la difficulté ne signifie pas un saut dans le vide. Par exemple, si vous êtes à l'aise dans un ascenseur vide, vous pourriez essayer un ascenseur avec une autre personne, puis avec deux, ou encore envisager un trajet légèrement plus long. Chaque petit pas réussi est une victoire qui renforce votre sentiment d'auto-efficacité. Il est essentiel de rester à l'écoute de vos propres signaux et de ne pas vous comparer aux autres. Ce qui est un ajustement mineur pour une personne peut être un grand pas pour une autre, et vice-versa.

Lorsqu'elle sentit que le fait de rester dans une cabine d'ascenseur pendant une minute devenait presque trop facile, Claire décida d'ajouter un petit défi : ouvrir son livre et lire quelques pages. Si l'anxiété montait à 3/10, elle savait qu'elle pouvait revenir à sa respiration. Ce léger ajustement de la difficulté, ce pas supplémentaire dans l'inconfort contrôlé, était essentiel pour continuer à faire progresser ses acquis neuronaux sans provoquer une rechute par excès de confiance ou de sous-estimation.

Si une tentative d'augmentation de difficulté génère une

anxiété trop intense, il ne faut pas le voir comme un échec, mais comme une indication qu'il faut temporairement revenir à un palier précédent, voire en créer un intermédiaire. La persévérance est importante, mais la sagesse consiste à adapter son plan face aux réalités de votre propre système de réponse à la peur. L'important est de continuer à avancer, même lentement, en s'assurant que chaque étape consolide votre confiance plutôt qu'elle ne la fragilise.

### Impliquer votre entourage : comment communiquer vos besoins sans surprotection

Demander le soutien de votre entourage est une étape importante pour pérenniser vos progrès, car une communication claire peut transformer leur perception et leur comportement vis-à-vis de votre claustrophobie. Il ne s'agit pas de les solliciter pour qu'ils gèrent votre anxiété à votre place, mais de les informer de manière constructive sur ce qui vous aide et ce qui vous dessert. Expliquez-leur, sans entrer dans les détails techniques complexes, que vous travaillez sur des exercices progressifs pour surmonter votre peur. Précisez que leur rôle est de respecter votre espace et votre rythme, sans vous pousser de manière abrupte ni, à l'inverse, vous surprotéger au point de vous empêcher de pratiquer.

Le piège de la surprotection est particulièrement insidieux, car il naît souvent d'une intention louable de vous épargner de la souffrance. Cependant, cela entretient le mécanisme d'évitement et vous empêche de vous confronter aux situations, même de manière contrôlée. Par exemple, si un proche insiste pour prendre systématiquement les escaliers avec vous, même quand vous vous sentez prêt à emprunter l'ascenseur, cela renforce votre dépendance et limite votre autonomie. Vous pouvez donc leur demander explicitement de ne pas anticiper vos besoins ou de prendre des décisions à votre place concernant les espaces confinés.

Son ami Marc savait désormais qu'il ne devait pas proposer de prendre l'escalier systématiquement quand ils devaient monter à un étage élevé. Il savait aussi qu'il ne devait pas insister si Claire disait 'pas aujourd'hui'. Il était devenu un allié précieux, capable de lui rappeler doucement de respirer ou de se concentrer sur un détail extérieur, sans jamais la surprotéger. Sa présence bienveillante et informée était un soutien discret mais fondamental dans le maintien de sa liberté retrouvée.

Il est tout aussi crucial de les encourager à vous laisser appliquer les stratégies que vous avez apprises, y compris les techniques de respiration ou d'ancrage, sans

interruption ni jugement. Si, par exemple, vous pratiquez la respiration diaphragmatique dans une voiture aux portes fermées, indiquez-leur que vous avez besoin de vous concentrer et que leur présence bienveillante suffit, sans commentaires ni questions intempestives. Leur soutien actif, par l'écoute et le respect de votre processus, contribue à créer un environnement sécurisant pour vos expositions.

L'objectif n'est pas de vous isoler, mais de créer une dynamique où votre entourage devient un allié informé plutôt qu'une source involontaire de maintien de votre phobie. Communiquer ouvertement sur vos avancées, vos difficultés ponctuelles et vos besoins lors des expositions renforce la confiance mutuelle. Ils pourront ainsi mieux comprendre pourquoi vous avez besoin de temps, pourquoi vous faites certains exercices, et comment leur attitude peut faciliter ou compliquer votre cheminement.

N'hésitez pas à leur suggérer des actions concrètes, comme vous accompagner sans pression, vous attendre patiemment à la sortie d'un ascenseur, ou simplement être présent sans intervention active pendant une courte exposition. L'idée est de construire une compréhension partagée qui nourrit votre propre auto-efficacité, renforçant ainsi votre capacité à gérer la situation de manière autonome. Cette communication ouverte et bienveillante

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

crée un écosystème de soutien adapté à vos besoins évolutifs.

## Quand consulter un professionnel : les signes qui ne trompent pas

Comprendre que le soutien de votre entourage est une ressource précieuse, mais qu'il doit être orienté vers votre autonomie, est crucial pour pérenniser vos progrès. Il est essentiel de leur expliquer clairement vos besoins précis, en évitant le piège de la surprotection qui, bien qu'animée par de bonnes intentions, peut involontairement renforcer les mécanismes d'évitement que vous cherchez à démanteler. Par exemple, si vous devez affronter une situation redoutée, comme monter dans un escalier mécanique, demandez à votre proche de vous accompagner sans vous tenir le bras, vous laissant ainsi l'espace pour appliquer vos techniques de respiration ou d'ancrage sensoriel.

Votre entourage peut jouer un rôle actif en vous encourageant à appliquer les stratégies apprises sans interruption ni jugement, agissant ainsi comme un renforcement positif de votre confiance en vos capacités. En observant que vous parvenez à surmonter une situation, même mineure, grâce à vos efforts, et en étant témoin de ce succès, ils valident concrètement votre

progression. L'ami qui vous accompagne dans un ascenseur et vous dit "Tu vois, tu as réussi ! C'est comme cela que l'auto-efficacité se construit" est un soutien d'une grande valeur, bien plus que celui qui vous proposerait de toujours prendre les escaliers.

Il est également utile de leur enseigner la manière dont ils peuvent vous aider à identifier les éléments sensoriels pertinents à utiliser pour l'ancrage dans une situation donnée. Par exemple, lors d'une promenade dans un parc, ils pourraient suggérer de vous concentrer sur le bruit du vent dans les arbres, ou sur la texture du tissu de votre vêtement lorsque l'anxiété monte dans une file d'attente. Cette implication active permet de transformer leur rôle de simple accompagnateur en celui d'un partenaire éclairé dans votre parcours.

Cette démarche de communication construira une compréhension mutuelle et renforcera votre sentiment d'auto-efficacité. En expliquant vos besoins de manière transparente, vous leur montrez que vous êtes acteur de votre changement et que vous cherchez à gagner en indépendance. Il est important qu'ils comprennent que votre objectif est de retrouver une mobilité sereine, et non de dépendre d'une aide constante.

Ce soutien bienveillant, lorsqu'il est bien orienté, évite de

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté

créer de nouvelles situations d'évitement dans votre quotidien. Par exemple, un proche qui refuserait de vous accompagner dans un lieu public par peur de votre réaction, vous priverait d'une opportunité d'exercer vos techniques dans cet environnement précis, limitant ainsi votre exposition graduelle. L'objectif est qu'ils deviennent des alliés informés, vous aidant à pratiquer vos stratégies, plutôt que des protecteurs qui maintiendraient involontairement votre phobie.

Claire expliquait à sa sœur comment, lors d'un passage dans un tunnel, elle pouvait se concentrer sur la couleur des lumiottes de sécurité le long de la paroi, ou sur le son du moteur de la voiture. Elle lui montrait qu'il ne s'agissait pas d'ignorer la situation, mais de trouver des ancrages qui rendaient l'expérience plus supportable. L'encouragement de sa sœur à appliquer ces stratégies, sans jamais la pousser au-delà de ses limites, renforçait cette capacité nouvelle à naviguer dans des espaces confinés, une autonomie patiemment construite.





# Conclusion

-----

Vous avez désormais acquis une compréhension approfondie des mécanismes neurologiques qui sous-tendent vos réactions de peur face aux espaces clos. Vous savez que votre système nerveux déclenche automatiquement une réponse d'alarme héritée de l'évolution biologique face à une menace perçue, même lorsque celle-ci n'existe pas objectivement dans l'environnement immédiat. Cette connaissance théorique constitue la base indispensable qui vous permet de distinguer une véritable urgence vitale d'une activation inappropriée de votre corps. Vous comprenez que la sensation d'étouffement provient de l'hyperventilation et non d'un manque réel d'oxygène, que l'accélération cardiaque prépare vos muscles à une action qui ne sera pas nécessaire, et que la tension générale résulte d'un mécanisme de survie mal calibré. Vous avez appris à reconnaître les signaux subtils qui précèdent la crise, à identifier vos déclencheurs personnels spécifiques, qu'ils concernent l'enfermement physique, l'impossibilité de fuite

## Conclusion

immédiate ou la perte de contrôle sur la situation. Vous disposez désormais d'une cartographie précise de vos situations anxiogènes, hiérarchisées selon une échelle personnelle de zéro à dix, ce qui transforme une appréhension diffuse et paralysante en données concrètes, mesurables et gérables étape par étape.

Vous maîtrisez par ailleurs plusieurs techniques validées scientifiquement pour désamorcer une crise en temps réel lorsqu'elle survient. La respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque avec son protocole spécifique de trois temps pour six temps de respiration sur cinq minutes, l'ancrage sensoriel par les cinq sens et la restructuration cognitive vous offrent un répertoire varié d'actions immédiates. Vous savez adapter ces outils selon le contexte environnemental, qu'il s'agisse d'un ascenseur immobilisé entre deux étages, d'un transport en commun particulièrement bondé ou d'une pièce dont la porte se ferme derrière vous. Vous avez compris comment construire un plan d'exposition progressive, en élaborant des paliers réalistes qui maintiennent votre anxiété à un niveau gérable, généralement entre trois et cinq sur votre échelle personnelle, sans provoquer de pic de panique qui renforcerait les associations négatives. Vous savez que l'élargissement de votre zone de confort passe par la répétition contrôlée, la consolidation des nouvelles associations neuronales et la désensibilisation

e : la méthode pour ne plus paniquer en espace clos, gérer votre anxiété et retrouver votre liberté  
systématique aux situations redoutées.

Enfin, vous disposez des stratégies nécessaires pour pérenniser ces acquis sur le long terme, maintenir une pratique régulière sans tomber dans l'épuisement, gérer les rechutes inévitables comme des étapes normales d'apprentissage plutôt que des échecs définitifs, ajuster la difficulté des exercices selon votre niveau d'aisance actuel et communiquer clairement vos besoins à votre entourage pour éviter la surprotection qui risquerait d'entretenir les mécanismes d'évitement. Vous savez informer vos proches des exercices progressifs que vous entreprenez et leur apprendre à devenir des alliés informés plutôt que des sources de maintien involontaire de votre phobie. L'ensemble de ces connaissances et de ces capacités pratiques vous permet de transformer progressivement une peur qui paralysait votre mobilité quotidienne et limitait vos déplacements professionnels ou médicaux en une série d'étapes progressives, précises et maîtrisables. Vous n'avez pas besoin d'attendre une solution magique ni de dépendre en permanence d'un accompagnement thérapeutique pour avancer concrètement et retrouver une liberté de mouvement apaisée.

La progression proposée tout au long de cet ouvrage suit une logique rigoureuse d'entonnoir, passant méthodiquement des fondements universels à une

## Conclusion

application strictement personnalisée et adaptée à votre quotidien spécifique. Vous avez commencé par saisir les mécanismes neurobiologiques communs à tous les êtres humains, cette réponse de survie ancestrale qui se manifeste par l'accélération cardiaque, la tension musculaire et l'hyperventilation face aux espaces confinés interprétés comme menaçants. Cette compréhension des réactions physiologiques involontaires et du cycle peur-évitement-renforcement constitue la base sur laquelle tout le reste s'appuie, car elle déculpabilise votre expérience subjective et permet de distinguer clairement l'activation de l'alarme interne du danger réel et objectif. Sans cette compréhension préalable, toute application technique risquerait de rester mécanique et inefficace face aux résistances inconscientes.

Vous êtes ensuite passé à la phase d'urgence immédiate, aux techniques concrètes qui désamorcent la crise lorsqu'elle survient sans préparation. Cette phase intermédiaire était essentielle pour vous donner des outils d'intervention rapide avant même d'aborder la résolution thérapeutique à long terme, vous offrant ainsi un sentiment de sécurité immédiate indispensable pour oser ensuite affronter les situations redoutées. Vous avez ensuite abordé l'action structurée avec la méthode d'exposition progressive validée, en passant de la théorie à la pratique systématique, de l'élaboration méticuleuse de votre

échelle d'anxiété personnelle à la construction de paliers réalistes et mesurables. Vous terminez par une adaptation complète à votre environnement quotidien, avec les stratégies de pérennisation qui ancrent les progrès dans la durée, la gestion des rechutes normales et l'implication constructive de votre entourage. Cette séquence cumulative et progressive assure que chaque nouvelle étape s'appuie solidement sur les acquis précédents, créant une cohérence entre la compréhension intellectuelle des mécanismes, la gestion émotionnelle immédiate des crises et la transformation comportementale durable de vos habitudes.

Votre prochaine étape commence immédiatement dès la fermeture de cet ouvrage. Identifiez une seule situation anxiogène de faible intensité parmi celles que vous avez cataloguées, celle qui provoque chez vous une appréhension légère sans risque de vous submerger complètement, par exemple rester quelques minutes dans une pièce familière avec la porte fermée ou vous installer dans un espace restreint que vous maîtrisez totalement comme votre véhicule personnel. N'attendez pas de vous sentir entièrement prêt ni de disposer de conditions environnementales idéales qui ne surviendront probablement jamais. Appliquez à cette situation unique une technique parmi celles que vous avez découvertes et testées, que ce soit la respiration diaphragmatique

## Conclusion

profonde, l'ancrage sensoriel par le toucher ou l'audition, ou une brève restructuration cognitive questionnant la réalité objective du danger perçu. Ne visez aucune performance particulière, aucune maîtrise parfaite immédiate, contentez-vous d'observer avec attention bienveillante ce qui se passe dans votre corps et votre esprit sans porter de jugement sur votre réaction.

Notez ensuite vos observations dans un carnet dédié à cet usage, en décrivant avec précision le niveau d'anxiété ressenti avant, pendant et après l'exercice, ainsi que les sensations corporelles spécifiques, les pensées automatiques qui ont traversé votre esprit et les éléments sensoriels qui vous ont aidé à vous ancrer si vous en avez utilisé. Cette documentation écrite objective constitue la matière première indispensable pour construire votre premier palier d'exposition structuré selon les méthodes décrites précédemment. Transposez ensuite ces observations vers la démarche progressive exposée dans le chapitre consacré à l'exposition pour établir définitivement votre échelle personnelle et définir vos premiers objectifs concrets et mesurables. Rappelez-vous constamment que les progrès authentiques exigent un engagement actif soutenu et une démarche progressive qui ne se construit pas en quelques jours ou semaines mais sur des mois d'application régulière. Les résultats obtenus varient considérablement selon les individus et

l'efficacité des méthodes présentées demeure partielle et soumise à votre implication personnelle. Ce livre ne se substitue en aucun cas à un suivi psychologique ou médical si votre situation présente une gravité clinique ou si des traumatismes complexes émergent durant votre pratique. Si vous ressentez des difficultés majeures qui dépassent votre capacité de gestion autonome, consultez sans délai un professionnel qualifié en thérapies comportementales et cognitives. L'autonomie que vous développez progressivement s'appuie sur une pratique régulière, même modérée, et une vigilance constante pour maintenir les nouvelles associations positives et éviter la réactivation des anciens schémas de peur qui risqueraient de réduire vos acquis.