




离散数学

Discrete Mathematics

第十讲：数学归纳法与递归结构

吴楠

南京大学计算机科学与技术系


2022 年 3 月 21 日



前情提要



- 整数的性质
- 整数的基本运算
- 质数
- Euler 函数与 Euler 定理





本讲主要内容



- 数学归纳法
- 强数学归纳法
- 递归的定义
- 函数的递归结构与结构归纳法





什么是数学归纳法？



- **数学归纳法** (mathematical induction, **MI**) 是利用归纳原理进行定理证明的一种逻辑方法
- 数学归纳法的理论基础源自两个公理系统：一是在自然数的公理化系统中的**无穷公理**，二是存在于ZFC系统中的**选择公理**（等价于**良序公理**）
- 数学归纳法常用于证明有关正整数或自然数的命题



数学归纳法的逻辑基础



- 数学归纳法是建立在公理系统中的一个逻辑**演绎**推理过程：

- I. 基于皮亚诺自然数公理系统的（第一）数学归纳法

$$P(1), \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1)) \Rightarrow \forall xP(x)$$

- II. (部分)基于选择公理的强数学归纳法（完全归纳法）

$$P(1), \forall k(\forall y < k, P(y) \rightarrow P(k)) \Rightarrow \forall xP(x)$$



数学归纳法的基本证明框架




- 理论依据： $P(1), \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1)) \Rightarrow \forall xP(x)$
- 证明目标：
 - $\forall nP(n)$ ，其中 n 的论域为正整数集或自然数集
- 证明框架：
 - 奠基 (Basis)：证明 $P(1)$ 为真；
 - 归纳假设 (Inductive hypothesis, I.H.)：假设对任意正整数 k ， $P(k)$ 为真；
 - 归纳步骤 (Inductive step)：证明 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ ，即证明 $\forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))$ ；
 - 由数学归纳法，命题对任意论域中的元素均成立



选择公理*



- ZFC (Zermelo-Fraenkel set theory with Axiom of Choice) 中的公理9即为选择公理






选择公理*



- ZFC (Zermelo-Fraenkel set theory with Axiom of Choice) 中的公理9即为选择公理

Ax. 9 (AC): $\forall S \left(\emptyset \notin S \rightarrow (\exists f: S \rightarrow \cup S) \left((\forall S_i \in S) (f(S_i) \in S_i) \right) \right)$





选择公理*



- ZFC (Zermelo-Fraenkel set theory with Axiom of Choice) 中的公理9即为选择公理
- $ZF + AC$ (即 ZF 与 AC 逻辑相容： $\neg(ZF \rightarrow \neg AC)$, K. Gödel, 1939) 即, ZFC逻辑相容
- $ZF + \neg AC$ (若 ZF 是逻辑相容的, 则： $ZF \rightarrow \neg AC$, P. Cohen, 1963) 即, ZF¬C逻辑相容
- 因此：选择公理AC独立于ZF系统



数学归纳法有效性的逻辑证明



■ 超限归纳法与ZFC 集合系统

- ZFC的系统公理中包含良序公理（等价于选择公理）：

对任一集合 X ，总存在一个表序的二元关系 R 。即：

Ax. 9 (AC^{*}): $\forall X \exists R (R \text{ well-orders } X)$

- 正整数集合上的良序公理：正整数集合上的任一非空子集皆含有一个最小元（即最小的整数）
- 良序公理普遍被认为是良序集合存在的逻辑基础，因此若不承认良序公理一般应避免使用（超限）归纳法



数学归纳法有效性的逻辑证明（续）



- 以下用归谬法证明数学归纳法在ZFC下依然有效：
- **证明**：假设在数学归纳法框架下 $\forall xP(x)$ 不成立，即 $\exists n(\neg P(n))$ 。令集合 $S = \{n \in \mathbb{Z}^+ | \neg P(n)\}$ ， S 是非空子集。根据ZFC的良序公理，集合 S 存在最小元，记为 m 。 $\because$ **$P(m)$ 不成立**，由数学归纳法的框架， $m \neq 1$ ，但由于 $(m-1) \notin S$ ，故 $P(m-1)$ 成立。根据数学归纳法的框架中的归纳过程， **$P(m)$ 成立**：矛盾！由归谬法， $\forall xP(x)$ 成立。 $\square$



用数学归纳法证明命题



■ 例：令 $H_k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k}$, $k \in \mathbb{Z}^+$,

证明： $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}^+$.

$P(1)$ 成立

■ 证明：奠基：对 $n = 1$, $H_{2^1} = 1 + \frac{1}{2} \geq 1 + \frac{1}{2}$ 成立：

假设 $P(k)$ 成立

I.H.: 假设对任意正整数 $k > 1$, 有 $H_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$, 则：

$P(k) \Rightarrow P(k+1)$

归纳步骤： $H_{2^{k+1}} = H_{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{2^{k+1}}} \geq$

$\left(1 + \frac{k}{2}\right) + 2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = 1 + \frac{k+1}{2}$. 由数学归纳法，命题得证. $\square$



数学归纳法证明时的常见错误



- **例1**：任意 n 个人，他们一定全部在同一天出生。
- **错误证明**：
 - Basis：当 $n = 1$ 时，只有一个人，命题显然成立；
 - I.H.：假设任意 k 个人，他们全部在同一天出生；
 - I.S.：当有 $k + 1$ 个人时（编号为 $1, 2, \dots, k, k + 1$ ），根据归纳假设，第1人至第 k 人（共 k 个人）一定在同一天出生；第2至第 $k + 1$ 人（共 k 个人）也一定在同一天出生。因此，这 $k + 1$ 人全部在同一天出生。根据数学归纳法，命题成立。□
 - 归纳基础错误：Basis应为 $P(2)$ ，但 $P(2)$ 非永真



数学归纳法证明时的常见错误 (续)



■ 例2：证明 $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$

■ 错误证明：

- Basis：当 $n = 1$ 时， $\sum_{i=1}^1 (2i - 1) = 1^2$ 命题成立；
- I.H.：假设当 $n = k$ 时 $\sum_{i=1}^k (2i - 1) = k^2$ 成立，则：
- I.S.：据等差求和公式， $\sum_{i=1}^{k+1} (2i - 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + 2(k + 1) - 1 = \frac{[1+2(k+1)-1](k+1)}{2} = (k + 1)^2$ 。根据数学归纳法，命题成立。□
- 归纳过程错误：未证明 $P(k) \rightarrow P(k + 1)$



强数学归纳法的基本证明框架



- 强数学归纳法依赖的公理体系：ZFC 集合系统
- 理论依据： $P(1), \forall k(\forall y < k, P(y) \rightarrow P(k)) \Rightarrow \forall x P(x)$
- 证明目标： $\forall n P(n)$ ，其中 n 的论域为正整数集
- 证明框架：
 - 奠基：证明 $P(1)$ 为真；
 - 归纳假设与归纳步骤：给定任意正整数 k ，证明 $P(1) \Rightarrow P(k+1)$ ， $P(2) \Rightarrow P(k+1)$ ， $\dots$ ， $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ ，即证明 $\forall k(P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k+1))$ ；
 - 由强数学归纳法，命题对任意论域中的元素均成立



强数学归纳法的简化形式



- 设 $P(n)$ 是与正整数 n 有关的陈述， x 和 y 是两个给定的整数，且 $y \leq x$ 。若能够证明以下陈述：
 - (1) $P(y), P(y+1), \dots, P(x)$ 皆为真
 - (2) 对任意 $k \geq x$, $P(y) \wedge P(y+1) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k+1)$
- 则以下陈述成立： $\forall n \geq y, P(n)$
- 显然，强数学归纳法的成立依赖于整数集的良好序性



用强数学归纳法证明命题



- **例：**证明：仅用面值4分和5分的两种邮票就可以组成12分及以上的每种邮资。

- **证明：**

$P(y), P(y+1), \dots, P(x)$ 皆为真

- **奠基：**经验证，当 $n = 12, 13, 14, 15$ 时上述命题皆成立；
- **归纳假设：**对任意自然数 $k > 15$ ，假设 $P(k)$ 为真，则：
- **归纳步骤：**当邮资为 $n = k + 1$ 时，可由邮资为 $k - 3$ 的邮票组合方法加上一张4分的邮票构成。 $\because k - 3 > 12$ ， $\therefore$ 根据归纳基础和归纳假设，邮资为 $k - 3$ 的邮票可由4分和5分邮票组合构成。根据强数学归纳法，命题得证。 $\square$



递归结构



从前有座山，山里有座庙，
庙里有个老和尚
给小和尚讲故事，讲的那是
从前有座山，
山里有座庙，
庙里有个老和尚
给小和尚讲故事
讲的那是
从前有座山...





递归结构（续）



- 命名中递归的例子：

Linux
Is
Not
Unix



递归结构（续）



■ 艺术作品中递归的例子：





递归结构 (续)



■ 艺术作品中递归的例子：





递归结构 (续)





函数的递归定义



- **定义（递归）**：在计算机科学中，递归指在函数的定义中使用函数自身的方法。良定义的递归函数一般要保证其能被还原为定义中的基础情况
- 阶乘的递归定义：
 - $\text{Fac}(0) = 1;$
 - $\text{Fac}(n) = n \cdot \text{Fac}(n - 1)$
- Fibonacci序列 $\{f_n\}$ 的递归定义：
 - $f_0 = 0, f_1 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$





集合的递归定义



■ 递归地定义集合：

- (1) **奠基**：指定一些初始元素；
- (2) **递归步骤**：给出由集合中已有元素构造新元素的规则；
- (3) **排斥规则**：限制集合中的元素仅限由步骤(1)和(2)生成

■ **例1**：正整数集合的子集 S 可以如下递归构造

- **奠基**：给定正整数 $x \in S$ ；
- **递归步骤**：若 $x \in S \wedge y \in S$ ，则 $x + y \in S$



集合的递归定义（续）



- **例2：**递归定义命题公式（即合式公式wff）
 - **奠基：**命题变元（包括T/F）为命题公式；
 - **递归步骤：**若 X 和 Y 为命题公式，则 $(\neg X)$ 、 $(X \wedge Y)$ 、 $(X \vee Y)$ 、 $(X \rightarrow Y)$ 和 $(X \leftrightarrow Y)$ 也都为命题公式；
 - **排斥规则：**命题公式仅限于此
- **例3：**递归生成字母表 Σ 上的字符串集合 Σ^*
 - **奠基：**空串 $\lambda \in \Sigma^*$ ；
 - **递归步骤：**若 $\omega \in \Sigma^* \wedge x \in \Sigma$ ，则 $\omega x \in \Sigma^*$ ；
 - **排斥规则：** Σ^* 仅由此生成



集合的递归定义 (续)



- **例4**：递归定义字符串的长度函数 $l: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$
 - 奠基： $l(\lambda) = 0$;
 - 递归步骤： $l(\omega x) = l(\omega) + 1$ ，其中 $\omega \in \Sigma^* \wedge x \in \Sigma$
- **例5**：递归定义 Σ^* 上的字符串连接运算 “.”
 - 奠基： $\omega \in \Sigma^*$ ，则 $\omega \cdot \lambda = \omega$;
 - 递归步骤： 若 $\omega_1 \in \Sigma^* \wedge \omega_2 \in \Sigma^* \wedge x \in \Sigma$ ，则 $\omega_1 \cdot (\omega_2 x) = (\omega_1 \cdot \omega_2)x$



集合的递归定义（续）



■ 例6：递归定义Peano算术中的加法（+）运算

- 奠基： $a + 0 = a$
- 递归步骤： $a + b^+ = (a + b)^+$ ，其中 $\square^+$ 为后继运算

■ 例7：递归定义Peano算术中的乘法（ $\times$ ）运算

- 奠基： $a \times 1 = a$
- 递归步骤： $a \times b^+ = a + (a \times b)$ ，其中 $\square^+$ 为后继运算
- 特别地， $a \times 0 = 0$



结构归纳法



- **结构归纳法** (structural induction) 一般用于证明由递归构造的集合中的元素所具有的性质，或者用于证明与递归定义集合相关的命题，证明框架如下：
 - **奠基**：对于集合中的初始元素，证明命题成立；
 - **归纳步骤**：针对产生集合中新元素的规则，证明若已有元素满足命题，则该规则产生的新元素也满足命题
- 结构归纳法的有效性来源于递归定义的集合结构



结构归纳法 (续)



- **例：**根据 Σ^* 与 l 和 $\cdot$ 的定义(见例3—例5)，用结构归纳法证明： $l(x \cdot y) = l(x) + l(y)$ ，其中 $x, y \in \Sigma^*$

- **证明：**

初始元素成立

- **奠基：**对 $x \in \Sigma^*$ ，显然有 $l(x \cdot \lambda) = l(x) + l(\lambda)$;
- **I.H.:** 令 $P(y)$ 表示：对任意 $y \in \Sigma^*$ ，有 $l(x \cdot y) = l(x) + l(y)$ 。假设 $P(y)$ 成立，则：

新元素产生规则(例3): $y \Rightarrow ya$
- **归纳步骤：** (以下证明对于任一 $a \in \Sigma$ ， $P(y) \Rightarrow P(ya)$ ，即当 $x \in \Sigma^*$ ，有 $l(x \cdot ya) = l(x) + l(ya)$) 由归纳假设， $P(y)$ 成立，即 $l(x \cdot y) = l(x) + l(y)$ ，故 $l(x \cdot ya) = l(x \cdot y) + 1 = l(x) + l(y) + 1 = l(x) + l(ya)$ 。由结构归纳法，命题得证。 □

规则产生的新元素亦满足命题



本次课后作业



- 教材内容：[Rosen] 5.1–5.3节，5.4节（自学）
- 课后习题：
 - Problem Set 10
- 提交时间：线上授课阶段的作业请作答于作业本上，
暂缓提交，待线下复课后一并在课堂上提交

