

**المباراة العامة للعلوم والتقنيات 2015**

**موضوع الرياضيات**



يوليوز 2015

## موضوع الرياضيات

مدة الإنجاز: 4 س.

يشتمل موضوع مادة الرياضيات لهذه المباراة على تمرين ومسألة مستقلين فيما بينهما ؛ ويمكن لأي مترشع ، من أجل الإجابة على سؤال ما من التمرين أو المسألة، أن يقبل نتائج الأسئلة السابقة، من التمرين أو المسألة، ولو لم يُحِب عنها، وأن يستعمل هذه النتائج شريطة الإشارة بدقّة إلى أرقام الأسئلة المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مدى حرص المترشح على اعتماد الوضوح والضبط في تقديم الأجوبة وفي تحريرها، ومدى التزامه بالدقّة في الاستدلال والبرهان تعتبر من العناصر المهمّة التي سيتمّ أخذها بعين الاعتبار أثناء القيام بعملية التصحيح. وفي هذا الإطار، يجب ضبط أرقام الأسئلة التي تتم الإجابة عنها بكل دقّة .

لا يسمح باستعمال حاسوب أو آلة حاسبة أو لوحة إلكترونية.

إذا بدا لأحد المترشحين أثناء الاختبار على أنّ هناك خطأ ما في موضوع المباراة فليُشير إلى ذلك على ورقة تحريره وليواصل اختبار مبرزا أسباب المبادرات التي قد يقوم باتخاذها.

## التمرين

### دراسة متتالية من أعداد صحيحة طبيعية

في هذا التمرين نرمز بـ  $\text{pgcd}(a, b)$  و  $\text{ppcm}(a, b)$  على التوالي للقاسم المشترك الأكبر وللمضاعف المشترك الأصغر للعددين الصحيحين  $a$  و  $b$  .

لتكن  $(p_n)_{n \geq 0}$  و  $(q_n)_{n \geq 0}$  متتاليتين من أعداد صحيحة طبيعية غير منعدمة تحقق حدودهما ما يلي :

$$\begin{cases} p_0 \geq 2, q_0 \geq 2 ; \\ \forall n \in \mathbb{N}, p_{n+1} = \text{pgcd}(p_n, q_n) + 1, q_{n+1} = \text{ppcm}(p_n, q_n) - 1. \end{cases}$$

الهدف من هذا التمرين هو أن نبين وجود عددين صحيحين طبيعيين  $N$  و  $c > 0$  بحيث :

$$\forall n \geq N, p_{n+c} = p_n.$$

من أجل ذلك نضع، لكل  $n \in \mathbb{N}$ ،  $s_n = p_n + q_n$  ونعتبر المجموعة

$$\mathcal{R}_n = \{m \in \mathbb{N}^*; m \geq p_n \text{ \& } m \nmid s_n\}.$$

## الجزء الأول

### إنشاء متتالية تناقصية من أعداد صحيحة طبيعية

1.A. يبين أن  $R_n \neq \emptyset$  لكل عدد صحيح طبيعي  $n$ .

لكل عدد صحيح طبيعي  $n$ ، نرسم  $r_n$  إلى أصغر عناصر المجموعة  $R_n$  :  $r_n = \min R_n$ .

2.A. ليكن  $n$  عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم بحيث  $p_n | q_n$ . حدد  $p_{n+1}$  و  $q_{n+1}$  بدلالة  $p_n$  و  $q_n$  ثم حدد كذلك  $s_{n+1}$  بدلالة  $s_n$ .

نهدف فيما يلي إلى إثبات تناقصية المتتالية  $(r_k)_{k \geq 1}$  فنعتبر من أجل ذلك عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم  $n$ .

3.A. نفترض أن  $p_n | q_n$ . يبين أن  $p_n \notin R_n$  ثم استنتج أن  $r_{n+1} = r_n$ .

4.A. نفترض أن  $p_n \nmid q_n$ .

1.4.A. يبين أن  $r_n = p_n$ .

2.4.A. يبين أن  $p_{n+1} \leq p_n$ .

3.4.A. يبين أن  $p_n \in R_{n+1}$  ثم استنتج أن  $r_{n+1} \leq r_n$ .

## الجزء الثاني

### إنشاء ودراسة متتالية تناقصية من أعداد صحيحة طبيعية

1.B. يبين أن المتتالية  $(r_k)_{k \geq 1}$  متقاربة وحدد نهايتها.

2.B. يبين أنه يوجد عدد صحيح طبيعي  $n_0$  بحيث  $r_n = r_{n_0}$  لكل  $n \geq n_0$ .

نضع فيما يلي  $r = \min\{r_k; k \geq 1\}$  و  $y_n = \text{pgcd}(r, s_n)$  لكل  $n \geq 0$ .

3.B. أثبت وجود العدد  $r$  ثم يبين أنه يوجد عدد صحيح طبيعي  $N$  بحيث  $r = r_N$ .

4.B. يبين أن  $r = r_n$  لكل  $n \geq N$ .

5.B. المتتالية  $(y_n)_{n \geq N}$  ثابتة : ليكن  $n$  من  $\mathbb{N}$  بحيث  $n \geq N$ .

1.5.B. نفترض أن  $p_n | q_n$ . يبين أن  $y_{n+1} = y_n$ .

2.5.B. نفترض أن  $p_n \nmid q_n$ . يبين أن  $s_{n+1} = y_n + \frac{p_n q_n}{y_n}$  ثم استنتج أن  $y_{n+1} = y_n$ .

6.B. أثبت ما هو مطلوب في هذا التمرين.

نهاية التمرين

## المسألة

مقارنة بين المنظّمات المنتظمة للمشتقات المتتالية لدالة

### تعريف ورموز

1- لكل  $r$  و  $k$  من  $\mathbb{N}$  حيث  $k \leq r$ ، نرسم  $\binom{r}{k}$  للمعامل الحداني المعرف بـ  $\binom{r}{k} = \frac{r!}{k!(r-k)!}$ .  
بالتوافق نضع  $\binom{r}{k} = 0$  إذا كان  $r < k$ .

### 2- المشتقات المتتالية لدالة-صنف دالة

ليكن  $I$  مجالا غير فارغ من المجموعة  $\mathbb{R}$  ولتكن  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  دالة عددية معرفة على  $I$ ، وليكن  $n$  عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم. نضع بالتوافق  $f^{(0)} = f$ .

✓ نقول إن  $f$  قابلة للإشتقاق مرّة واحدة على  $I$  إذا كانت الدالة  $f$  قابلة للإشتقاق على  $I$ ؛ في هذه الحالة نضع  $f^{(1)} = f'$  حيث  $f'$  الدالة المشتقة للدالة  $f$ ، وتسمى  $f^{(1)}$  بالدالة المشتقة رتبة 1 للدالة  $f$ .

✓ نقول إن  $f$  قابلة للإشتقاق مرتين على  $I$  إذا كانت الدالة  $f^{(1)}$  قابلة للإشتقاق على  $I$ ؛ في هذه الحالة نضع  $f^{(2)} = (f^{(1)})'$  حيث  $(f^{(1)})'$  الدالة المشتقة للدالة  $f^{(1)}$ ، وتسمى  $f^{(2)}$  بالدالة المشتقة رتبة 2 للدالة  $f$ .

✓ بالترجع، نقول إن  $f$  قابلة للإشتقاق  $n$  مرّة على  $I$  إذا كانت الدالة  $f^{(n-1)}$  قابلة للإشتقاق على  $I$ ؛ في هذه الحالة نضع  $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$  حيث  $(f^{(n-1)})'$  الدالة المشتقة للدالة  $f^{(n-1)}$ ، وتسمى  $f^{(n)}$  بالدالة المشتقة رتبة  $n$  للدالة  $f$ .

✓ نقول إن  $f$  دالة من الصنف  $C^n$  على  $I$  إذا كانت  $f$  قابلة للإشتقاق  $n$  مرّة على  $I$  وكانت الدالة  $f^{(n)}$  متصلة على  $I$ . نرسم بـ  $C^n(I, \mathbb{R})$  لمجموعة الدوال العددية من الصنف  $C^n$  على  $I$ .

### 3- المنظّمة المنتظمة لدالة محدودة

ليكن  $I$  مجالا غير فارغ من المجموعة  $\mathbb{R}$  ولتكن  $g: I \rightarrow \mathbb{R}$  دالة عددية معرفة على  $I$ . نقول إن  $g$  دالة محدودة على  $I$  إذا وجد عدد حقيقي  $M \geq 0$  يحقق التفاوتة

$$\forall x \in I, |g(x)| \leq M. \quad (1)$$

في هذه الحالة نرسم بـ  $\|g\|_\infty$  لأصغر عدد  $M$  يحقق التفاوتة (1)، ويسمى العدد  $\|g\|_\infty$  بالمنظّمة المنتظمة للدالة المحدودة  $g$ .

خاصية : تتميز المنظّمة المنتظمة  $\|g\|_\infty$  للدالة المحدودة  $g$  بما يلي :

(i) لكل  $x$  من  $I$  لدينا  $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$ ؛

(ii) لكل عدد حقيقي  $M \geq 0$  يحقق التفاوتة (1) أعلاه لدينا  $\|g\|_\infty \leq M$ .

في هذه المسألة نعتبر عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم  $n$  ونرسم بـ  $\mathcal{F}_n$  لمجموعة الدوال العددية  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  التي هي من الصنف  $C^n$  على  $\mathbb{R}$  بحيث تكون الدالتان  $f$  و  $f^{(n)}$  محدودتين على  $\mathbb{R}$ .

الهدف من هذه المسألة هو أن نبين أن المجموعة  $\mathcal{F}_n$  جزء من المجموعة  $\mathcal{F}_k$  لكل عدد  $k$  من  $\{1, \dots, n\}$  :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_k$$

كما نتغيا كذلك إيجاد إكبار للعدد  $M_k = \|f^{(k)}\|_\infty$  ،  $1 \leq k \leq n$  ، بدلالة العددين  $M_0 = \|f\|_\infty$  و  $M_n = \|f^{(n)}\|_\infty$  لكل دالة  $f$  من  $\mathcal{F}_n$  .

### الجزء الأول صيغة تايلور<sup>1</sup> ذات الباقي على شكل تكامل متفاوتة تايلور-لاكرايج<sup>2</sup>

ليكن  $I$  مجالا غير فارغ من المجموعة  $\mathbb{R}$  ولتكن  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  دالة من الصنف  $\mathcal{C}^n$  على  $I$  . ليكن  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين مختلفين من  $I$  . لكل عدد  $k$  من المجموعة  $\{0, 1, \dots, n-1\}$  نضع

$$R_k = \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt.$$

1.1. يبين أن لكل عدد  $k$  من المجموعة  $\{1, \dots, n-1\}$  لدينا

$$R_{k-1} = \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_k.$$

2.1. استنتج صيغة تايلور من الرتبة  $(n-1)$  ذات الباقي على شكل تكامل التالية :

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt. \quad (2)$$

3.1. متفاوتة تايلور-لاكرايج من الرتبة  $(n-1)$  : نفترض أن الدالة  $f^{(n)}$  محدودة على  $I$  ونعتبر عددا حقيقيا  $M \geq 0$  يحقق متفاوتة

$$\forall x \in I, |f^{(n)}(x)| \leq M.$$

يبين أن

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq \frac{|b-a|^n}{n!} M. \quad (3)$$

4.1. تطبيق

نعتبر الدالة العددية  $h$  المعرفة على المجال  $]-1, +\infty[$  بما يلي :

$$\forall t > -1, h(t) = \ln(1+t)$$

ونضع  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$  ، لكل عدد صحيح طبيعي  $n \geq 1$  .

1.4.1. يبين أن الدالة  $h$  من الصنف  $\mathcal{C}^n$  على  $]-1, +\infty[$  لكل عدد صحيح طبيعي  $n > 0$  ، وأن

$$\forall t > -1, h^{(n)}(t) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+t)^n}.$$

2.4.1. يبين أن المتسالتين  $(S_{2n})_{n \geq 1}$  و  $(S_{2n+1})_{n \geq 0}$  متحاديتان.

3.4.1. استنتج أن المتسالية  $(S_n)_{n \geq 1}$  متقاربة.

4.4.1. باستعمال متفاوتة تايلور-لاكرايج يبين أن نهاية المتسالية  $(S_n)_{n \geq 1}$  هي العدد  $\ln 2$  .

<sup>1</sup> TAYLOR, math. angl. (1685-1731)

<sup>2</sup> LAGRANGE, math. fran. (1739-1813)

## الجزء الثاني

### دراسة التظيمات $E_3 \subset E_2 \subset E_1$

1.2. دراسة الحالة  $n = 2$

لتكن  $f$  دالة غير ثابتة من المجموعة  $\mathcal{F}_2$ . نذكر أن الدالتين  $f$  و  $f^{(2)}$  محدودتين ونضع

$$M_0 = \|f\|_\infty, \quad M_2 = \|f^{(2)}\|_\infty.$$

1.1.2. ليكن  $x$  عددا حقيقيا و  $h > 0$ . باستعمال متفاوتة تايلور-لاكرايج أوجد إكبارا للكميتين

$$|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \quad \text{و} \quad |f(x-h) - f(x) + hf'(x)|.$$

استنتج أن

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}.$$

2.1.2. يبين أن  $M_2 > 0$  و  $M_0 > 0$ .

3.1.2. يبين أن الدالة  $f'$  محدودة و أن  $M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}$ .

2.2. دراسة الحالة  $n = 3$

لتكن  $f$  دالة غير ثابتة من المجموعة  $\mathcal{F}_3$ . نذكر أن الدالتين  $f$  و  $f^{(3)}$  محدودتين ونضع

$$M_0 = \|f\|_\infty, \quad M_3 = \|f^{(3)}\|_\infty.$$

1.2.2. ليكن  $x$  عددا حقيقيا و  $h > 0$ . باستعمال متفاوتة تايلور-لاكرايج أوجد تكبرا للكميتين

$$|f(x+h) - f(x) - hf'(x) - \frac{h^2}{2}f^{(2)}(x)| \quad \text{و} \quad |f(x-h) - f(x) + hf'(x) - \frac{h^2}{2}f^{(2)}(x)|.$$

استنتج أن

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_3 h^2}{6}, \quad |f^{(2)}(x)| \leq \frac{4M_0}{h^2} + \frac{M_3 h}{3}.$$

2.2.2. يبين أن  $M_3 > 0$  و  $M_0 > 0$ .

3.2.2. يبين أن الدالة  $f'$  محدودة و أن  $M_1 \leq \frac{1}{2}(9M_0^2 M_3)^{\frac{1}{3}}$ .

4.2.2. يبين أن الدالة  $f^{(2)}$  محدودة و أن  $M_2 \leq (3M_0 M_3^2)^{\frac{1}{3}}$ .

## الجزء الثالث

### الصيغة التعاكسية لباسكال<sup>3</sup>؛ تطبيقات

الهدف من هذا الجزء هو إثبات الصيغة التعاكسية لباسكال (4) ودراسة بعض التطبيقات.

1.3. لتكن  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  و  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متالتين عدديتين يحققان

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k.$$

يبين أن لكل عدد صحيح طبيعي  $m$  لدينا

$$a_m = (-1)^m \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} b_k. \quad (4)$$

<sup>3</sup> PASCAL, math. et phy. fran. (1623-1662)

### 2.3. تطبيقات

1.2.3. يبين أن لكل عددين صحيحين طبيعيين  $k$  و  $m$  لدينا

$$\sum_{p=0}^m (-1)^p p(p-1) \dots (p-k+1) \binom{m}{p} = (-1)^m m! \delta_{k,m} \quad (5)$$

حيث

$$\delta_{k,m} = \begin{cases} 1, & k = m; \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

2.2.3. استنتج أن لكل عدد صحيح طبيعي  $m$  وكل  $k$  من  $\{0, \dots, m\}$  لدينا

$$\sum_{p=0}^m (-1)^p p^k \binom{m}{p} = (-1)^m m! \delta_{k,m}. \quad (6)$$

إشارة : يمكن الاستدلال بالترجع.

## الجزء الرابع

دراسة التظيمات  $E_n \subset E_k$  لكل  $k$  من  $\{1, \dots, n\}$

لتكن  $f$  دالة غير ثابتة من المجموعة  $\mathcal{F}_n$ . نذكر أن الدالتين  $f$  و  $f^{(n)}$  محدودتين ونضع

$$M_0 = \|f\|_\infty, \quad M_n = \|f^{(n)}\|_\infty.$$

1.4. ليكن  $x$  عددا حقيقيا و  $h > 0$ . باستعمال متفاوتة تايلور-لاكرانج يبين أن

$$\left| \sum_{j=1}^{n-1} \frac{h^j}{j!} f^{(j)}(x) \right| \leq 2M_0 + \frac{M_n h^n}{n!}. \quad (7)$$

2.4. باستعمال متفاوتة (7) أعلاه لكل  $h$  من  $\{1, \dots, n-1\}$  وكذا نتيجة السؤال 2.2.3. (المتطابقة (6))،

يبين وجود ثابتين  $C_1 > 0$  و  $C_2 > 0$  بحيث

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f^{(n-1)}(x)| \leq C_1 M_n + C_2 M_0.$$

3.4. يبين أن الدالة  $f^{(k)}$  محدودة لكل  $k$  من  $\{1, \dots, n-1\}$  أو بمعنى آخر  $E_n \subset E_k$  لكل  $k$  من  $\{1, \dots, n-1\}$ .

4.4. نضع  $M_k = \|f^{(k)}\|_\infty$  لكل  $k$  من  $\{0, \dots, n\}$ .

1.4.4. يبين أن  $M_k > 0$  لكل  $k$  من  $\{0, \dots, n\}$  وأن  $M_k \leq \sqrt{2M_{k-1}M_{k+1}}$  لكل  $k$  من  $\{1, \dots, n-1\}$ .

2.4.4. يبين أن  $M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-k/n} M_n^{k/n}$  لكل  $k$  من  $\{0, \dots, n\}$ . هل هذا الإكبار هو الأفضل ؟

إشارة : ضع  $a_k = 2^{k-1} \frac{M_k}{M_{k-1}}$  ،  $1 \leq k \leq n$  ، وأثبت أن  $a_1 \leq \dots \leq a_n$  و أن  $(a_1 \dots a_k)^n \leq (a_1 \dots a_n)^k$  لكل  $k$  من  $\{1, \dots, n\}$ .

نهاية المسألة

نهاية الموضوع