




澳門特別行政區政府衛生局
仁伯爵綜合醫院



Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Centro Hospitalar Conde de São Januário

耳鼻咽喉 內窺鏡檢查

市民衛教小冊子



軟式內窺鏡由鼻孔進入，沿鼻腔到達鼻咽及咽喉。

檢查當日請帶備

醫療卡、福利卡(如有)及身份證。

什麼是內窺鏡檢查？

檢查方式

醫生會使用附有光源的軟纖維內窺鏡，經由受檢者的耳、鼻或口，檢查耳道、鼻腔或咽喉。

需作檢查的原因

- 1 鼻腔與鼻竇問題**
包括鼻出血及鼻竇相關問題。
- 2 咽喉與聲帶問題**
包括聲音、吞嚥或咽喉不適。
- 3 腫瘤與癌症篩檢**
由醫生按需要作進一步評估。
- 4 異物處理與取樣**
協助取出異物或夾取可疑組織化驗。

檢查用途

評估耳道、耳膜、鼻腔、鼻竇、鼻咽部、咽喉與聲帶；
協助異物取出、病理活檢及鼻出血處理內鏡輔助診療

檢查前:請先留意

簽署檢查同意書

- 1** 受檢者經醫生解釋相關獲益、風險及事宜後，須簽署檢查同意書。

藥物安排

- 2** 如長期服用抗血小板/抗凝藥物，是否需要停藥，請按主診醫生指示。



受檢者可採坐位接受檢查，過程中應保持頭部穩定。

檢查前提醒

如有配戴假牙，請於檢查前取下。受檢者可採坐位或平臥位進行檢查。

檢查過程

取下假牙

- 1 如有配戴假牙, 請於檢查前取下。

選擇姿勢

- 2 受檢者可採坐位或平臥位進行檢查。

局部麻醉

- 3 醫生可按需要於鼻腔或咽喉部噴局部麻醉藥。

鼻腔藥物

- 4 可按個別需要使用收縮鼻血管藥。

檢查目的

觀察耳道、耳膜、鼻腔、鼻竇、鼻咽部、咽喉與聲帶, 並可按需要取樣或處理鼻出血。

保持放鬆

檢查時請保持頭部穩定, 按醫護人員指示呼吸及配合。

檢查後:照顧重點

靜坐觀察

- 1 檢查後靜坐觀察 30 分鐘, 沒有不適才可離開。

暫停進食

- 2 如使用局部麻醉, 禁食 1-2 小時; 當天吃常溫食物, 不要吃燙熱飲食。

避免劇烈活動

- 3 術後一週避免劇烈運動及搬重物(重物不超過 2 公斤)。

按醫囑用藥

- 4 遵照醫囑使用滴鼻藥、抗生素等藥物。

一般情況

檢查後如有痰中帶少量血絲, 一般 2 至 3 天會自行緩解。

需要立即就醫

如出現持續流鼻血、血痰、咳血或呼吸急促等情況, 請立刻就醫!



澳門特別行政區政府衛生局
仁伯爵綜合醫院

Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Centro Hospitalar Conde de São Januário



可能引起的併發症

多數情況會自行緩解; 如有不適或疑問, 請盡快聯絡醫護人員。

1 出血

活檢後可能有少量出血, 多數會自行緩解。

2 咽喉不適及氣喘

肺氣腫、哮喘患者可能出現氣促加劇。

3 喉痙攣與支氣管痙攣

氣道對刺激的反應, 可能導致呼吸困難。

4 血管迷走性暈厥

部分受檢者因緊張或受刺激而出現, 多為短暫且輕微。

如有疑問, 請於辦公時間致電

8390 6059

耳鼻喉科 / 內鏡診療中心 聯合製作
最後更新: 2026 年 07 月 下次更新: 2029 年 07 月