
澳門特別行政區政府衛生局
仁伯爵綜合醫院
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Centro Hospitalar Conde de São Januário

耳鼻咽喉內窺鏡檢查

市民衛教小冊子



軟式內窺鏡由鼻孔進入, 沿鼻腔到達鼻咽及咽喉。

檢查當日請帶備

醫療卡、福利卡(如有)及身份證。

什麼是內窺鏡檢查?

檢查方式

醫生會使用附有光源的軟纖維內窺鏡, 經由受檢者的耳、鼻或口, 檢查耳道、鼻腔或咽喉。

需作檢查的原因

1. **鼻腔與鼻竇問題**
   包括鼻出血及鼻竇相關問題。
2. **咽喉與聲帶問題**
   包括聲音、吞嚥或咽喉不適。
3. **腫瘤與癌症篩檢**
   由醫生按需要作進一步評估。
4. **異物處理與取樣**
   協助取出異物或夾取可疑組織化驗。

檢查用途

評估耳道、耳膜、鼻腔、鼻竇、鼻咽部、咽喉與聲帶;
並協助異物取出、病理活檢及鼻出血處理等內鏡輔助診療

檢查前:請先留意

1. **簽署檢查同意書**
   受檢者經醫生解釋相關獲益、風險及事宜後, 須簽署檢查同意書。
2. **藥物安排**
   如長期服用抗血小板/抗凝藥物, 是否需要停藥, 請按主診醫生指示。



受檢者可採坐位接受檢查, 過程中應保持頭部穩定。

檢查前提醒

如有配戴假牙, 請於檢查前取下。受檢者可採坐位或平臥位進行檢查。

檢查過程

1 取下假牙
如有配戴假牙, 請於檢查前取下。

2 選擇姿勢
受檢者可採坐位或平臥位進行檢查。

3 局部麻醉
醫生可按需要於鼻腔或咽喉部噴局部麻醉藥。

4 鼻腔藥物
可按個別需要使用收縮鼻血管藥。

檢查目的
觀察耳道、耳膜、鼻腔、鼻竇、鼻咽部、咽喉與聲帶, 並可按需要取樣或處理鼻出血。

保持放鬆
檢查時請保持頭部穩定, 按醫護人員指示呼吸及配合。

檢查後:照顧重點

1 靜坐觀察
檢查後靜坐觀察 30 分鐘, 沒有不適才可離開。

2 暫停進食
如使用局部麻醉, 禁食 1–2 小時; 當天吃常溫食物, 不要吃燙熱飲食。

3 避免劇烈活動
術後一週避免劇烈運動及搬重物(重物不超過 2 公斤)。

4 按醫囑用藥
遵照醫囑使用滴鼻藥、抗生素等藥物。

一般情況
檢查後如有痰中帶少量血絲, 一般 2 至 3 天會自行緩解。

需要立即就醫
如出現持續流鼻血、血痰、咳血或呼吸急促等情況, 請立刻就醫!

澳門特別行政區政府衛生局
仁伯爵綜合醫院
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Centro Hospitalar Conde de São Januário

可能引起的併發症

多數情況會自行緩解; 如有不適或疑問, 請盡快聯絡醫護人員。

1 出血
活檢後可能有少量出血, 多數會自行緩解。

2 咽喉不適及氣喘
肺氣腫、哮喘患者可能出現氣促加劇。

3 喉痙攣與支氣管痙攣
氣道對刺激的反應, 可能導致呼吸困難。

4 血管迷走性暈厥
部分受檢者因緊張或受刺激而出現, 多為短暫且輕微。

如有疑問, 請於辦公時間致電
8390 6059

耳鼻喉科 / 內鏡診療中心 聯合製作
最後更新:2026 年 07 月 下次更新:2029 年 07 月