

## Laboratory 2

1. Generate randomly 20 integers from -10 to 10. Place these in “Input” as the input holder.

Input [9, -9, 6, 1, 0, 3, 4, 4, 1, 10, -4, 10, 1, -2, -4, -6, -10, -4, 8, 2]

2. Use the inputs in no.1 to generate the output of  $f(x)$ , place it in “F”. Use the same inputs for  $h(x)$  and place it in “H”.

F [1295, 1295, 575, 15, -1, 143, 255, 255, 15, 1599, 255, 1599, 15, 63, 255, 575, 1599, 255, 1023, 63]

H [17.25, -18.75, 11.25, 1.25, -0.75, 5.25, 7.25, 7.25, 1.25, 19.25, -8.75, 19.25, 1.25, -4.75, -8.75, -12.75, -20.75, -8.75, 15.25, 3.25]

3. Find the output of the sum of  $f(x)$  and  $h(x)$ , and place it in “F+H”.

F+H [1312.25, 1276.25, 586.25, 16.25, -1.75, 148.25, 262.25, 262.25, 16.25, 1618.25, 246.25, 1618.25, 16.25, 58.25, 246.25, 562.25, 1578.25, 246.25, 1038.25, 66.25]

4. Find the output of the difference of  $f(x)$  and  $h(x)$  and place it in “F-H”.

F-H [1277.75, 1313.75, 563.75, 13.75, -0.25, 137.75, 247.75, 247.75, 13.75, 1579.75, 263.75, 1579.75, 13.75, 67.75, 263.75, 587.75, 1619.75, 263.75, 1007.75, 59.75]

5. Find the output of the product of  $f(x)$  and  $h(x)$  and place it in “F\*H”.

F\*H [22338.75, -24281.25, 6468.75, 18.75, 0.75, 750.75, 1848.75, 1848.75, 18.75, 30780.75, -2231.25, 30780.75, 18.75, -299.25, -2231.25, -7331.25, -33179.25, -2231.25, 15600.75, 204.75]

6. Find the output of the quotient of  $f(x)$  and  $h(x)$  and place it in “F/H”.

F/H [75.07246376811594, -69.06666666666666, 51.111111111111114, 12.0, 1.3333333333333333, 27.238095238095237, 35.172413793103445, 35.172413793103445, 12.0, 83.06493506493507, -29.142857142857142, 83.06493506493507, 12.0, -13.263157894736842, -29.142857142857142, -45.09803921568628, -77.0602409638542, -29.142857142857142, 67.08196721311475, 19.384615384615383]

7. Find the output of the composition of  $(f \circ g)(x_0)$ , and place it in “F(G)”.

F(H) [4760.0, 5624.0, 2024.0, 24.0, 8.0, 440.0, 840.0, 840.0, 24.0, 5928.0, 1224.0, 5928.0, 24.0, 360.0, 1224.0, 2600.0, 6888.0, 1224.0, 3720.0, 168.0]

8. Find the output of the composition of  $(g \circ f)(x_0)$ , and place it in “G(F)”.

H(F) [2589.25, 2589.25, 1149.25, 29.25, -2.75, 285.25, 509.25, 509.25, 29.25, 3197.25, 509.25, 3197.25, 29.25, 125.25, 509.25, 1149.25, 3197.25, 509.25, 2045.25, 125.25]

9. Print the input and output as ordered pairs of  $f^{-1}(x)$ , and name it “Inverse of f”.

Inverse of f [(1295, 9), (1295, -9), (575, 6), (15, 1), (-1, 0), (143, 3), (255, 4), (255, 4), (15, 1), (1599, 10), (255, -4), (1599, 10), (15, 1), (63, -2), (255, -4), (575, -6), (1599, -10), (255, -4), (1023, 8), (63, 2)]

10. Print the input and output as ordered pairs of  $g^{-1}(x)$ , and name it “Inverse of g”.

```
Inverse of g [(17.25, 9), (-18.75, -9), (11.25, 6), (1.25, 1), (-0.75, 0), (5.25, 3), (7.25, 4), (7.25, 4), (1.25, 1), (19.25, 10), (-8.75, -4), (19.25, 10), (1.25, 1), (-4.75, -2), (-8.75, -4), (-12.75, -6), (-20.75, -10), (-8.75, -4), (15.25, 8), (3.25, 2)]
```

## Code:

```
1 import random
2
3 input = []
4 what = []
5 when = []
6 where = []
7 who = []
8 why = []
9 how = []
10 wow = []
11 omg = []
12 lol = []
13 lmao = []
14
15 for i in range(20):
16     l = random.randint(-10, 10)
17     input.append(l)
18
19     f = (4 * l) ** 2 - 1
20     what.append(f)
21
22     h = 2 * l - 3/4
23     when.append(h)
24
25     where.append(f+h)
26     who.append(f-h)
27     why.append(f*h)
28     how.append(f/h)
29
30     foh = (4 * h) ** 2 - 1
31     wow.append(foh)
32
33     hof = 2 * f - 3/4
34     omg.append(hof)
35
36     fi = (f,l)
37     lol.append(fi)
38
39     hi = (h, l)
40     lmao.append(hi)
41
42 print("Input ", input)
43 print("F ", what)
44 print("H ", when)
45 print("F+H ", where)
46 print("F-H ", who)
47 print("F*H ", why)
48 print("F/H ", how)
49 print("F(H) ", wow)
50 print("H(F) ", omg)
51 print("Inverse of f", lol)
52 print("Inverse of g", lmao)
```