

ENFOQUE HOMEOPÁTICO DE CUADROS AGUDOS DIGESTIVOS



Dra. Elena Figari

Sintomatología Digestiva Aguda más frecuente.

Acidez, ardor de estómago.

Náuseas y Vómitos

Diarrea

Dolor Abdominal

Flatulencia

Constipación

Hemorroides

Averiguar si es por agravación o por exoneración

Cuadro Agudo

Causalidad Desencadenante (mental, alim., clima)

Diagnóstico Nosológico adaptado a terminología repertorial

Modalidad(lateralidad,horario, condiciones de > y <)

Extensión

Localización

Sensaciones; Concomitantes

S.Mentales Nuevos y Antiguos Exacerbados

S.Generales Nuevos y Antiguos Exacerbados

S. Particulares Antiguos Exacerbados



ACIDEZ

ACIDEZ (Ardor de estómago):

ESTÓMAGO: Acidez 316/I
Eructos, pirosis 334/II
Dolor Ardiente 326/II

CARBO VEGETABILIS:

Eructos ácidos, luego de manteca o comida grasosa (332/I). Gastralgia ardiente. Distensión gástrica > eructando (324/I). FLATULENCIA (en hipocondrios-378/II).

LYCOPodium: ardor intolerable(sube a la faringe),con eructos incompletos e ineficaces , después de fumar o cebollas, mariscos, legumbres o repollo, comer un bocado o hasta saciarse. Gran plenitud y flatulencia (intolerancia a la ropa ajustada)

NUX VÓMICA: antecedentes de comilonas, y en bebedores, más de mañana. Eructos agrios, sensación de pesadez en estómago, distensión peor una hora después de haber comido. **Vómitos agrios** > .

DIARREA



DIARREA		
No sanguinolenta	Compr. Sistémico	Infecciones (E. coli, Cryptosporidium, Giardia Viral-Rotavirus) Intox. Alimentaria: S. aureus., C.perfringes, Colitis pseudomembranosa, crisis addisoniana, etc.
	Sin compr. sistémico	Medicaciones (Aines) Intoxicación Alimentaria, Cólon irritable Impactación Fecal
Sanguinolenta	Compr. sistémico	Infecciones: shigella,, salmonella, Campilobacter, Yersinia, E.Histolítica Enf. Intestinal inflamatoria, colitis isquémica
	Sin compr. sistémico	Proctitis infecciosa, ulcerativa Radiación, carcinoma rectosigmoideo

DIARREA	
CAUSALIDAD DESENCADENANTE	
MENTE:	Trastornos por : 91/92.
RECTO:	387/II
Ansiedad, después de:	ars, camph, sil
Anticipación, después de:	arg-n, gels, ph.ac
Cólera, después de:	COLOC, cham, aloe, nux vom, staph
Enojo(Vejación):	aloe, calc p, cham, coloc, staph, sulph
Malas noticias, por:	gels
Pena, después de:	aloe, calc p, cham, coloc, gels, ign, op, merc, ph ac, staph
Susto, después de:	acon, arg n, gels, ph ac, puls, phos

DIARREA

ALIMENTARIA:

Recto/Diarrea 388/389/390.

fruta, después de: *aloe, ars, bry, chin, coloc, lyc, ph ac, podo, puls, verat*

helado, después de: *arg n, ars, carb v, puls*

postres, pasteles, después de: *lyc, nat s, puls*

leche, después de: *ars, bry, calc, chin, mag c, mag m, podo, sep, sil, sulph*

comer (durante, después, mejora).

DIARREA

MODALIDAD, CONDICIÓN O CIRCUNSTANCIA**Horarios:**

mañana, cama, impulsándolo fuera de: *aloe, phos, podo, sulph*

mañana, despertándolo con urgencia: *sulph*

periódica en días alternados: *alum, chin*

Movimiento:

movimiento agr (390-1): *apis, aloe, bry, podo, verat*

parado agr: *aloe, ars, bry, cocc, rheum, sulph*

Clima:

aire frío, al anochecer: *merc*

caluroso tiempo (verano): *aeth, aloe, bry, camph, carb v, chin, crot t, gamb, mag c, podo, verat*

mojarse los pies, después de: *acon, calc, rhus tox.*

DIARREA

Otros

dentición, destete,
 embarazo, menstruación (antes, durante, después)
 ancianos, niños, niñas de escuela.
 sueño (durante, después).
 transpiración suprimida, vacunación.
 traumatismos, tuberculosis, viruela, sarampión,
 condiciones sépticas
 viajar, etc.

DIARREA

SENSACIONES

ESTOMAGO: vacío, sensación de debilidad con diarrea: *fl-ac, lyc,*
petr, stram y *sulphur*. 345/II

ABDOMEN: plenitud, sensación de, durante la diarrea: *nat-s*. 382/I

RECTO: diarrea , indolora: 389/III

DIARREA

SÍNTOMAS CONCOMITANTES

MENTE: estupefacción con diarrea: gels. Clarke John H.- Radar-

ESTOMAGO: vómitos, diarrea durante:346/III

ABDOMEN: dolor, diarrea durante : 357/III

RECTO: flatos durante la diarrea: 395/II / prolapso, durante la diarrea 399/I
tenesmo —————> dolor tenesmo durante la diarrea: 394/I

ORINA: copiosa(aumentada), con diarrea:433/III

TRANSPIRACIÓN: diarrea, con 782/III

PIEL: frialdad, durante la diarrea 799/III

ESCALOFRÍO: diarrea durante 765/III

GENERALES: dentición difícil, con diarrea (Radar)
debilidad por diarrea 826/I

DIARREA

MATERIA FECAL

Olor: agrio, pútrido, como huevos podridos406/III Inodoras:405/II

Consistencia: 403/I Acuosa (amarilla, como agua de arroz, blanca, como jugo de ciruelas, clara, espumosa, marrón, negra, sanguinolenta, verde).
Blanda
Cuajada: 404/I
Espumosa404/III
Líquida: 405/II(amarilla, aterronada y líquida, seguida por dura, etc.)
Lientérica:405/II (con restos de comida)
Mucosa(limosa, como jalea, sanguinolenta, verde, etc.)
Pastosa:407/I

Copiosa: (Abundante) 404/I

Sanguinolenta: 407/III

Frecuente:404/III

Violenta, súbita: 408/III –Radar, En chorro-

Lanzada, hacia fuera: 405/ II –Radar, Arrojada como tiro-

DIARREA

AETHUSA CYNAPIUM

En **bebés alimentados desordenadamente**, en veranos calurosos y por dentición.

Total intolerancia a la leche(819/II), el *bebe* la vomita(347/I) **con brusco y violento esfuerzo**.

Queda **agotado**, se **duerme luego de diarrea o vómitos**(733/III). Vómitos violentos, en chorro, de la leche que acaba de ingerir; el niño queda sudoroso y somnoliento.

Diarrea verdosa con tenesmo, seguida de sueño. Convulsiones con ojos vueltos hacia abajo.

Fiebre sin sed, surcos nasolabiales acentuados, expresión de gran ansiedad y dolor.

DIARREA

ALOE SOCOTRINA

Originaria de desiertos de Arabia, Madagascar, costa de África; isla de Socotra.

Más de 300 subespecies(la experimentación de Hering fue hecha con diferentes tipos de Aloe).

Se utilizaba como laxante y para tratamiento de heridas y quemaduras.

MENTE:

Preocupado por sus enfermedades durante evacuación intestinal.

Lasitud alternando con gran actividad mental (Hering).

DIARREA

Aloe Socotrina

	cólera		mañana
Por	fruta	Peor	verano
	comer		caminando
	beber		parado

- **DESEO URGENTE DE EVACUAR(400/II)**, después de comer .
- Inseguridad sobre su esfínter → (debilidad del esfínter del ano).El recto se siente como lleno de fluidos pesados que tendieran a salir. Evacuación involuntaria, más al eliminar flatos(400/III), orinar o de noche en cama.
- **Diarrea** en chorro con abundancia de flatos. Sensación de bulto/ tapón rectal(400/I).
- **Heces**: amarillas, sanguinolentas, transparentes y viscosas como clara de huevo, **en grandes trozos gelatinosos, transparentes como jalea**.

DIARREA

ARSENICUM ALBUM

Angustia , ansiedad, marcado temor a la muerte .

Ataques de ansiedad , con inquietud que lo sacan de la cama < luego de medianoche.

Inquietud, no puede permanecer en un lugar; lo conduce de un lugar a otro.

Si está muy débil desea ser movido de una cama a otra y se recuesta ahora aquí, ahora allá.



Temor de la muerte; piensa que es incurable; que seguramente morirá, cuando está solo o al ir a la cama.

DIARREA

ARSENICUM ALBUM

DIARREA:

luego de comidas y/o bebidas **frías**. **Intensa y frecuente sed de pequeñas cantidades**. Diarrea con vómitos(346/III); después comer, o inmediatamente después de beber, helado, etc.

HECES :

muy pútridas, de olor cadavérico o a huevos podridos. Pequeñas, oscuras, como jugo de ciruelas o negras.

Líquidas, sanguinolientas, excoriantes, con tenesmo y **dolor ardiente como fuego en el recto** durante y después de defecar.

Siempre hay predominio de ardor y mejoría por el calor.



DIARREA

CHAMOMILLA

Antecedentes de **cólera** , **dentición o frío**. Paciente **caprichoso, irritable, grita y mejora en brazos si lo pasean o hamacan.**

Diarrea de color verdoso con restos alimenticios(lientérica) sin digerir o como huevos revueltos y olor a huevos podridos, corrosivas.

Sudor ácido y caliente en la cabeza. Una mejilla roja y caliente , la otra pálida y fría.



DIARREA

CHINA OFFICINALIS

Debilidad por descargas agotadoras, por pérdida de fluidos vitales, junto con eretismo nervioso .

Diarrea indoloras, acompañada de gran cantidad de gases: después de mediodía y de noche, después de fruta, comer, amamantar, destete.

Periódica(cada 3 días) y en días alternados (390/II).

Gran flatulencia obstruida(378/II), meteorismo doloroso(358/I), que no mejora eliminando flatos.

HECES: acuosas , copiosas, lientéricas, indoloras, a veces involuntariamente(398/II). Aunque blandas se evacúan con dificultad (386/II).




DIARREA

GAMBOGIA

Por tiempo caliente, tomar frío, después de comer y beber, en personas ancianas, muy utilizado en gastroenterocolitis

DEPRESIÓN, aún suicida; alternando con diarrea o por diarrea suprimida.



Materia fecal acuosa o mucosa, amarillo verdosa, acompañada de intensos borborismos. lanzada hacia afuera toda de una vez y con esfuerzo prolongado(3p.405/II), dando luego bienestar inmediato, y dolor ardiente después de la defecación; como si algo muy irritante de los intestinos hubiera sido expulsado. Orina con olor a cebollas.

Dolor cortante periumbilical que precede a la diarrea, protrusión rectal durante y es seguida de **ardor anal** y rectal, como si estuviera excoriado.

DIARREA

JATHROPA

Gran ansiedad, constricción en el pecho e insomnio.

Gastralgia ardiente y frío en el cuerpo, calambres en piernas. Dolor detrás del ombligo, cólicos punzantes.

Diarrea acuosa, con gorgoteos y borborismos, en chorro (violenta408/III) a borbotones, ruidosa, como si se vaciara un barril.

Las heces salen como torrente.

Vómitos acuosos, fáciles y simultáneos a la diarrea.


Sudores fríos, piel fría y cianótica y debilidad posterior.



DIARREA

MERCURIUS SOLUBILIS

Diarrea sobre todo nocturna (aparece o acentúa al anochecer), por enfriamientos en Verano u Otoño (días calurosos, noches frías).



Tenesmo antes y durante la diarrea, violento(394/I), con deseos urgentes (400/II), frecuentes o constantes de mover el vientre, aún después de haberlo hecho (400/III), y con náuseas, eructos.

Hay sed, lengua húmeda, flácida y dentada. Aliento fétido, sialorrea y sudores nocturnos profusos que no lo alivian o lo agotan.

DIARREA

MERCURIUS SOLUBILIS

Heces son acuosas, mucosas o **mucosanguinolentas** .
Cuanto más sanguinolentas más indicado de olor ácido.

Diarrea en niños.

Puede haber constipación
 (estreñimiento) con
 heces duras, nudosas y adherentes,
 difíciles de expulsar.



DIARREA

MAGNESIA CARBÓNICA

En niños pequeños, delgados , que no crecen, **irritables e inquietos, no pueden digerir la leche.**

Intenso deseo de comer y aversión por las verduras.

Diarreas con **heces ácidas, verdosas(408/I),**
 acuosas, como **espuma(404/III) en**
un charco de ranas (408/II);
 con trozos blancos como de sebo(403/II)
 flotando en las heces o como leche(403/II),
 precedidas de cólicos espasmódicos
 que lo doblan en dos(1p. Hahnemann).

Olor ácido de todas sus secreciones.



DIARREA

NATRUM SULPHURICUM

Diarrea por la mañana , después de levantarse(387/III), y pasearse(387/III).
Diarrea por **tiempo húmedo(389/III)**, farináceos,(389/I), frutas(389/III),
vegetales(390/III).

Heces biliosas(403/II) o verdes(408/I), o claras , de color arcilla(403/I),
son expulsadas de golpe, en chorro, como una escupida(396/1), y
ruidosas, porque se acompañan
de flatos.

En abdomen flatulencia(378/I),
especialmente en la región ileocecal y
mejora al eliminar flatos(352/III)

Constipación que alterna con diarrea(386/I)
Cólico hepático por litiasis biliar. Hepatitis
agudas y crónicas, con dolor e hipertrofia
hepática. No tolera la ropa ceñida en el vientre.




DIARREA

PODOPHYLLUM

• **Ansiedad por su salud. Durante tiempo caluroso y durante la dentición.** El bebé **aprisiona una encía contra otra.**

• **Antes de evacuar:** Borborigmos y gorgoteos, sensación de algo vivo en abdomen (agregar en Movimientos-C. Hering), **cólicos que mejoran doblándose hacia delante, flexionando las piernas(Coloc).**

• **Después de evacuar:**
Tenosmo doloroso, GRAN DEBILIDAD y
relajamiento, **sensación de desfallecimiento o vacío en el abdomen** o en el recto(prolapso antes, durante o después de evacuar).



DIARREA

PODOPHYLLUM

- **Diarrea abundante**, acuosa, a veces indolora que **aparecen a las 3, 4 o 5 a.m. hasta el mediodía** seguida de una deposición normal al anochecer y de prolapso de ano.
- **Alternancia** entre diarrea y cefalea (desaparece cuando tiene diarrea) o constipación.
- **Materia fecal** acuosa y muy abundante (como agua sucia en bebés), amarillenta, verdosas, expulsada en chorro (Violenta, súbita-Kent 408/III), lanzada (arrojada como tiro-Radar) o involuntaria eliminando flatos (Aloe—398/II).
ó
- Mucosas, **muy malolientes**.

Veratrum album

- Medicamento del Cólera asiático (388/III): predomina la diarrea y el sudor frío.
- En Cuprum los espasmos son violentos, terribles calambres y convulsiones en manos, pies, dedos y pantorrillas.
- En Camphora, el frío es como de hielo en todo el cuerpo pero no tolera estar cubierto y desea aire frío. Colapso aún sin deposiciones.



Diarrea > de noche, con **heces acuosas como agua de arroz** (403/II). Cólicos **violentos y dolor calambroide** antes de cada deposición, siempre seguidas de **gran debilidad** (colapso). Vómitos violentos y escalofríos durante la diarrea. **Sensación de frialdad glacial en la piel con manos y pies lívidos cubiertos de sudor frío** (767/II). Sudores fríos en la frente. Sed insaciable de agua helada.

DOLOR ABDOMINAL



DOLOR ABDOMINAL

CAUSAS EXTRA ABDOMINALES

SUPRADIAGNÓSTICAS: IAM- NEUMONIA- NEUMOTORAX, etc.

ENDOCRINAS: Cetoacidosis-DBT- Addison

HEMATOLÓGICAS: Leucosis Aguda

FÁRMACOS: abstinencia de psicofármacos

METABÓLICAS: Fiebre Mediterránea-Porfiria Aguda- Hipertrigliceridemia

SNC: Herpes Zoster – compresión de raíces nerviosas

CAUSAS INTRA ABDOMINALES

GASTROINTESTINALES: Gastroenteritis-Apendicitis- U D - Diverticulitis-
HÍGADO,VÍA BILIAR, BAZO, PÁNCREAS: Pancreatitis aguda, colecistitis
 aguda, absceso hepático , hepatitis aguda, rotura
 esplénica.

URINARIAS: litiasis, pielonefritis aguda.

GINECOLÓGICAS: embarazo ectópico, rotura folicular, torsión de ovario,
 salpingitis aguda.

PARED : hematoma de músculo recto.

DOLOR ABDOMINAL

BELLADONNA

- Ataque brusco, violento, abdomen caliente, tenso y distendido , más en hipocondrios; gran dolor. Sensibilidad dolorosa del abdomen por la <compresión.
- Cara roja, calor a distancia, cabeza caliente, sudorosa, midriasis, ojos brillantes , baile carotídeo, manos frías. **Somnolencia y sobresaltos en el sueño.** Peritonitis, apendicitis, hepatitis(en gral procesos inflamatorios).
- Dolores de todo tipo **aparecen y desaparecen rápidamente**(356/III), > acostado sobre el abdomen (356/III) y doblándose hacia atrás (357/III), flexionado los miembros.
- < : **por moverse(358/III), por la presión(358/III), por sacudidas** (370/I), al acostarse, por toser (359/I), **dolor en hígado acostado lado derecho agrava**(360/I).



DOLOR ABDOMINAL

BRYONIA ALBA

Comienzo lento. Sed de grandes cantidades a largos intervalos.
(Sequedad en mucosas , derrame en serosas).

DOLOR PUNZANTE(372/I) en abdomen, **DOLOR COMO SI FUERA A TENER DIARREA**, < **por el más mínimo movimiento (respirar, toser, sacudidas, caminar,) y > por la presión, por inmovilidad completa, o acostado del lado dolorido (361/I), flexionando las piernas(358/I), o acostado sobre el vientre.**

El dolor punzante puede ser localizado en región ileocecal o ingle derecha(374/III), **al inspirar hondo(359/I)** (apendicitis (380/II), Peritonitis.

Dolor hígado, cólicos, cálculos biliares (360/I)
Dolor hígado , acostado sobre lado derecho > (360/I).



DOLOR ABDOMINAL

COLOCYNTHIS

Dolor de tipo **calambroide** (365/III), **violento**(359/I) , cortante(367/III), desgarrante, **con agitación, ansiedad y gritos**; como descarga eléctrica a través del ano(368/III)(377/II) como apretado entre dos piedras (357/I), piedras afiladas frotándose como(358/III). El dolor sólo se soporta doblándose o apretando el abdomen contra algo duro. A veces vómitos y diarrea, escalofríos y desmayo.



Trastornos por **cólera** con indignación, mortificación con cólera, por ser despreciado(91/I/II/III), reproches; por beber líquidos fríos estando acalorado (356/III), fruta, comer.

➤por la presión366/III), calor local y después de defecar. Doblándose en dos >, y debe hacerlo(357/III), flexionando los miembros mejora.

DOLOR ABDOMINAL

CHINA OFFICINALIS

Debilidad por descargas agotadoras, por pérdida de fluidos vitales (sangre, lactancia, salivación, leucorrea, espermatorea, etc.) junto con eretismo nervioso .Gran sensibilidad al tacto mejora por fuerte presión.

. Cara pálida, ojeroso, sudoración intensa al menor movimiento. Boca seca y amarga.

Dolor **en bazo(359/I) e hígado, que agrava cuando lo tocan (360/II).**

Hipertrofia de hígado (Hinchazón (379/III), bazo e hígado duro(377/II). Cólicos por litiasis biliar(360/I). Gran distensión abdominal, los alimentos se transforman en gas. Eructar no mejora.

Los cólicos alivian al doblarse en dos.



DOLOR ABDOMINAL**CHAMOMILLA**

Cólicos por cólera (357/I), hipersensibles al dolor, con inquietud, irritabilidad por dolor, caprichoso e intolerancia a que le hablen.

Cólicos en niños, con gritos(34/III y 35/I), desean estar alzados(4/I) y deben doblarse (357/III)

Abdomen hinchado, piel tirante como un tambor, cólicos ventosos, flatulentos con borborigmos, expulsa gases en pequeña cantidad y sin alivio.

Dolores desgarrantes que aparecen o agravan por cólera, café, durante la diarrea, excitación (358/I), por tomar frío (358/I), antes y durante la menstruación.

Cólicos con diarreas amarillo verdosas y olor fétido.

Mejoran por calor local(356/III)

**DOLOR ABDOMINAL****CHELIDONIUM MAJUS**

- Le siente a todo y a sí mismo un olor inmundito, fecaloide.
- Marcada lateralidad derecha: apéndice cecal distendido y doloroso a la presión.
- Dolor calambroide, presivo o punzante en hígado(373/II) o hipocondrio derecho que se extiende hacia la espalda (373/III), sobre todo al ángulo inferior e interno del omóplato derecho.
- Lengua amarilla, de bordes rojos y dentada, paladar amarillo, aliento fétido, gusto amargo.
- Vómitos biliosos, no tolera nada en el estómago, excepto líquidos muy calientes (> leche). Peor: por el movimiento; acostado del lado derecho. Mejor después de almorzar; por leche caliente; después de comer, sobre todo alimentos o bebidas calientes.

DOLOR ABDOMINAL

CHELIDONIUM MAJUS

- Inflamación aguda (380/II) y crónica del hígado.
- Cólico hepático por litiasis biliar. Dolor en ombligo extendiéndose a través del abdomen(363/III).
- Constricción como por una cuerda(353/III.)
- Retracción del ombligo(382/III).
- Marcada ictericia, en cara y palmas de manos , prurito violento, coluria (color oscuro y marrón oscuro 432/I y II) y acolia (claro, de color 404/I). Heces amarillas.



DOLOR ABDOMINAL

DIOSCOREA

Dolor cólico (durante diarrea 357/III), cólico ventoso, retuercen al paciente, en paroxismos(358/III), como si una poderosa mano apretara los intestinos. **Dolor(errático) empieza en el ombligo e irradia súbitamente a partes distantes(358/I) .**

Dolor calambroide en la región del ombligo(367/II), extendiéndose a los dedos del pie y manos(Boericke, William).

El dolor a diferencia de Colocynthis agrava doblándose en dos(357/III) y mejora doblándose hacia atrás.(357/II).

Cólico hepático que se irradia a pecho, espalda y brazos.



©2006 Jeffrey Phippen

DOLOR ABDOMINAL

MAGNESIA PHOSPHORICA

Espasmos de la musculatura lisa, que **aparecen o se agravan por el frío** (aire, baño, etc.), por corrientes de aire, por destaparse, por tacto de la parte afectada.

Los espasmos se sienten como **calambres**(Coloc., Cuprum), con dolores intermitentes, bruscos, paroxísticos.

Mejora

al doblarse y a apoyar fuertemente las manos sobre el vientre-Coloc. tiene mucho fosfato de magnesio en su composición);**por la presión, por calor (356/III) y por bebidas calientes(359/I) y por fricciones.** Es decir mejora por aplicaciones locales calientes.



DOLOR ABDOMINAL

NUX VOMICA

Cólico abdominal de mañana , en cama (356/I), después de comilona, cólera (Cham, Coloc, Staph, Sulph).

< por enfriarse(357/I), tomar frío(358/I), antes y durante la menstruación, el embarazo(357/III), por el movimiento, después de comer o beber, etc.

➤por el calor local (356/I), después de defecar (357/III), doblándose.

Dolor como si fuera a tener diarrea (357/III). Se extiende al ano(359/II), recto(359/III) y al pecho (359/II).Dolor calambroide (flujo Hemorroidal suprimido J.T. Kent).

Nux V. tiene una intensa acción espasmogénica de musculo liso y estriado muchas veces con acción antiperistáltica (vómitos luego de comilonas, por una rabieta, violentos , biliosos).



DOLOR ABDOMINAL

PLUMBUM


Abdomen retraído(382/III) y duro y sensación de constricción (353/I) como si la pared abdominal estuviese tironeada hacia la columna vertebral como por una cuerda (Nash).

Cólicos violentos (359/I) y **paroxísticos que irradian a todo el cuerpo(358/II)**, sobre todo en el ombligo(363/III) o alrededor del ombligo y obligan a estirarse>(358/I) en todas las direcciones o adoptar toda clase de posiciones , incluso doblarse.

Dolor aparecen o < cuando desea evacuar; por el menor contacto por extraordinaria hiperestesia.

> por la presión.

Pacientes constipados crónicos:
heces como bolitas negras y duras



DOLOR ABDOMINAL

STANNUM

Cólicos periumbilicales, que aparecen y desaparecen gradualmente(356/III).

>acostado sobre el abdomen(356/III),apoyado sobre algo duro (bebés apoyados sobre las rodillas u hombros), doblándose en dos, por presión.

Sensación de **vacío en el estómago(344/III)**, aún después de comer, sin embargo no tolera la ropa apretada(Abdomen, vestidos,384/II).

Gran debilidad general, sobre todo en pecho, conversando y por tos, expectoración con gusto muy dulce o excepcionalmente salado(513/I Y II)



NAUSEAS Y VOMITOS

NAUSEAS Y VOMITOS

IPECA

Vómitos incesantes(347/I), violentos (347/III), mucosos, con náuseas constantes (339/I) , mortales (340/I) y que **no alivian después de vomitar**(340/III-Boericke O.). Por comidas grasa, helados, dulces, cerdo y olor de comida.

Lengua limpia, salivación intensa (sialorrea 285/III) y ausencia de sed.

Sensación de estómago relajado como si colgara (321/II).

Vómitos al toser(347/II), después de comer (346/II), después de agacharse(346/I).

ARSENICUM

Náuseas por oler, mirar, o pensar en comida.

Vómitos biliosos(348/II) oscuros o negros(350/I), malolientes (349/III) violentos(347/III), vomita todo(350/III);< por movimiento (347/II), por la menor ingestión de comida o inmediatamente después de beber(346/I) **aún un sorbito de agua, acompañados de diarrea (346/III).**

Con ansiedad , inquietud, temor a la muerte y deseo de compañía.

NAUSEAS Y VOMITOS

NUX VOMICA

Náuseas constantes, después de comer, fumando o luego de, etc.
 Vómitos alimenticios (349/I), biliosos (348/II), amargos(348/II)
 Después de cólera(346/II), intoxicación(347/I), grandes ingestas
 (luego de una hora) y con palpitaciones(347/II).
 Sensación de peso (340/III) e hinchazón(324/I) en epigastrio,
 necesidad de aflojarse la ropa(342/II).
 Provoca el vómito con gran alivio posterior.

PHOSPHORUS

Náuseas por poner las manos en agua caliente o bebidas calientes
 Vómitos incesantes (347/I), con sed inextinguible (344/I) **de agua helada que es vomitada apenas el agua se entibia en el estómago** (346/I), acompañados de náuseas que mejoran después de beber (338/II) agua helada y sensación de vacío gástrico(343/III).
 Vómitos biliosos, de sangre roja o negra, o como borra de café(349/I).

NAUSEAS Y VOMITOS

ANTIMONIUM TARTARICUM

Clarke : “Es uno de los mejores medicamentos en náuseas, es tan intensa cómo Ipeca , pero menos persistente y mejora con el vómito.”

Náuseas mortales con ansiedad , miedo e inquietud.

Sudor en la frente, < al ver la comida.

Arcadas con vómitos muy dificultosos, dolorosos, que lo llevan a **un estado de sofocación y de profunda ansiedad, como si fuera a morir**; a medida que vomita, cada vez está **más agotado y somnoliento**. Vómitos con gran cantidad de mucus espeso, blanco, viscoso. Vómitos: durante la fiebre; al toser, en el paludismo.

Lengua sucia , amarillo oscura y sed de agua fría.

APOMORPHINUM

En embarazos o mal de mar. Vómitos fáciles, bruscos, sin náusea previa. Acompañados de sudores, sialorrea, lagrimeo y postración.

NAUSEAS Y VOMITOS

TABACUM

Náuseas mortales, persistentes, o intermitentes, durante el embarazo.

Vómitos viajando en vehículo o en embarazo.

<por el menor movimiento, en habitación calurosa, >al aire libre y destapándose el vientre.

Se acompañan de palidez de la cara, sudor frío y mareos y abdomen frío.

Sensación de vacío en el estómago.

Gran preventivo con Cócculus de mareos por viaje en barco, auto o avión.

IRIS VERSICOLOR Kitchen “El remedio más efectivo e importante en vómitos de toda clase”

Todo el tubo digestivo , de boca a ano quema como fuego.

Vómitos muy ácidos. Crisis de vómitos de mucosidades viscosas y filamentosas.

Todo el contenido gástrico parece convertirse en vinagre, con ardor de estómago que se extiende a la boca. Vómitos de **leche agria en niños** .

HEMORROIDES



HEMORROIDES

AESCULUS

Congestión venosa, especialmente en sistema portal y hemorroidal.
 Tiene - SENSACIÓN DE PLENITUD, COMO SI FUESE A ESTALLAR.
 - color rojo azulado o púrpura de la zona (hemorroides).

Dolor en recto como si lo tuviera lleno de pequeñas astillas(392/I),
 clavante (392/I) con calor, pesadez, ardor, sequedad y prurito,
 aparece 1h. luego de evacuar , <caminando.

> Arrodillado. Hemorroides externas, crónicas y grandes(397), a veces impiden la evacuación(397/I). SE ACOMPAÑA DE DOLOR SACRO - LUMBAR **PULSÁTIL**.

ALOE

Hemorroides como racimos de uvas(azules(396/III)),
 no tolera el menor contacto (sangran con facilidad), **con prurito** ,
 dolor ardiente > con agua fría.

Sensación de inseguridad del esfínter anal. Salen heces al orinar y al eliminar gases(Involuntaria defecación -398/I y II).

HEMORROIDES

MURIATICUM ACIDUM

Estados de gran postración, fiebre alta, ojos semicerrados , mandíbula colgante, se desliza y hunde en la cama , boca y lengua seca como cuero e incontinencia(defecación oscura líquida o hemorrágica al orinar).

Las hemorroides están hinchadas, **AZULADAS, TAN SENSIBLES AL TACTO QUE NO TOLERA NI EL ROCE DE LAS SÁBANAS** con dolores ardientes de mañana y al evacuar. Sangran periódicamente.

- No tolera el < contacto(al limpiarse agr.).
- > **por calor** y < frío.

COLLINSOIA

Medicamento de congestión venosa portal y pélvica ---- dismenorrea y hemorroides; **DE CONSTIPACIÓN OBSTINADA + HEMORROIDES.**
HEMORROIDES DE LOS ÚLTIMOS MESES DEL EMBARAZO.

Hemorroides dolorosas y **SANGRANTES** , con sensación de tener el recto lleno de arena o astillas que < al evacuar

HEMORROIDES

NUX VOMICA

Hemorroides INTERNAS(397/I) dolorosas, pinchan, arden y pican.
 <por caminar, después de comer(dolor punzante- 393/II)
 Dolores cortantes y pinchantes, luego de evacuar.
 H. congestionadas en bebedores con irritabilidad y violencia.

RATANIA

Constipación con heces duras , expulsadas con gran esfuerzo y con protrusión de hemorroides cuando defeca seguido de dolores ardientes , punzantes o pinchantes como astillas, que se prolongan hasta varias horas después de evacuar , como si el recto ESTUVIERA LLENO DE TROZOS DE VIDRIO.
 < sentado y por moverse, > por baños de asiento fríos.

HEMORROIDES

HAMAMELIS

Centro de acción: paredes venosas, donde produce **su dilatación o ruptura**, que lleva a hemorragia de sangre venosa, pasivas, **negras(396/III)** y que coagulan con dificultad.
 Hemorroides azuladas que sangran con la evacuación y con gran postración desproporcionada a la pérdida.
 Dolor por el < contacto(Vijnovsky). Prurito anal. Pulsación en el recto estando sentado(399/III-Vijnovsky)

PAEONIA

Hemorroides con **ulceraciones perianales** muy dolorosas y sangrantes, con humedad anal constante fétida(397/III- G. Vithoulkas), **sensación de ano hinchado (397/II)**y dolores intolerables **después de la defecación**. Tiende a úlceras, fístulas, fisuras y abscesos.

METEORISMO



FLATULENCIA

Argentum Nitricum

Gran flatulencia (378/I)(395/II) encarcerada(obstruida) después de comer, peor azúcar y dulces. Abdomen distendido y timpánico, eliminando mejora (396/I)

Carbo Vegetabilis

Enorme flatulencia , más en hipocondrios, sensación de plenitud, >al aflojar la ropa y eliminado flatos, que son incesantes, calientes, fétidos. Predomina en la parte superior del vientre.

China

Enorme distensión flatulenta del vientre, luego de beber o comer(sobretudo frutas)con gran fermentación intestinal, timpanismo, flatulencia obstruida que no mejora eliminando gases.

Lycopodium

Excesiva flatulencia , más en bajo vientre, ruidosos borborismos, distensión abdominal , peor de 16 a 20hs, en los hipocondrios, antes y después de defecar y > al eliminarlos y aflojándose la ropa.



CONSTIPACION

CONSTIPACIÓN: Recto 385/III

Evacuación infrecuente, con heces duras pero hay deseo evacuatorio.

INACTIVIDAD 397/III : cierta atonía rectal y falta de deseo evacuatorio.


PARÁLISIS 398/II: cuadro permanente.

ALUMINA: Heces que salen con grandes esfuerzos, aún siendo blandas; inactividad rectal .Constipación cuando viaja, evacua parado.

COLLINSONIA: constipación obstinada con heces dolorosas, y hemorroides sangrantes y dolorosas. Sensación de tener el recto lleno de astillas.

NUX VOMICA: deseos constantes, pero ineficaces de evacuar o heces secas duras o grandes, expulsadas en pequeña cantidad. Por abuso de laxantes, en viejos, embarazo o viajes. Constricción del ano.

OPIUM: total inactividad rectal y sin deseos por abuso de laxantes y hábitos sedentarios. Heces retroceden cuando habían empezado a salir y como pelotas negras duras y redondas.



DIGESTION LENTA

DIGESTION LENTA

ANTIMONIUM CRUDUM

Digestión alterada en viejos, con asco, eructos con gusto y olor a comida, náuseas constantes pensando en comida, vómitos agotadores y sensación de plenitud, con lengua cubierta por una capa blanca(272/II) y lechosa(272/III).

CARBO VEGETABILIS

Indigestión por comer manteca (819/I), grasa, cerdo, bebidas frías, con distensión gástrica y sensación de plenitud, que mejora eructando (355/II) y aflojando la ropa(851/I).

CHELIDONIUM

Digestión alterada por insuficiencia Hepática. Cefalea sobre ojo derecho, gusto amargo, el estómago sólo tolera líquidos calientes, náusea con dolor en hígado(360/II-III) que se extiende al ángulo inferior e interno (361/II)del omóplato derecho.

DIGESTION LENTA

NUX VOMICA

Posterior a excesos en ingesta de café, bebidas alcohólicas, alimento, comidas frías, leche, grasas, farináceos, etc. y por exceso de actividad mental.

Cefalea y somnolencia post prandial. Se afloja la ropa, el cinturón, necesidad de vomitar que lo alivia, lengua blanco amarillenta y sensación de piedra en el estómago y gran flatulencia abdominal.

Irritabilidad e impaciencia

LYCOPodium

Posterior a alimentos flatulentos (porotos, chauchas, cebollas, repollos, comidas frías, ostras y mariscos.

Mucha sensación de plenitud postprandial(aún poca cantidad) , eructos ardientes e incompletos, ardor intolerable y persistente en la faringe, flatulencia y distensión abdominal(> eliminando gases)

DIGESTION LENTA

PULSATILLA

Se enferma por grasas(819/II), cerdo(336/III-818/III)), crema, manteca(819/I), helados(336/III), etc.

Distensión abdominal, pesadez y dolor gástrico DESPUÉS DE COMIDA GRASOSA(325/III) náuseas, vómitos(345/III), regurgitaciones (eructos, comida 333/II) y eructos con gusto a comida(333/III), nauseabundos(334/I) o sebo rancio(334/III) y absoluta ausencia de sed(343/I).

