

# SEGUNDA PRESCRIPCION

*Dra. Elena Figari*

Se entiende por segunda  
prescripción a aquella que  
sigue a la primera que ha  
actuado en el paciente

# Se prescribe por segunda vez

- Cuando la acción de la 1° Prescripción se detiene
- Cuando aparecen síntomas que no indican mejoría general del paciente.
- Cuando reaparecen síntomas característicos que ya habían mejorado
- Cuando transcurrido un tiempo prudencial los síntomas auxiliares se mantienen o aumentan

# COMO PRESCRIBIR

- Mismo medicamento, igual potencia.
- Mismo medicamento, distinta potencia.
- Cambio de medicamento.

# TENER EN CUENTA

- ESTADO GENERAL
- ESTADO DE LOS SÍNTOMAS
  - Guías
  - Auxiliares

# Síntomas Guías

- Agrupados y jerarquizados en la toma del caso llevan a la prescripción
- Individualizan el caso y señalan lo digno de curar
- Deben modificarse en su mayoría para que el paciente logre su adaptación al medio

# Síntomas Auxiliares

- Corresponden a la enfermedad actual.
- No se repertorizan pero se tienen en cuenta para la evolución del caso.
- Son los últimos en mejorar


# Evaluación del Tratamiento

- El Enfermo
- El Medicamento
- La Potencia utilizada



# Prolongada agravación con lento desmejoramiento del enfermo

- Significa:
  - potencia muy elevada
  - caso incurable(grave enfermedad orgánica).
- Segunda prescripción:
  - mismo medicamento a potencia inferior(30 ó 200)
  - nuevo medicamento




- **1ra. observación de Kent**

# Fuerte y prolongada agravación con lenta mejoría

- Significa:

- potencia muy elevada
- reacción vital débil
- Caso casi incurable (procesos lesionales en órganos vitales)




- Segunda Prescripción:

- mismo medicamento a potencia mas baja.
- repetir con más frecuencia el medicamento.

- **2da. observación de Kent**

# Agravación intensa y breve seguida de mejoría sostenida.


- Significa:
  - Medicamento correcto pero potencia alta.
  - No hay lesiones orgánicas en órganos nobles, puede haber en superficie.
  - Buen pronóstico
- Segunda prescripción:
  - Esperar (si se estacionan o reaparecen s. guías)
- Mismo remedio
- misma potencia



- *3ra observación de Kent*

# Mejoría sostenida sin agravación previa.

- Significa:
  - Medicamento correcto
  - Potencia correcta
  - reacción vigorosa
  - No hay enfermedad orgánica ni tendencia a enfermedad orgánica (sólo funcional)
  - buen pronóstico
- Segunda prescripción:  
*Igual a la anterior*




- **4ta. observación de Kent**

# Mejoría inicial seguida de agravación

- Significa:
  - Acción psicológica del médico.
  - Medicamento Similar
  - Caso incurable?
- Segunda prescripción


La verdadera evolución tendrá lugar luego que ceda la agravación.



- **5ta. observación de Kent**

# Pequeña agravación inicial y alivio demasiado corto de los síntomas

- Significa:
  - baja potencia
  - Mejoría corta dice de alteraciones estructurales y órganos están destruidos o en vía de destrucción-Kent)
  - interferencia en la marcha del tratamiento (noxas naturales o m. supresoras)
- Segunda Prescripción:
  - mismo remedio, o potencia superior
  - nuevo medicamento
  - suprimir interferencias




- **6ta. observación de Kent**

# Mejoría de los síntomas sin alivio del enfermo

- Significa:

- medicamento equivocado
- supresión homeopática
- trastornos orgánicos con bloqueo de emuntorios (1 sólo riñón, cambios fibrinosos, pulmones con trabajo limitado)
- pronóstico reservado




- Segunda prescripción:

- cambio de medicamento

- **7ma. observación de Kent**

# Enfermos comprueban o reexperimentan los remedios

- Segunda Prescripción
  - cambio de potencia
  - nuevo medicamento



- *8va. observación de Kent*




# Acción de los medicamentos sobre los experimentadores

- *9na. observación de Kent*

# Aparición de smas. nuevos sin modificación del cuadro general o local

- Significa:
  - medicamento no homeopático
- Segunda Prescripción:
  - cambio de medicamento




- **10ma. observación de Kent**

# Agr. corta seguida de mejoría, con retorno de síntomas antiguos en orden inverso a su aparición

## Significa:

- Medicamento correcto.
- Fuerza vital conservada.
- Buen pronóstico

- Segunda prescripción:
- mismo remedio
- misma potencia



- **11ma. observación de Kent**

# Los síntomas toman una dirección equivocada

- Significa:
  - Durante el tratamiento de una dolencia local con agravación o localización en órganos más importantes (contra la ley de curación)
  - Metástasis mórbida.
- Segunda prescripción:
  - Antidotar, reconsiderar el caso.
- **12ma. observación de Kent**

# Muchas Gracias

*Dra. Elena Figari*