











~~Grignard reagent~~




クロマチン

何らかの反応で (12)



F



17. A





T.




1)


32の最長



~~X~~



I. H₂付加で不斉炭素2つ → 対称になった



a. 1,2位に
 b. 不斉
 c. ~~不斉炭素~~
 類しなくなった

解法フローチャート

問題ごとに、答えに至るまでに使った手筋を並べたもの。1手 = 与件を1つ使って結論を1つ出す単位。赤で示したものは、設問の一部だけなら短い手数で届く近道のルート。

東京大学 東京大1 I	12手	名古屋大学 名古屋大・前3	8手
岡山大学 岡山大3	9手	九州大学 九州大・前4	6手
東北大学 東北大・後3	13手	神戸大学 神戸大3	10手
熊本大学 熊本大・前3	11手	香川大学 香川大4	5手
学習院大学 学習院大3 3-1	4手	東海大学 東海大5	6手

☐ 読み取り ☐ 絞り込み ☐ 変換 ☐ 計算 ☐ 数え上げ ☐ 組み立て

東京大学 東京大1 I

2021年入試 ★ 構造式の決定・脂肪族化合物の反応に関する総合

12手 (標準) 3手 ヨードホルム陽性から B だけ先に取り (-4)

5手 A はエーテルと決めてから数え上げる (-5)

