





問 2





1-ヒドロキシ

鎖状 2重結合


3107-1




元素分析は $C_{13}H_{16}O_4$








不飽和度 2 COOH の存在、
 C 数から骨格は 1通り




不飽和度 2





(X) 山



52.





元素分析はやらなくとも





不事 $COOH$ のぞくと、
 C2 位の 2-置換は1通り



不事条件 1 通り







岡山大学 岡山大3 2021年


9 手

3つに割れた断片を1つずつ決める

1. 分子式から不飽和度を出す
(基本) $C_{13}H_{16}O_4 \rightarrow$ 不飽和度62. エステルの加水分解から
アルコールと酸を割り出す
(基本)1mol から B・C・D が
1mol ずつ $\rightarrow$ エステル結合
2つ3. 炭酸水素ナトリウムで二
酸化炭素が出るか (基本)B は $NaHCO_3$ で気体 $\rightarrow$ カ
ルボン酸。トルエンの
 $KMnO_4$ 酸化物と同じ = 安
息香酸4. 元素分析から組成式・分
子式を出す (基本)C は 15mg $\rightarrow CO_2$ 22mg・
 H_2O 9.0mg、分子量90 $\rightarrow$
 $C_3H_6O_3$

5. 炭酸水素ナトリウムで二

たよてい



ここで
2価エステル型
アミド

C2の異性
1通り
(アルカンのように)

Cの数の絞り込み

たぐって見れば

手順に当てて
O・Cの絞り込み
・不飽和度の
絞り込み

書き起こし済み (問題文/okayama-2021-zenki-3.md) と照合。読み取り一致

九州大学 九州大・前4

2021年入試 ★ アルケンと誘導体・異性体

6手 (標準)