


4. 大例!




A



同左





よって、これで確定



O_3 分解で1種

$\rightarrow$ 左右対称、or 開環でなく

(不) かつ、左右対称



2つ F は F° と F° の間
 or F° と F°

(1)




アセトンと、 H_2O

H.

Aと同じで、左右対称。

かつ、エーテルも



二つの 180° のみ

問 5. E-H のうち、 $\frac{C \text{ の相対質量 }}{\text{分子量}}$ が $\frac{D}{E}$ のもの。

E	C_3H_6O
F	C_2H_4O
G	C_4H_8O
H	C_3H_6O

C が 14 なのは、D の 28 倍

(F)

C_2H_4O
(44)
10mg

$\rightarrow$ $2CO_2$
(88)
20mg

C
 C_6H_{12}
(84)
21mg

2H

$\rightarrow$ $2 \times \frac{1}{4}$

$\rightarrow$ $\frac{2CHI_3}{(28 \times 39)} \times \frac{1}{4}$
 $\rightarrow$ $70mg$ $197mg$

九州大学 九州大・前4
2021年

6 手

オゾン分解でアルケンを割り出す

1. 分子式から不飽和度を出す
〈基本〉
分子式から不飽和度を出す

2. 水素が付加するか 〈基本〉
アルケンであることを確かめる

A, Bのみ

3. オゾン分解で二重結合の位置を割り出す 〈発展〉
A のオゾン分解で得たカルボニルが1種類 → A は対称なアルケン

開環も
OKとす

4. シス・トランスを決める
〈基本〉
幾何異性体をすべて挙げる

決まるかい

5. 不斉炭素原子の有無・数
で絞る 〈基本〉
HCl 付加で不斉炭素が生じる位置を見る

同じ枝を
つけないように
する