

课堂练习1

练习1: 证明式 $Tr(\mathbf{AB}) = Tr(\mathbf{BA})$

证明: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, $\mathbf{B} = (b_{ij})$, 其中 \mathbf{A} 、 \mathbf{B} 为 n 级矩阵, 则有:

$$Tr(\mathbf{AB}) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{AB})_{ii} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \right), \quad Tr(\mathbf{BA}) = \sum_{k=1}^n (\mathbf{BA})_{kk} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \right)$$

(交换求和顺序不影响最终结果)

因此 $Tr(\mathbf{AB}) = Tr(\mathbf{BA})$

练习2: 证明如果 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T} = \mathbf{A}$, 则有 $Tr(\mathbf{B}) = Tr(\mathbf{A})$

证明: 由练习1的结论得:

$$Tr(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T}) = Tr(\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{B}\mathbf{T})) = Tr((\mathbf{B}\mathbf{T})\mathbf{T}^{-1}) = Tr(\mathbf{B}(\mathbf{T}\mathbf{T}^{-1})) = Tr(\mathbf{B})$$

又由题可知 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T} = \mathbf{A}$, 故 $Tr(\mathbf{B}) = Tr(\mathbf{A})$

练习3: 用 3×3 矩阵的行列式验证式(18), 其中式(18)的形式为

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) = |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} \equiv \sum_I^{n!} (-1)^{P_I} \hat{P}_I A_{11} A_{22} \cdots A_{nn} \\ &= \sum_I^{n!} (-1)^{P_I} A_{I_1 1} A_{I_2 2} \cdots A_{I_n n} = \sum_I^{n!} (-1)^{P_I} A_{1 I_1} A_{2 I_2} \cdots A_{n I_n} \end{aligned}$$

证明: 自然数1~3的排列为 $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$; 相应的, 互换次数为 $P_{(1,2,3)} = 0$, $P_{(1,3,2)} = 1$, $P_{(2,1,3)} = 1$, $P_{(2,3,1)} = 2$, $P_{(3,1,2)} = 2$, $P_{(3,2,1)} = 1$ 。因此对 3×3 矩阵的行列式, 有:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) = |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{P_{(1,2,3)}} A_{11} A_{22} A_{33} + (-1)^{P_{(1,3,2)}} A_{11} A_{23} A_{32} + (-1)^{P_{(2,1,3)}} A_{12} A_{21} A_{33} \\ &\quad + (-1)^{P_{(2,3,1)}} A_{12} A_{23} A_{31} + (-1)^{P_{(3,1,2)}} A_{13} A_{21} A_{32} + (-1)^{P_{(3,2,1)}} A_{13} A_{22} A_{31} \\ &= A_{11} A_{22} A_{33} - A_{11} A_{23} A_{32} - A_{12} A_{21} A_{33} + A_{12} A_{23} A_{31} + A_{13} A_{21} A_{32} - A_{13} A_{22} A_{31} \end{aligned}$$

这与 3×3 矩阵的行列式定义 (即式(15)) 一致

习题1.1

1. 考虑由四个复数 a, b, c, d 构成的如下 2×2 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$

1) 满足什么条件时 \mathbf{A} 是个厄米矩阵? 2) 满足什么条件时 \mathbf{A} 是个么正矩阵? 3) 满足什么条件时 \mathbf{A} 可逆 (存在逆矩阵)? 写出 \mathbf{A} 的逆矩阵具体表达式。

解: 1)若 \mathbf{A} 是个厄米矩阵, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\dagger$, 其中 $\mathbf{A}^\dagger = \begin{bmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{bmatrix}$, 则 $\begin{cases} a = a^* \\ c = b^* \\ b = c^* \\ d = d^* \end{cases}$, 故当 a, d 皆为实数, 而

b, c 互为共轭复数时, \mathbf{A} 是个厄米矩阵

2)若 \mathbf{A} 是个么正矩阵, 则 $\mathbf{A}\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}^\dagger\mathbf{A} = \mathbf{I}$, 又 $\mathbf{A}\mathbf{A}^\dagger = \begin{bmatrix} aa^* + cc^* & ab^* + cd^* \\ ba^* + dc^* & bb^* + dd^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$$\mathbf{A}^\dagger\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a^*a + b^*b & a^*c + b^*d \\ c^*a + d^*b & c^*c + d^*d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故由——对应得, 当 $\begin{cases} aa^* = dd^* \Leftrightarrow |a| = |d| \\ bb^* = cc^* \Leftrightarrow |b| = |c| \\ aa^* + bb^* = 1, cc^* + dd^* = 1 \\ ba^* + dc^* = 0, ac^* + bd^* = 0 \end{cases}$ 时, \mathbf{A} 是个么正矩阵。

3)若 \mathbf{A} 可逆, 则存在矩阵 \mathbf{B} , 使得 $\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A} = \mathbf{I}$, 容易验证, 当 $\mathbf{B} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$, 其中

$|\mathbf{A}| = \det(\mathbf{A}) = ad - bc$ 时, 有

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix}, \text{ 若要进一步变为单位矩阵,}$$

需要 $ad - bc \neq 0$, 否则原式无意义

因此, 当 $ad - bc \neq 0$ 时, \mathbf{A} 可逆, 此时逆矩阵为 $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$

2.证明: 如果两个厄米矩阵 \mathbf{A} 和 \mathbf{B} 的乘积 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}$ 也是厄米矩阵, 那么 \mathbf{A} 和 \mathbf{B} 一定对易

证明: 因为 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^\dagger$, 其中 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}$, $\mathbf{C}^\dagger = (\mathbf{A}\mathbf{B})^\dagger = \mathbf{B}^\dagger\mathbf{A}^\dagger$, 故 $\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}^\dagger\mathbf{A}^\dagger$

又由题意知 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\dagger$, $\mathbf{B} = \mathbf{B}^\dagger$, 故结合得 $\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A}$, 即 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{A}\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{A} = 0$, 从而 \mathbf{A} 与 \mathbf{B} 一定对易, 证毕

3.从行列式一般定义 (或 2×2 矩阵) 出发证明 (验证) 上面行列式的性质

证明: 在证明前, 我们定义矩阵 $\mathbf{A} = (A_{ij})$, $\mathbf{B} = (B_{ij})$, 其中 \mathbf{A}, \mathbf{B} 为 n 级矩阵, 此外, 我们还会利用

行列式的定义, 以及行列式的余子式展开 $|\mathbf{A}| = \sum_{i=1}^n A_{ij} \text{cof}(A_{ij}), \forall j = 1, 2, \dots, n$

定理1的证明: 若矩阵的某一行矩阵元都为零, 如矩阵 \mathbf{A} 的第 i 行为零, 则有:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = 0 \times \text{cof}(A_{i1}) + 0 \times \text{cof}(A_{i2}) + \dots + 0 \times \text{cof}(A_{in}) = 0$$

同理可得, 矩阵的某一列矩阵元均为零

定理2的证明: 以上三角矩阵为例, 其对应的行列式为:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ 0 & 0 & A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = A_{11} \begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ 0 & A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} + \sum_{i=1}^n 0 \times \text{cof}(A_{i1}) = A_{11} \begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ 0 & A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} \\ &= A_{11} (A_{22} \begin{vmatrix} A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} + \sum_{i=2}^n 0 \times \text{cof}(A_{i2})) = A_{11} A_{22} \begin{vmatrix} A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = \dots = \prod_{i=1}^n A_{ii} \end{aligned}$$

下三角矩阵对应的行列式的计算方法同理，特别的，对角矩阵是上（下）三角矩阵的特殊情形
定理3的证明：以下只讨论交换两行的情形，设有如下行列式：

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{l1} & A_{l2} & \dots & A_{ln} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix}, \quad |\mathbf{A}_{\text{swap}}| = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A'_{l1} & A'_{l2} & \dots & A'_{ln} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A'_{m1} & A'_{m2} & \dots & A'_{mn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix}$$

其中 $A'_{li} = A_{mi}$, $A'_{mi} = A_{li}$, $\forall i = 1, 2, \dots, n$

对 $|\mathbf{A}|$ 和 $|\mathbf{A}_{\text{swap}}|$ 分别按行展开，有 $|\mathbf{A}| = \sum_I (-1)^{P_I} A_{1I_1} \dots A_{lI_l} \dots A_{mI_m} \dots A_{nI_n}$,

$|\mathbf{A}_{\text{swap}}| = \sum_I (-1)^{P_I} A_{1I_1} \dots A'_{lI_l} \dots A'_{mI_m} \dots A_{nI_n}$,

结合前述性质知， $|\mathbf{A}|$ 中 $A_{1I_1} \dots A_{lI_l} \dots A_{mI_m} \dots A_{nI_n}$ 这一项在 $|\mathbf{A}_{\text{swap}}|$ 中为 $A_{1I_1} \dots A'_{lI_m} \dots A'_{mI_l} \dots A_{nI_n}$ ，而对应的置换操作满足 $\hat{P}_{(1 \dots I_l \dots I_m \dots I_n)} = \hat{P}_{(1 \dots I_m \dots I_l \dots I_n)} \hat{P}_{I_m I_l}$ ，即操作数相差1，故 $A_{1I_1} \dots A_{lI_l} \dots A_{mI_m} \dots A_{nI_n}$ 这一项在 $|\mathbf{A}|$ 和 $|\mathbf{A}_{\text{swap}}|$ 中系数相反，从而 $|\mathbf{A}_{\text{swap}}| = -|\mathbf{A}|$ ，证毕。同理可得该定理对列交换也成立

定理4的证明：利用定理3可知，若 $|\mathbf{A}|$ 存在相同的两行（或两列），则相互交换后，有 $|\mathbf{A}_{\text{swap}}| = -|\mathbf{A}|$ ，但由于相互交换的两行（或两列）相同，因此交换后行列式不变，即 $|\mathbf{A}_{\text{swap}}| = |\mathbf{A}|$ ，联立可得 $|\mathbf{A}| = -|\mathbf{A}|$ ，即 $|\mathbf{A}| = 0$ ，证毕

定理5的证明：为讨论方便，我们令 $\mathbf{B} = (B_{ij}) = (A_{ji})$ ，此时 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$

由行列式定义，对 $|\mathbf{A}|$ 按行展开，有 $|\mathbf{A}| = \sum_I (-1)^{P_I} A_{1I_1} A_{2I_2} \dots A_{nI_n}$ ；按列展开，有

$|\mathbf{A}| = \sum_I (-1)^{P_I} A_{I_1 1} A_{I_2 2} \dots A_{I_n n}$ 。这两种展开是相同的。

另一方面，对 $|\mathbf{B}|$ 按行展开，有

$|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}^T| = \sum_I (-1)^{P_I} B_{1I_1} B_{2I_2} \dots B_{nI_n} = \sum_I (-1)^{P_I} A_{I_1 1} A_{I_2 2} \dots A_{I_n n}$ ，恰好为对 $|\mathbf{A}|$ 按列展开，

因此有 $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| = |\mathbf{A}^T|$

定理6的证明：仿照定理5的证明，令 $\mathbf{B} = (B_{ij}) = (A_{ji}^*)$ ，此时 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\dagger$ 。分别展开 $|\mathbf{A}|$ 和 $|\mathbf{B}|$ 得：

$$|\mathbf{A}| = \sum_I (-1)^{P_I} A_{1I_1} A_{2I_2} \dots A_{nI_n} = \sum_I (-1)^{P_I} A_{I_1 1} A_{I_2 2} \dots A_{I_n n}$$

$$|\mathbf{B}| = |\mathbf{A}^\dagger| = \sum_I (-1)^{P_I} B_{1I_1} B_{2I_2} \dots B_{nI_n} = \sum_I (-1)^{P_I} A_{I_1 1}^* A_{I_2 2}^* \dots A_{I_n n}^*$$

让 $|\mathbf{A}|$ 取复共轭，得 $|\mathbf{A}|^* = [\sum_I (-1)^{P_I} A_{I_1 1} A_{I_2 2} \dots A_{I_n n}]^* = \sum_I (-1)^{P_I} A_{I_1 1}^* A_{I_2 2}^* \dots A_{I_n n}^*$ ，从而得

$|\mathbf{A}|^* = |\mathbf{B}| = |\mathbf{A}^\dagger|$

定理7的证明：此处要用到Laplace定理，记 $\mathbf{A} =$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{bmatrix}$ ，再记对角矩阵为 \mathbf{I} ，零矩阵为 \mathbf{O} ，则我们可以将以上矩阵拼接为

$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}$, 其对应的行列式为:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{vmatrix}$$

根据Laplace定理, 对该行列式按前 n 行展开, 则因该行列式中前 n 行除去最左上角的 n 级子式外, 其余的 n 级子式均含有一个全零列 (即其余 n 级子式均等于零), 因此

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$$

接下来, 根据定理4, 我们可以将行列式的一行 (或一列) 乘上一个系数, 加在行列式的另一行 (或另一列) 上, 而行列式的值不变。从而, 将第 $(n+1)$ 行乘以 A_{11} , 再加在第一行上; 将第 $(n+2)$ 行乘以 A_{12} , 再加在第一行上;; 以此类推, 直至将第 $2n$ 行乘以 A_{1n} , 再加在第一行上。由此可得:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{in} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{vmatrix}$$

同理, 将第 $(n+1)$ 行乘以 A_{21} , 再加在第二行上; 将第 $(n+2)$ 行乘以 A_{22} , 再加在第二行上;; 以此类推, 直至将第 $2n$ 行乘以 A_{2n} , 再加在第二行上。由此可得:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{in} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{vmatrix}$$

继续如此迭代, 最终结合Laplace定理, 得到:

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{in} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{in} \\ -1 & 0 & \dots & 0 & B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{in} \\ \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{in} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} \cdot (-1)^{\left(\sum_{i=1}^n i\right) + \sum_{i=1}^n (n+i)} \\
&= \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{1i} B_{in} \\ \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{2i} B_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{i1} & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{i2} & \dots & \sum_{i=1}^n A_{ni} B_{in} \end{vmatrix} = |\mathbf{AB}|
\end{aligned}$$

因此 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

定理8的证明：将题中行列式按第*i*列（即和式出现的那一列）展开余子式得：

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & \sum_{k=1}^m c_k B_{1k} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & \sum_{k=1}^m c_k B_{2k} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & \sum_{k=1}^m c_k B_{nk} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^m c_k B_{1k} (-1)^{1+i} \begin{vmatrix} A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ A_{31} & A_{32} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} + \sum_{k=1}^m c_k B_{2k} (-1)^{2+i} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{31} & A_{32} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} + \dots + \sum_{k=1}^m c_k B_{nk} (-1)^{n+i} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \dots & A_{n-1,n} \end{vmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^m c_k [B_{1k} (-1)^{1+i} \begin{vmatrix} A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ A_{31} & A_{32} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} + B_{2k} (-1)^{2+i} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{31} & A_{32} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} + \dots + B_{nk} (-1)^{n+i} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \dots & A_{n-1,n} \end{vmatrix}] \\
&= \sum_{k=1}^m c_k \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & B_{1k} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & B_{2k} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & B_{nk} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

该命题也适用于行中出现相同形式和式的情形

4. 证明将矩阵的任一行（列）加上另外一行（列）乘以一个常数所得新的矩阵的行列式与原矩阵行列式相等，以3×3矩阵为例，

$$\begin{vmatrix} A_{11} + aA_{12} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} + aA_{22} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} + aA_{32} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix}$$

证明：根据第3题第8点性质，可得：

$$\begin{vmatrix} A_{11} + aA_{12} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} + aA_{22} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} + aA_{32} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} aA_{12} & A_{12} & A_{13} \\ aA_{22} & A_{22} & A_{23} \\ aA_{32} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} A_{12} & A_{12} & A_{13} \\ A_{22} & A_{22} & A_{23} \\ A_{32} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix}$$

再由第3题第4点性质，得 $a \begin{vmatrix} A_{12} & A_{12} & A_{13} \\ A_{22} & A_{22} & A_{23} \\ A_{32} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = 0$ ，故有

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} A_{12} & A_{12} & A_{13} \\ A_{22} & A_{22} & A_{23} \\ A_{32} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix}, \text{证毕}$$

课堂练习2

练习1：证明 S_2 是个二维的复数线性空间

证明：易知 S_2 是个二维的复数线性空间 \Leftrightarrow 线性无关的向量（右矢）个数最多有两个，故先设两个右

矢： $|a\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ ， $|b\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ，满足 $n_a|a\rangle + n_b|b\rangle = 0$ ，则有 $\begin{cases} n_a a_1 + n_b b_1 = 0 \\ n_a a_2 + n_b b_2 = 0 \end{cases}$ ，由此得

$\begin{cases} n_b(b_1 a_2 - b_2 a_1) = 0 \\ n_b(a_1 b_2 - a_2 b_1) = 0 \end{cases}$ 。对以上情形，只要保证 $\begin{cases} a_1, a_2, b_1, b_2 \neq 0 \\ a_1 b_2 \neq b_1 a_2 \end{cases}$ ，即可得到 $n_a = n_b = 0$ ，从而

$|a\rangle$ 与 $|b\rangle$ 线性无关，即 S_2 中线性无关的向量（右矢）个数可以为两个。

接下来，我们还要证明 S_2 中线性无关的向量（右矢）个数不能为三个或更多个。设三个右矢：

$|a\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ ， $|b\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ， $|c\rangle = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ ，满足 $n_a|a\rangle + n_b|b\rangle + n_c|c\rangle = 0$ ，则有

$\begin{cases} n_a a_1 + n_b b_1 + n_c c_1 = 0 \\ n_a a_2 + n_b b_2 + n_c c_2 = 0 \end{cases}$ ，该方程组中齐次线性方程的个数小于变量个数，故有无穷组非零解，从

而存在不全为零的 n_a, n_b, n_c ，使 $n_a|a\rangle + n_b|b\rangle + n_c|c\rangle = 0$ ，即 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 线性相关。对更多右矢的情形，同理可证它们均满足线性相关。

综上， S_2 是个二维的复数线性空间。

注：如果不用线性方程组的性质，第二部分亦可按如下说明：由 $\begin{cases} n_a a_1 + n_b b_1 + n_c c_1 = 0 \\ n_a a_2 + n_b b_2 + n_c c_2 = 0 \end{cases}$ ，得

$\begin{cases} n_b(b_1 a_2 - b_2 a_1) + n_c(c_1 a_2 - c_2 a_1) = 0 \\ n_a(a_1 b_2 - a_2 b_1) + n_c(c_1 b_2 - c_2 b_1) = 0 \\ n_a(a_1 c_2 - a_2 c_1) + n_b(b_1 c_2 - b_2 c_1) = 0 \end{cases}$ ，若 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 线性无关，则前提条件为 $\begin{cases} a_1 b_2 \neq a_2 b_1 \\ b_1 c_2 \neq b_2 c_1 \\ c_1 a_2 \neq c_2 a_1 \end{cases}$

（否则在 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 中取任意一对向量，必满足线性相关，矛盾！），此时可得到如下比例关系：

$n_a : n_b : n_c = (b_1 c_2 - b_2 c_1) : (c_1 a_2 - a_1 c_2) : (a_1 b_2 - a_2 b_1)$ ，从而存在不全为零的 n_a, n_b, n_c ，使 $n_a|a\rangle + n_b|b\rangle + n_c|c\rangle = 0$ ，即 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 线性相关，这与 $|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 线性无关矛盾。对更多右矢的情形，同理可证它们均满足线性相关。

练习2：证明任意矢量用一组基矢的展开是唯一的

证明：反证法，设 $|\alpha\rangle$ 在基矢 $\{|u_i\rangle\}$ 下存在至少两种展开 $|\alpha\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i |u_i\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha'_i |u_i\rangle$ ，其中 α_i 与 α'_i 不全相等，则移项得 $\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha'_i) |u_i\rangle = 0$ ，若第 k_1, k_2, \dots, k_m 项满足 $\alpha_{k_1} \neq \alpha'_{k_1}, \alpha_{k_2} \neq \alpha'_{k_2}, \dots, \alpha_{k_m} \neq \alpha'_{k_m}$ ，原式可化为 $\sum_{i=1}^n (\alpha_{k_i} - \alpha'_{k_i}) |u_{k_i}\rangle = 0$ ，即 $|u_{k_1}\rangle, |u_{k_2}\rangle, \dots, |u_{k_m}\rangle$ 线性相关，但基矢 $\{|u_i\rangle\}$ 之间满足线性无关，矛盾！因此任意矢量用一组基矢的展开是唯一的。

练习3：两个归一化的矢量，什么时候它们之间的距离最大，什么时候距离最小？

解：对于两个归一化的矢量 $|\alpha\rangle, |\beta\rangle$ ，其中 $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1, \langle\beta|\beta\rangle = 1$ ，有：

$$\|\alpha - \beta\| = \sqrt{\langle\alpha - \beta|\alpha - \beta\rangle} = \sqrt{(\langle\alpha| - \langle\beta|)(|\alpha\rangle - |\beta\rangle)} = \sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle - \langle\beta|\alpha\rangle - \langle\alpha|\beta\rangle + \langle\beta|\beta\rangle} = \sqrt{2 - \langle\beta|\alpha\rangle - \langle\alpha|\beta\rangle}$$

(未完待续)

练习4：为什么不能将 S_2 空间中的内积按如下定义

$$\langle a|b\rangle \equiv \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

解：若按如上定义，可设 $|u\rangle = \begin{bmatrix} iu_1 \\ iu_2 \end{bmatrix}$ ，其中 $u_1, u_2 \in \mathbb{R}$ ，则

$$\langle u|u\rangle = \begin{bmatrix} iu_1 & iu_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} iu_1 \\ iu_2 \end{bmatrix} = i^2(u_1^2 + u_2^2) = -(u_1^2 + u_2^2) \leq 0$$
，但内积必须满足正定性，即

$\langle u|u\rangle \geq 0$ ，矛盾！因此如上定义是不合理的